

KAIS.KÖN.HOF-



BIBLIOTHEK

104469-B

ALT-

J. S. 569

104469 B.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

**МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.**

~~~~~  
**Часть XIII. N. 1.**  
~~~~~

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

Cato.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

**ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.**

1 8 2 9 г о д а .

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Практическія замѣчанія о перемежающихся лихорадкахъ и послабляющихъ горячкахъ.	3.
II. О чумѣ.	27.
III. О нѣкоторыхъ простонародныхъ средствахъ, въ Сибири употребляемыхъ.	44.
IV. Замѣчанія о лѣченіи порѣзанныхъ ранъ.	55.
V. Сѣрноокислый хининъ, разсмаприваемый какъ врачебное средство. .	64.
VI. Воспаленіе клѣпчатой плевы. . .	74.
VII. Клиническія наблюденія и замѣчанія	85.
VIII. Анатомическое описаніе найденнаго въ пѣлѣ человѣческомъ превращеннаго положенія сердца и всѣхъ большихъ кровеносныхъ жилъ.	102.
IX. Хиноіодинъ (chiniodin), опкрытый вновь Г-мъ Серпирнеромъ въ хинѣ, составляющій претій алкалоидъ оной.	110.

X. СМѢСЬ.

1. Обѣ употребленіи и пользѣ спрнопегеногной мази. 120.
2. Обѣ открытіи мышьяка при отравленіяхъ. 128.
3. Пиротонидъ (Pirothonide). 134.
4. Средство противъ гесотки. 156.
5. Средство противъ тужи. —
6. Іодидъ противъ подагры. —
7. Spina bifida. 138.
8. Средство противъ слюнотеченія отъ ртути. —
9. Употребленіе рожковъ ржи для возбужденія родовыхъ потугъ и для изгнанія послѣда. 149.
10. Трудное прорѣзываніе зубовъ. 141.
11. Вліяніе возраста родителей на опредѣленіе пола дѣтей. 142.

XI. Офіціальныя извѣстія съ 1-го Января по 1-е Марша 1829 года. 144.

XII. Лучшія новѣйшія Медицинскія сочиненія. 155.

I.

ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ О ПЕРЕМЕЖАЮЩИХСЯ ЛИХОРАДКАХЪ И ПОСЛАБЛЯЮЩИХЪ ГОРЯЧКАХЪ (Febres intermittentes et remittentes),

*Главнаго по арміи Медицинскаго Инспектора
Баронета Я. В. Вилліе.*

Brevis esse studeo: ne obscurus sim timeo.

Перемежающіяся лихорадки и послабляющія горячки достойны особеннаго вниманія всякаго Врача, а шѣмъ болѣе военнаго, наипаче по слѣдующимъ причинамъ: *Во первыхъ* онѣ происходятъ преимущественно, если не единственно отъ мѣсячнаго вліянія (influxus endemicus), проспирающагося и оказывающаго свое дѣйствіе, въ разной впрочемъ степени, на всѣхъ оному подвергающихся и нерѣдко ослабляютъ цѣлыя арміи болѣе, чѣмъ

✱

непріятельское оружіе и всё трудности и неудобства походовъ, какъ это доказы-
вается множествомъ примѣровъ изъ древней
и новой Исторіи. Избѣгая паковыхъ мѣспъ,
можно избѣгнутьъ самыхъ сихъ болѣзней, и
это во многихъ случаяхъ не трудно испол-
нить. *Во вторыхъ*, при невозможности из-
бѣгнутьъ сего вреднаго вліянія, заблаговре-
менное и правильное употребленіе соотвѣст-
ствующихъ болѣзни средствъ можетъ со-
кратить ея продолженіе и отвратить опас-
ныя послѣдствія, которыя, въ противномъ
случаѣ, обыкновенно отъ нихъ происходятъ.

Почитая излишнимъ разсмапривать пред-
метъ сей обстоятельно, я сообщаю здѣсь
объ немъ только важнѣйшія практическія
замѣчанія, частію извлеченныя изъ собствен-
ныхъ моихъ наблюденій, частію же заимство-
ванныя изъ другихъ писателей.

Перемещающіяся лихорадки и послабляю-
щія горячки вообще господствуютъ преиму-
щественно въ мѣстахъ низменныхъ, болопи-
стыхъ, степныхъ равнинахъ и другихъ, под-
верженныхъ наводненіямъ отъ разливія рѣкъ
или продолжительныхъ дождей, также на
гористыхъ возвышеніяхъ, одѣтыхъ кустар-

никомъ. Въ Россіи таковыя мѣста суть на-
ипаче въ Грузіи, Крыму, Бессарабіи; также
Россійскія войска подвергаются нынѣ симъ
болѣзнямъ въ Молдавіи, Валлахіи и на пра-
вой споронѣ Дуная, до самыхъ Балканскихъ
горъ. Однако лихорадки сіи появляются не
во время самага наводненія, когда низмен-
ныя мѣста болѣе или менѣе покрыты во-
дою, но по спаденіи водъ или когда болопа
начнутъ высыхатъ. Сіе обстоятельство оче-
видно доказываетъ, что для произведенія
сихъ болѣзней не довольно одной влажності,
но что для сего нужно еще другое условіе,
копорое, по всѣмъ наблюденіямъ, состоитъ
въ особомъ продуктѣ, происходящемъ отъ
гніенія или химическаго разложенія органи-
ческихъ, особливо распительныхъ веществъ,
копорыми таковыя мѣста обыкновенно изо-
билуютъ; а можетъ быть въ семъ участву-
етъ и самая почва земли. *Джонсонъ* гово-
ритъ, что въ Бенгалѣ, во время самага боль-
шаго наводненія, воздухъ очень здоровый; но
по спаденіи воды, въ Ноябрь и Декабрь, ко-
гда бывшая подъ водою поверхность земли
подвергается вліянію въ той спранѣ еще
и въ сіе время сильно-дѣйствующаго солнца,

живущіе близь таковыхъ мѣспъ обыкновенно спирадають перемежающимися лихорадками или послабляющими горячками. Тоже можно сказать о разлиіи Днѣпра, Буга, Дуная и другихъ Южныхъ нашихъ рѣкъ. Въ С. Петербургѣ лихорадки сдѣлались очень рѣдки съ того времени, какъ окружавшія сію столицу болота изсушены и лѣсъ срубленъ. Что при сказанныхъ обстоятельствевахъ воздухъ таковыхъ мѣспъ наполняется вредными испареніями и гасами, сіе не подлежитъ никакому сомнѣнію; но сіи ли испаренія производятъ сказанныя лихорадки или онѣ происходятъ отъ особливаго припомъ образующагося начала, не только въ воздухѣ, но можетъ быть и въ водѣ источниковъ распвореннаго, это еще не опредѣлено. Вредное, хотя и неизвѣстное сіе начало или лучше сказать, причину, производящую лихорадки, обыкновенно называютъ *болотистымъ повѣтріемъ* (miasma paludosum, malaria, effluvia). Степень дѣйствительности сего начала, въ отношеніи къ произведенію лихорадокъ, сопвѣществуешь степени обстоятельствъ, благопріятствующихъ гніенію органическихъ, а можетъ быть и разложенію неорганическихъ.

кихъ веществъ. Посему, чѣмъ обширнѣе влагою напитанная поверхность земли, чѣмъ болѣе на ней органическихъ веществъ и чѣмъ сильнѣе на нее дѣйствуетъ теплота, тѣмъ болѣе и съ болѣею жестокостію свирѣпствуютъ сіи болѣзни. Когда таковая поверхность высохнетъ или замерзнетъ, то и лихорадки прекращаются.

Наблюденіе показываетъ, что когда вышеказанныя обстоятельства находящіяся въ низшей степени, то и лихорадки бываютъ не такъ жестоки и опасны, на прим: весною и въ умѣренныхъ климахъ онѣ появляются подъ видомъ ежедневныхъ или трехъдневныхъ перемежающихся; но съ усиленіемъ сихъ обстоятельствъ и болѣзни принимаютъ свойство болѣе опасное, перемежаясь въ неправильныя перемежающіяся *),

*) *Hemitriteus auctorum*. Во все время нынѣшняго похода ни мнѣ, и едва ли кому изъ нашихъ Врачей удалось видѣть *Hemitriteum Миндерера*. Сколько я могу догадываться, Г. Миндереръ и его послѣдователи за *Hemitriteum* приняли ff. remittentes gastrico — bilosas endemicas, встрѣтившіяся имъ въ субъектахъ или истощенныхъ, у которыхъ reactio

жестокія послабляющія, желчныя, непрерывныя, а даже злокачественныя, и на обобщеніе. Изъ сего слѣдуетъ заключить, что различіе сихъ болѣзней зависитъ отъ разной степени дѣйствительности вліянія, ихъ производящаго и отъ различія пораженныхъ органовъ. Мнѣніе сіе подтверждается еще слѣдующими наблюденіями. Въ простой перемежающейся лихорадкѣ, кромѣ собственно лихорадочныхъ припадковъ: озноба, жара, поппа, боли головы, жажды и проч., другихъ не бываетъ; но въ послабляющей горячкѣ жаркихъ спранъ всегда находятся признаки большаго или меньшаго расстройства брюшныхъ органовъ, а особливо печени. Далѣе: одно и тоже повѣтріе, дѣйствуя на разныхъ людей, у одного производитъ послабляющую го-

vis vitalis въ совершенномъ упадкѣ, или пакихъ, которые, при полнокровномъ сложеніи, до неумѣренности преданы употребленію спиртныхъ напитковъ, отъ чего получили расположеніе къ приливамъ крови (*congestio*), особенно къ головѣ, которые и въ самомъ дѣлѣ нерѣдко при первомъ приступѣ горячки (*accessus febrilis*) случаются. И первые умираютъ а *paralysi*, а послѣдніе ab *apoplexia*.

рячку, у другаго перемежающуюся лихорадку, а у прешьяго непрерывную горячку, смотря по ихъ шѣлосложенію или особенному расположенію, ш. е., по особенной способности (*susceptibilitas*) сиспемъ или органовъ ихъ шѣла поражаться вліяніемъ онаго повѣтрія.

Другое въ пракпическомъ опношеніи весьма важное обспояпельспво, шакже дознанное изъ многихъ наблюдений, соспояишь въ шомъ, что дѣйспвіе даже самаго сильнаго болописнаго повѣтрія (*miasma, malarія*) ограничивается не большимъ проспранспвомъ, и что даже вблизи шакowychъ болописныхъ мѣспъ или большихъ рѣкъ можно быть безопаснымъ опъ вліянія онаго. *Сирѣ Гилбертъ Бленѣ* приводитъ примѣръ, что изъ экипажей караульныхъ кораблей, споявшихъ въ узкомъ каналѣ между Велчернъ и Бавеландъ, гдѣ лихорадки господспвуютъ эндемически, ниодинъ человекъ не прешерпѣлъ сей болѣзни. Нѣкоторые корабли спояли на распояніи не болѣе 3000 фушовъ опъ берега. То же замѣчено нами на Черномъ морѣ, при осадѣ Варны и Анапы. Экипажи кораблей, споявшихъ на распояніи полуторы версты

отъ берега, совсѣмъ не знали жестокихъ лихорадокъ и напужныхъ поносовъ, которыи спрадали войска, расположенныя бивуаками и лагеремъ на сухомъ пуши. И если между мапросами показывались перемежающіяся лихорадки и напужныя кровоиспращенія низомъ, то это болъшею часпю у шѣхъ, которые спояли на берегу или были посланы шуда для работъ. Особливо различіе въ высотѣ весьма важно въ семъ отношеніи. *Джонъ Гунтеръ* говоритъ: "нѣсколько фузовъ высоты въ одномъ и шомъ же домѣ дѣлають пребываніе въ ономъ для солдата безопаснымъ." Тоже извѣстно о желшой горячкѣ.

Но и довольно возвышенныя мѣста не могутъ защищити отъ сихъ лихорадокъ, если на нихъ дуешь вѣпръ изъ низменныхъ мѣстъ, наполненный вредоносными испареніями. Последнее обстоятельство причиною, что болѣзни сии появляются даже на скалахъ Гибралтарскихъ, на *Morne Fortunée*, на высотакъ Кавказа и проч.

Бололистое повѣтріе гораздо сильнѣ дѣйствуетъ вечеромъ и ночью, нежели днемъ. Вѣроятно, днемъ оно болѣе разсѣвается въ

воздухъ, изрѣженномъ отъ теплоты, а ночью, съ охлажденіемъ воздуха, сгущается. Джонсонъ полагаетъ, что даже повѣтріе, испарившееся днемъ, ночью спускается съ росю къ поверхности земли и соединяется съ выходящимъ еще изъ оной.

Впрочемъ не одно болопистое повѣтріе производить лихорадки. Испареніе множества растѣній, даже на возвышенныхъ мѣстахъ, оказываетъ такое же дѣйствіе, если не будетъ разсѣваемо вѣтромъ. Такъ происходитъ лихорадка на возвышенностяхъ острова Цейлона, называемая проспниковою или горною (Jungle или hill-fever).

Болопистое повѣтріе, дѣйствуя въ сильной степени, можетъ произвести лихорадку во всякомъ человѣкѣ, даже безъ особеннаго къ тому расположенія или содѣйствія другихъ условій; но при стеченіи нѣкоторыхъ обстоятельствъ дѣйствіе его вліянія обнаруживается скорѣе. Таковыя обстоятельства суть наипаче: 1. угнѣтающія спрасти: страхъ, печаль, скука, сожалѣніе и проч.; 2. слабое тѣлосложеніе вообще и ослабленіе тѣла сильными трудами, особливо въ жаркое время; 3. излишнее обремененіе

желудка пищею, особливо худого качества:
4. *Bacchus et Venus*, разумѣется, неумѣренность въ оныхъ; 5. незрѣлые плоды или даже зрѣлые, но излишне употребленные, и п. п.

Въ продолженіи нынѣшней кампаніи мы многократно замѣтили въ Молдавіи, Валлахіи и по ту сторону Дуная, что солдаты, непрестерпѣвшіе лихорадки, поспешенно ослабѣвали *) и впадали въ изнуреніе, а у другихъ появлялось худосочіе, либо водяная опухоль ногъ (*oedema pedum*), или всего тѣла (*anasarca*) или показывалась сыпь въ различныхъ мѣстахъ тѣла. Было ли это слѣд-

*) Надлежитъ замѣтить, что и у перенесшихъ лихорадку, въ особенности же у непривычныхъ къ жаркому климату жителей Сѣвера, слабость продолжается обыкновенно еще долгое время послѣ лихорадочныхъ приступовъ, по той причинѣ, что они безпрестанно подвержены вліянію вредоносныхъ испареній, произведшихъ оныя лихорадки, отъ чего и получаютъ расположеніе къ новымъ возвратамъ, которые часто становятся такъ привычны, что безъ перемѣны климата не могутъ быть совершенно прерваны и болѣзнь радикально вылѣчена.

співіе скрипнаго разспройспва какой либо важной внупренности, обспояшельспва удо-сповѣрипсья въ помъ не позволили. Впро-чемъ припадки сіи, какъ въ сихъ, такъ и въ дрогихъ случаяхъ весьма легко проходили, разумѣется въ началѣ, опъ употребленія *chologogo-catartico - diureticorum et balneorum tepidorum, nec non diaphoreticorum*.

Изъ вышесказаннаго явспвуется, какія слѣ-дуетъ предпринимать мѣры для опвращенія сихъ лихорадокъ.

Вообще для пребыванія надобно, сколько возможно, избирать мѣста, опдаленныя опъ болопъ и большихъ рѣкъ, выспунающихъ изъ береговъ, особливо послѣ дождей и другихъ наводненій. При невозможности выполнипъ сіе условіе, располагаться по крайней мѣрѣ на возвышенномъ мѣспѣ, прошивоположномъ направленію вѣтра изъ болописпыхъ мѣспъ, или защищаемомъ опъ онаго горою либо лѣ-сомъ. Близъ шаковыхъ мѣспъ, особливо но-чью, спавипъ какъ можно менѣе часовыхъ.

Работы, какія возможно, предпринимать днемъ, преимущественно опъ 6 до 11-пи часовъ поупру, и опъ 3-хъ до 7-ми часовъ по полудни. Особливо, сколько можно, избѣ-

гають работы по ночамъ. Джонсонъ приводитъ примѣръ, что съ одного корабля были опряжены двѣ паршіи людей, одна ночью для запаса воды, а другая днемъ для заготовленія дровъ; изъ первой чешыре человека заболѣли лихорадкою, опъ которой прое умерло, а послѣдніе всѣ оспались здоровы. Жители Campagna di Roma избавляются опъ злокачественныхъ эндемическихъ лихорадокъ тѣмъ, что на ночь удаляются въ Римъ, а днемъ работають въ полѣ безопасно. Посему общоятельство сіе въ походахъ должно какъ можно уважать, поелику опъ него наипаче зависить здоровье цѣлыхъ воинскихъ опрядовъ.

Строго соблюдають умѣренность въ пищу и питье, особливо спиртныхъ напитковъ; о чемъ общоятельнѣе сказано въ *способахъ для сохраненія здоровья солдатъ въ военное время*.

Людямъ, опряженнымъ въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ на работу или для другаго намѣренія ночью, велѣть одѣться хорошо и дать по двойной порціи вина либо другаго ободряющаго напитка, а для курящихъ трубку и по порціи табаку.

Поелику на опытъ дознано, что дыша чрезъ плашокъ, даже ночью, можно быть безопаснымъ, разумѣется при другихъ оспорожностяхъ, опъ вліянія вреднаго воздуха: то и сіе обстоятельство должно быть уважаемо.

Лѣченіе обнаружившейся болѣзни должно быть нѣсколько различно, смотря потому, будетъ ли болѣзнь перемежающаяся лихорадка или послабляющая горячка.

Въ перемежающейся лихорадкѣ сперва надобно дать рвошное, а потомъ очиспить кишечный каналъ слабительнымъ, преимущественно изъ сладкой ршупи, ялапнаго корня, ревеня, либо *extr. colocynth. compoz.* и подобнаго. Послѣ сего слѣдуетъ упошреблять лѣкарства, укрѣпляющія организмъ, а особливо нервную его систему и чрезъ то ослабляющія, отвращающія періодъ озноба, либо и совсѣмъ прерывающія ходъ болѣзни. Для сего намѣренія могутъ служить слѣдующія лѣкарства, принимая оныя за часъ до появленія приступа.

Rp. Muriat. ammon. ℥j.

Aquæ cuiuslibet aromat.

Aut infusi amari ℥j.

Tinct. opii.

Aether. sulphur. alcohol.

Vini stibiati vel.

— Ipecacuanhæ āā gutt. xxx.

Tinct. aromat. vel.

Syr. amomi zingib. vel alius similis āā
3jj m. f. haustus, superveniente, ut
dictum, paroxismo dandus, vel.

Rp. Aquæ alicuius aromaticæ aut

Infusi amari vel amaro - aromat. 3j

Muriat. ammon. 3jj

Tinct. opii

Aether. sulphur. alcohol.

Vini stibiati.

Subcarbon. amon. liquid. āā gutt. xxv.

Tinct. aromat.

Syr. zingiber. āā 3ji

m. f. haustus, invadente horripilatione
propinandus, vel

Rp. Subcarbon. ammon. gr. xii—xx

Pulv. aromat. gr. x.

Opii puri gr. jβ f. bolus,

ut supra sumendus.

Если сіи средства были недостаточны для
прерванія лихорадки, то во время перемежки
употреблять слѣдующія:

Rp. Sulphat. chinini ʒβ

Syrup. zingiber. ʒj

Tinct. aromat. acidulæ P. C. gutt. xx.

Dosis: ʒi secunda quavis hora, frequen-
tius vel rarius, prout res circumstan-
tes postularint; vel

Rp. Tinct. gentianæ compos. ʒjβ

— — zingiber.

— — camphoratae compos. āā ʒjj

Sulph. chinini gr. x. f. solutio; dosis: ʒβ
ter quaterve de die.

Rp. Sulphat. chinini ʒjj

Tinct. gentian. compos. ʒjβ

Syrup. zingib. ʒj

Tinct. aromat. acidul. Ph. C. gutt. x

Fiat solutio. Dosis: cochlear minimum
ter quaterve de die.

Rp. Infusi calami aromatici saturati ʒvj

Tinct. chinæ ʒjj

Syrupi zingiber. ʒj

acidum sulphur. aromat. instilla guttatim
eousque mixtura gratam acquisiverit ace-
dinem. Dosis: cohlear amplum alterna-
tim cum remediis supra dictis. vel

Rp. Pulv. cinchon. officinalis

— — carbon. lignarii as ʒjj.

Часть XIII. N. 1.

2

Sub-carbonat. magnesiæ, vel
Muriat. ammon.

Pulveris aromat. aa gr. x. f. pulv.
singulis horis vel hora secunda qua-
que ex infuso amaro adhibendus.

Нѣсколько tartrat. sbibii et potassæ или
оріі, либо того и другаго, прибавленное къ
симъ порошкамъ, усиливаетъ ихъ дѣйствіе.

Solutio arsenici et nitratis potassæ либо so-
lutio arsenitis potassæ, также emulsio phos-
phorata либо solutio phosphori aetherea въ
упорнѣйшихъ случаяхъ должны быть испы-
таны, употребляя ихъ по правиламъ и со
всѣми осторожностями, изложенными въ
Pharmacop. Cast. Ruthena 1818.

Какое изъ сихъ средствъ ни было бы упо-
треблено, Врачъ непременно долженъ спа-
рагаться, чптобы испражненіе низомъ не было
задержано. Это есть единственнѣйшій способъ
отшвратить завалы брюшныхъ внутренностей
со всѣми худыми ихъ послѣдствіями, какъ
то: водяная, сухотка, худосочіе и проч.;
сверхъ того достапточное поддержаніе сего
испражненія существенно служитъ къ излѣ-
ченію самой болѣзни; поелику въ лихорадкѣ
(въ чемъ бы ни состояла ея сущность или

ближайшая причина) брюшныя внутренности всегда бывають болѣе или менѣе обременены нечистотами, кровообращеніе въ ихъ сосудахъ совершается медленно и отдѣленія сихъ важныхъ органовъ измѣнены, что все увеличиваетъ болѣзненное состояніе организма и дѣлаетъ оное сложнѣйшимъ. Дѣйствіемъ слабительныхъ выводятся изъ кишекъ скопившіяся въ нихъ нечистоты, кровообращеніе и отдѣленія дѣлаются свободнѣйшими и чувствительные брюшныя нервы освобождаются отъ непріятнаго для нихъ впечатлѣнія *). Въ семъ отношеніи съ пользою можно употреблять, смотря по обстоятельствамъ, то чаще, то рѣже, въ

*) Опытность при томъ показываетъ, что часто лихорадка отъ употребленія *pulv. chinæ vel Sulph. chinini* проходитъ безъ большой упорности, но не надолго; она снова возвращается и съ болѣе ожесточеніемъ. Это отъ того, что отправленіе брюшныхъ внутреннихъ, особенно печени, не было приведено въ надлежащую правильность. Потому лихорадка была только, такъ сказать, подавлена (*suppressa*), а не совершенно вылѣчена.

большихъ или меньшихъ приемахъ *Massam pilul. deobstruent. Pharm. Cast. **), или

*) Мы ежедневно встречаемъ новыя доказатель-
ства успѣшнаго дѣйствія во многихъ хрониче-
скихъ болѣзняхъ брюшныхъ внутренностей
отвлеченія крови отъ геморроидальныхъ венъ,
неминуемо распространяющагося и на всю си-
стему воротной вены, особливо если оно сое-
динено съ благоразумнымъ употребленіемъ пи-
люль изъ полуокиси ртути (*pilulae suboxydi
hydrargyri Ph. Austr.*), теплыхъ ванъ и на-
рывныхъ пластырей, прикладываемыхъ къ
правому подреберью (*hypochondrium dextrum*).
Въ сихъ же случаяхъ и съ большою пользою
можно употребить смѣсь, составленную, въ
подражаніе нѣкопрымъ минеральнымъ водамъ,
изъ тройнаго соединенія солей, а именно:
сѣрнокислой магнезіи, сѣрнокислой соды и
сѣрнокислаго поташа, растворенныхъ въ до-
стапочномъ количествѣ приличной жидко-
сти. Таковой смѣси для супочной порціи до-
стапочно 4-хъ унцій, и ее надобно прини-
мать теплую, на подобіе чая. Такъ нѣкоп-
рыя Врачи съ симъ же намѣреніемъ, въ по-
дражаніе Карлсбадскимъ водамъ, сѣрнокислую
соду вмѣстѣ съ углекислою содою распуска-
ють въ водѣ при температурѣ горячаго чая
или ипр 50° Р. ш., и въ то самое время,

Rp. Extr. colocynth. compos. vel
 Massæ pilular. aloeticar. vel
 — — — — — rhei, vel
 Saponis jalappini 3j
 Submuriat. hydrargyri, vel
 Massæ pilul. suboxydi hydrarg.
 purificati 3j

Extr. conii maculati, vel

— — hyosciami 3j

Tartr. stibii et potassæ gr. vj. vel

Pulver. antimonial. 3j

Ol. anisi, vel

— Chamomillæ, vel

— Juniperj, vel alius congrui essentialis olei carminativi gutt. x. Syrupo zingiber. excipe, ut fiat massa pilularis. Dosis: gr. vjjj-xjj.

Приемъ постепенно увеличивать, пока лѣкарство значительное окажетъ дѣйствіе, принимая оное на ночь или смотря по обстоятельству (habita ratione individui).

или

Rp. Extr. colocynth. compos. vel

Saponis jalappini

Pulv. rad. rhei aa 3β

какъ надлежитъ ее пить, прибавляють нѣсколько капель разведенной сѣрной кислоты.

Submuriat hydrargyri ʒj

Tartari emetici gr. vj

Ol. menthæ piper. gutt. viii, misce exacte, addito quovis apto, ut massa pilularis adipiscatur, de qua formentur pilulæ xxx. Dosis: pilula una vel duæ et plus, hora somni. vel

Rp. Extr. aloes spicatae ʒj

Pulver. antimonialis gr. x, vel

Tart. emetici gr. ji.

Massæ pilular. suboxydi hydrarg. ʒji

Olei chamom. gutt. x. f. l. a. pil. xx.

Dosis ut precedentis, vel

Pp. Extr. colocynthid. ʒj

Pulv. rad. jalappæ

Pilular. hydrargyri massæ

Pulver. rad. jpecacuanhæ aa gr xv.

Saponis puri gr. vi.

Ol. essentialis gutt. v. f. massa pilul. cujus dosis gr. viii et amplius.

Къ симъ пилюлямъ шакже можно прибавить tart. emeticum.

Сии же пилюли можно употреблять и при воспослѣдовавшихъ уже завалахъ брюшныхъ внушренности, чему пренебреженное или неправильное лѣчение лихорадки обыкновенно

причиною. Сверхъ сего въ такомъ случаѣ превосходное оказываетъ дѣйствіе:

Rp. Extr. taraxaci ℥j

Subarbon. sodæ ℥β

Sulphat. magnes. ℥vj

Infusi acori calami vel

— — lapati acuti vel

— — corni masculæ vel

— — — — siritiæ ℥vjij

Aquæ menthæ piper. ℥j

Tinct. rhei amaræ ℥vj

Syr. zingiber. ℥j. M. D. S.

Dosis ℥β чрезъ часъ или два.

Трѣніе всего тѣла, а особливо подреберъ въ щепкою, прежде намазавъ оныя небольшимъ количествомъ Linim. suboxydi hydrarg. ammoniaci, въ нѣкоторыхъ случаяхъ заваловъ брюшныхъ внутренностей, съ начинающеюся уже водяною, оказалось весьма полезнымъ. Теплая ароматная ванна, раздражая кожу и возбуждая припеченіе къ ней влагъ, опводитъ оныя опъ брюшныхъ внутренностей и тѣмъ споспѣшествуетъ къ разрѣшенію заваловъ.

Послабляющія горячки въ жаркихъ странахъ по большей части принимаютъ воспа-

лишительное свойство; по крайней мѣрѣ дѣятельность кровеносной системы въ нихъ бываетъ очень возбуждена, а еще и того чаще онѣ сопровождаются сильнымъ припеченіемъ крови къ головѣ, груди и печени, особливо во время ожесточенія, подающимъ поводъ къ мѣстному воспаленію; посему при лѣченіи ихъ часто нужно бываетъ употреблять кровопусканіе: *tivo ex magno orificio*, и приспавлять пиявицы или кровососныя банки сколь можно ближе къ спраждающему мѣсту, При особенномъ спраданіи головы кровопусканіе изъ височной артеріи или яремной вены дѣйствительнѣе испражненія крови изъ руки, особливо при недоспащкѣ пиявицъ.

Послѣ сего холодныя примочки къ головѣ, а иногда теплоша къ ногамъ, а внутрь слабительное какое нибудь изъ вышеизложенныхъ, либо *Infusum sennae salin. Ph. Castr.* суть главныя въ сей болѣзни лѣкарства. Но иногда раздражительность желудка бываетъ такъ велика, что прежде употребленія слабительнаго нужно его успокоить *Haustu carbonico* съ нѣсколькими каплями *Tinct. opii*.

Если нѣтъ показанія къ кровопусканію и желудокъ не очень раздражиселенъ, то и послабляющихъ горячекъ лѣченіе должно начинать рвошнымъ, а потомъ дать слабительное. Средства сіи въ послабляющихъ лихорадкахъ еще болѣе полезны и необходимы, нежели въ перемежающихся: поелику при оныхъ скопленіе желчи и другихъ нечистотъ въ кишкахъ, нерѣдко обнаруживающееся желтухою, бываетъ гораздо болѣе и равновѣсіе кровообращенія еще болѣе нарушено.

Слабительныя, особенно *hydrargyrata*, во все продолженіе болѣзни надобно повторять пакъ часто и въ пакикъ пріемахъ, чпобы больной всякій разъ имѣлъ одно доспапочное или и два испражненія низомъ.

Прочее лѣченіе, въ продолженіи болѣзни, состоитъ въ употребленіи *Mixturæ muriatis ammoniæ stibiatae*, прибавля къ тому въ особенныхъ случаяхъ *succum prissat. hyosc. nigri* или подобное успокоивающее пропивусу, дорожное средство. Но если печень особенно спраждешь, чпо въ жаркикъ спранахъ и въ жаркое время всегда случается: то необходимо нужно употреблять сладкую ршущъ, иногда съ сюрмяными и другими на печень

и кожу дѣйствующими лѣкарствами, въ такихъ приемахъ и такъ часто, чтобы дѣйствіе ея на слюнные желѣзы скоро обнаружилось. Полграна или грань опія, прибавленный къ каждому приему ртутти, очень содѣйствуетъ къ успокоенію брюшнаго раздраженія.

Шпанская мушка къ запылку, на грудь или къ правому подреберью нужна для уничтоженія остатковъ раздраженія въ органахъ соотвѣтствующихъ симъ мѣстамъ.

Прохладная температура и легкая діета суть необходимыя условія въ продолженіи волненія крови; но съ успокоеніемъ онаго *acet. ammon. liquidus*, *haustus sudoriferus* споспѣшествуютъ скорѣйшему рѣшенію болѣзни.

II.

О чумѣ. *)

I.

Мѣры, употребленныя для прекращенія чумы въ Карсѣ и его окрестностяхъ.

*Дивизионнаго Доктора 20-й пѣхотной Дивизіи
Надворнаго Совѣтника Шуллера.*

По взятіи крѣпости Карса побѣдоноснымъ Россійскимъ войскомъ оказалась чума между Турецкими войсками и жителями крѣпости и города Карса. Поелику войска наши пошли опсюда 17-го Іюля къ крѣпости Ахалцыху, то мнѣ, какъ Старшему Медику оставшагося здѣсь подъ командою Генераль-Маіора Берхмана отряда войскъ, по волѣ

*) Чума, лихорадка и кровавый поносъ суть обыкновеннѣйшія и опасныя болѣзни тѣхъ странъ, въ коихъ теперь дѣйствуютъ Россійскія войска. Г. Главный по Арміи Медицинскій Инспекторъ издалъ замѣчанія о сихъ болѣзняхъ, которыя безъ сомнѣнія послужатъ къ спасенію жизни многихъ нашихъ воиновъ. Между нѣмъ и нѣкоторые Врачи дѣйствующихъ Армій сообщили намъ о сихъ же болѣзняхъ наблюденія и замѣчанія, изъ коихъ нѣкоторыя мы нашли достойными занять мѣсто въ семъ Журналѣ. Редакт.

Главнокомандующаго, поручено было принять дѣйствительнѣйшія мѣры къ ограниченію распространенія и къ самому прекращенію чумы, между жителями города и крѣпости Карса и всего пашалика, не учреждая однако между ими карантина по Европейскимъ правиламъ: ибо сей Азіатскій народъ объявилъ прямо, что лучше голову долой всѣмъ, нежели подвергаться карантиннымъ законамъ, коихъ онъ чрезвычайно спрашився и кои, по мнѣнію его, противны его религіи.

По прибытіи въ Карсъ, я старался словесно внушить народу справедливѣйшія понятія о чумѣ и о способахъ предохранять себя отъ оной, и въ теченіи нѣсколькихъ дней обращилъ на себя вниманіе жителей всего города, которые по улицамъ и базарамъ меня окружали, искали громкихъ людей и записывали мои наставленія. Нѣкоторые Иманы Мусальманскіе также записывали мои наставленія и скоро склонили главное Магомелланское Духовенство къ принятію предлагаемыхъ мною мѣръ для спасенія народа отъ явной и видимой гибели. Главныя мои наставленія были слѣдующія: 1. омываться соленою водою;

2. никого не пускать къ себѣ въ гости и на вещи свои не позволять никому садиться, 3. не ходишь въ гости и не садиться на принимающихъ заразу пожипкахъ другихъ; не ходишь въ свои лавки и на улицѣ не прикасаться къ другимъ людямъ; 4. изъ своихъ вещей и пожипковъ никому ничего не продаваешь, не даешь и безъ Имана ничего не покупаешь, что можетъ содержать въ себѣ заразу, кроме съѣстныхъ припасовъ; 5. подозрительное платье омываешь въ соленой водѣ и вывѣтриваешь; 6. людей зараженныхъ или въ томъ подозрѣваемыхъ свидѣтельствовать; 7. въ случаѣ обнаружившейся болѣзни искать врачебной помощи.

Начальникъ здѣшной области Г-нъ Генералъ-Маіоръ и Кавалеръ Князь Бековичъ — Черкасскій собиралъ все Духовенство и Турецкое Начальство сего города для предложенія сихъ мѣръ, которыя и въ шрехъ собраніяхъ, въ разныя времена дѣланныхъ, были приняты Муфтіемъ и нѣкоторыми Духовниками; но Кади Ефендіи и партія его сильно противорѣчили. Они насмѣивали, чтобы женщинъ и дѣтей Лѣкарямъ опіюю не осматривать, по чему для сего и были опредѣлены спару-

хи; чтобы никого изъ своего дома въ карантинъ не везти; чтобы женское и дѣтское платье не смотрѣли и не вывѣшивать на улицѣ, надъ домами и въ курительныхъ; чтобы родственникамъ не препятствовать присутствовать на похоронахъ и чтобы въ похоронахъ не было никакой опѣ Мусульманскаго закона опмѣны. На омываніе и вывѣтриваніе платья въ своихъ домахъ согласились всѣ единодушно, равно какъ и на наружное употребленіе лѣкарства въ видѣ мази и омываніе тѣла; также согласился давать больнымъ пить тѣ вещества, кои позволяютъ употребить религія Мусульманская.

Неупомимый для блага народнаго Генераль-Маіоръ Князь Ёсковичъ—Черкасскій удивительнымъ своимъ краснорѣчіемъ склонилъ Духовенство Мусульманское на то, чтобы привести къ присягѣ хозяевъ и членовъ зачумленныхъ домовъ въ томъ, что они будутъ исполнять все въ моихъ наставленіяхъ сказанное, только бы то не было противно ихъ религіи, и терминъ освобожденія отъ сихъ новыхъ карантинныхъ обязанностей не прежде окончить, пока чрезъ вторую присягу я и прочіе Чиновники, назначенные для прекращенія

чумы, не удостовѣримся, что въ зачумленномъ семействѣ все выполнено было и для другихъ не предстоить никакой опасности заразиться. Мы не смѣли пропротиворѣчить Духовенству Мусульманскому, что сія болѣзнь послана отъ Бога; но они тоже съ нами согласились, что она заразительна и кто хочеть, можетъ отъ оной уберечься.

Передъ каждымъ зачумленнымъ домомъ былъ поставленъ красный значекъ, къ шесту привязанный, чпобы всякой зналъ, что тамъ есть нечистыя или зачумленныя вещи, кои слѣдовало омывать, дабы карантинныя бабки и Медики могли удобно найти сей домъ. Медицинскимъ Чиновникамъ было позволено передъ похоронами, въ то время, когда Иманъ оmyваетъ тѣло умершаго, осмотрѣть, нѣтъ ли на немъ чумнаго признака; также позволено было давать всѣмъ тѣмъ Мусульманамъ лѣкарства, кои желаютъ оныя принимать; освидѣтельствовать больныхъ мужчинъ по желанію ихъ безъ принужденія, равно какъ и карантиннымъ бабкамъ было позволено осмотрѣть женщинъ въ нагомъ видѣ, но насильно заставлятъ показатъ голое свое тѣло, ни мужское, ни женское, никому не поз-

волялось. Мое наставленіе, написанное на Турецкомъ языкѣ, было переведено на Армянскій языкъ и его ежедневно читали на базарахъ города, въ зачумленныхъ домахъ и въ мечетяхъ Мусульманскихъ и церквахъ Армянскихъ, по окончаніи молитвы. Поелику нѣкоторыя махалы или кварталы города совершенно опъ смертности были свободны, а изъ другихъ махаловъ ежедневно носили большое число умершихъ опъ чумы на кладбище, и по большей части изъ домовъ, передъ коими были поставлены красныя маячки, или близъ оныхъ: по сіе подало поводъ къ разнымъ толкамъ между простымъ народомъ, который, не смотря на увѣреніе Кади Ефендія и нѣкоторыхъ Духовниковъ, что чума есть болѣзнь, посланная опъ Бога въ наказаніе за грѣхи и что противу посланія Божія плещенымъ останется все стараніе людское, скоро удостовѣрился, что она сообщается чрезъ заразу и что опъ оной можно предохранить себя, не подходя близко къ зараженнымъ.

Доспапочные Мусульманы обыкновенно дарящъ платье умершихъ бѣднымъ, бѣдные же продающъ оное на базарахъ, дабы имѣть нужныя издержки для похороненія покойника; у

Армянь же плащье умершихъ опдаеися Священникамъ, копорые продають оное въ своихъ лавкахъ, и каждый Священникъ по сему случаю имѣеть собственную лавку. При таковомъ распоряженіи чрезъ нѣсколько недѣль узналъ я, къ моему удивленію, что одна Мусульманская женщина пришла жаловаться, что злобная ея сосѣдка подарила плащье умершаго своего сына равнолѣпному ея сыну и чрезъ то она лишилась не только своего сына, но даже и двухъ дочерей и мужа въ весьма короткое время. Самое Духовенство Мусульманское опдало жалобѣ ея полную справедливость, и я поспѣшь велѣлъ чрезъ публикацію объявить сей случай всему народу.

Присемъ я удостовѣрился, что въ нѣкоторыхъ семействахъ здоровые оставляли чумныхъ своихъ больныхъ въ домахъ безъ всякой помощи, а сами изъ оныхъ удалялись; по каковому случаю я и другую публикацію велѣлъ обнародовать, въ которой просилъ приходиться за лѣкарствомъ и за наставленіями, какъ надобно помогать чумнымъ больнымъ и при всемъ томъ не заразиться.

Въ половинѣ Августа мѣсяца написалъ я другое наставленіе на Турецкомъ и Ар-

Часть XIII. № 1.

3

мянскомъ языкахъ, дабы чрезмѣрно прусливому народу дать понятіе о вещахъ, кои заражающъ и кои не заражающъ и какъ надобно ихъ очищать отъ чумнаго яда. Скоро, къ удивленію моему, увидѣлъ я, что начали бояться покупать старыя вещи отъ другихъ, опасаясь, не зачумленные ли оныя; а Армянскихъ Священниковъ лавки пришли въ такую недовѣренность, что изъ нихъ не покупали ничего и что они должны были по большей части торгъ свой вести по деревнямъ, гдѣ народъ сего правила не испыталъ и не зналъ; какой торгъ однакожъ имъ въ скорости поже былъ запрещенъ.

Я не могу здѣсь прейти молчаніемъ одинъ весьма важный случай, а именно: по распоряженію здѣшняго Областнаго Правленія всѣ Иманы и Армянскіе Священники обязаны были посылать ежедневно въ Полицію и ко мнѣ имена умершихъ и больныхъ всякаго рода. Армянскіе Священники, увидѣвъ, что ихъ лавки попадутся по случаю чумы въ дурной кредитъ, распространили слухъ, что въ Армянскомъ форштафтѣ вовсе чумы нѣтъ и не показывали ниодного умершаго, ни въ По-

лицѣи, ни у меня, дабы смѣлѣе покупали спарыя вещи изъ ихъ лавокъ; но поелику смерпность сильно увеличилась въ Армянскомъ Форштаптѣ въ то самое время, когда между Мусульманами она была очень малая, то они рѣшились хоронить своихъ умершихъ отъ чумы тайно ночью, а доставшееся имъ по обряду Армянской церкви платье возить по деревнямъ и тамъ продавать, чѣмъ они чуму и тамъ распространили. Въ теченіи одного мѣсяца изъ двухъ махаловъ они болѣе 300 человекъ тайно похоронили; но въ другихъ Армянскихъ махалахъ не было почти вовсе чумы. Неблагоразумный поступокъ сихъ Армянъ былъ открытъ, и они, сознаваясь въ своемъ пресупленіи, послѣдовали самымъ усерднѣйшимъ образомъ примѣру Мусульманъ, и въ скоромъ времени чума и у нихъ прекратилась.

Когда уже въ городѣ спало немного спокойнѣе, то надобность требовала еще въ Августѣ мѣсяцѣ начать посылать по деревнямъ мое наставленіе о прекращеніи чумы и мнѣ въ помощь данныхъ Чиновниковъ, то есть: Мусульманскихъ Имановъ и одного Армянскаго Священника: ибо почти еже-

✱

дневные смертные случаи отъ чумы приключались уже у людей, прїѣзжавшихъ изъ деревень въ городъ для полученія помощи. Сколько было зачумленныхъ деревень, столько велѣлъ я написать экземпляровъ моихъ наставленій и опдалъ посланнымъ пуда Чиновникамъ. Въ весьма короткое время я увидѣлъ, что по всему пашалыку деревенскій народъ исполнялъ добровольно данныя отъ меня наставленія и добровольно подвергался тѣмъ же самымъ присягамъ, какъ и въ городѣ, и чума счастливо прекратилась по всѣмъ деревнямъ Карскаго пашалыка.

Я уже упомянулъ, что Мусульманская религія запрещаетъ учрежденіе карантинныхъ. Впрочемъ здѣсь можно удобно обойтись и безъ нихъ, какъ въ томъ я на опытъ удостовѣрился. Каждый Азіатскій домъ есть партикулярный карантинъ каждаго хозяина: ибо всѣ дома непрерывно заперты и споятъ только снабдивъ домашнюю инспрукцію караульницу на часахъ или пещу, старуху дома, которая живетъ съ ключами около воротъ или дверей и всякаго чрезъ прѣщину спроситъ: кто онъ таковъ? зачѣмъ? и чего хочетъ?, дабы она никого въ свой домъ не

пускала и не выпускала. Чѣмъ же касается до гостепріимства, то оное между Азіатцами довольно скудно: ибо гостя опдѣляютъ въ пустой какой либо куряпникъ, или сарай, или чуланъ, куда ему приносятъ съѣстные припасы, посуду и дрова; а между своихъ, по Азіатскимъ обычаямъ, никого не пускаютъ.

Наконецъ неизлишнимъ почиаю замѣтить, что въ 12-ти махалахъ ниодина Мулла или Иманъ, копорые обмывали и похороняли умершихъ отъ чумы, не умеръ въ теченіи сей эпидеміи, во время копорой болѣе 2000 человекъ похищены сею болѣзнію, и только у Адашерифскаго Имана померли отъ чумы четверо дѣтей и сеспра. Сіе зависитъ, по моему мнѣнію, отъ ниже слѣдующихъ обстоятельствъ: какъ скоро кто изъ Мусульманскаго семейства умеръ, то посылаются сей часъ за духовными особами, по прибытіи коихъ и по прочтеніи моливы Иманъ и Мулла раздѣваются на улицѣ до рубашки и панталонъ, между тѣмъ передъ домомъ уже грѣется въ котлѣ вода, носилки и гробъ гошвы и поставленъ передъ домомъ низкій длинный

споль, на копоромъ омывають покойника. Въ одномъ особливомъ пазѣ разогрѣвается густой мыльный распворъ, и Иманъ и Мулла, засучивши рукава рубашки до плечъ, намазываютъ себѣ симъ мыльнымъ распворомъ обѣ руки до плечъ, попомъ посредствомъ рукавицъ, сшитыхъ изъ двойной холстины, они намазываютъ симъ же распворомъ сподикъ и гробъ внупри и снаружи; послѣ того береть каждый изъ нихъ одно полошнцо, вчешверо сложенное и намоченное въ помъ же распворѣ; сверхъ сего въ помъ же распворѣ намачивается бѣлая проспыня. Приготовивъ все сіе, они входятъ въ горницу къ покойнику, раздѣваютъ его, заверпываютъ въ мокрую проспыню, кладутъ на сказанный сподъ и выносятъ на дворъ; тутъ Мулла поднимаетъ проспыню, копорю покойникъ закрываетъ, льетъ изъ сосуда воду на покойника, а Иманъ, подведши мокрую свою руку подъ проспыню, вымываетъ все пѣло, изъ вскрывшихся бобоновъ выдавлиываетъ гной и вымываетъ оный изъ чумныхъ язвъ; поворачиваетъ покойника на всѣ спороны и вымываетъ все пѣло его дочиста. За симъ заверпываютъ покойника въ чистую про-

спыню, копорую завязываютъ надъ головою и ниже ногъ краснымъ или чернымъ снуркомъ, кладушъ его въ чисто обмытый гробъ, копорый спавяшъ на носилки, также обмытыя мыльнымъ растворомъ, и по совершении молитвы относятъ покойника на кладбище, въ сопровождении его родственниковъ, гдѣ вынимаютъ его съ простынею изъ гроба, кладушъ въ яму и зарываютъ. По сей причинѣ Мусульманское Духовенство не можетъ заразиться, ниже родня и сосѣди покойника, оказывающіе ему послѣдній долгъ. Рукоятки носилокъ также обмываютъ мыльнымъ растворомъ. Изъ пришедшихъ на погребеніе мужчины въ домъ не входятъ, но остаются на улицѣ, гдѣ они молятся до совершенія омыванія тѣла покойника и опнесенія его на кладбище; но родственницы и сосѣдки, по прибытіи ихъ на крикъ и плачь семейства покойника, входятъ въ домъ, садятся кругомъ покойника со своими маленькими дочерьми и плачутъ и рыдаютъ. Сии сострадательницы въ награду за свое соболѣзнованіе часто несутъ чуму домой, и я былъ принужденъ упросить Иманолъ, чтобы они приказали подобрашъ всѣ поду-

шки и шерстяные ковры, на которыхъ сядяся сіи женщины, что въ послѣдствіи времени и сдѣлано, да и сами онѣ спали осторожно садясь около покойниковъ.

2.

О пользѣ ртутной мази и деревяннаго масла въ тулѣ.

Его же Г. Шуллера.

Давно уже извѣстно полезное дѣйствіе деревяннаго масла противъ чумы, ежели при первомъ пораженіи сею спрашною болѣзнію топчасъ напиралъ онымъ пѣло больного. Послѣ шаковаго напиранія обыкновенно слѣдуютъ обильные пошвы съ явственнымъ облегченіемъ больного, который нерѣдко на другой уже день прохаживается здоровымъ и удивляется очаровательному дѣйствію средства, спасшаго ему жизнь. Но гораздо лучше сего средства дѣйствуетъ ртутная слабая мазь, съ деревяннымъ масломъ попеременно втираемая въ пѣло больного, топчасъ послѣ зараженія, отъ чего чумная болѣзнь немедленно уничтожается. Омываніе

всего шѣла теплою соленою рапою, при упомянутыхъ средствахъ, есть также одно весьма хорошо содѣйствующее средству къ излѣченію чумы. Я велѣлъ напирать больныхъ въ печеніи 6-ти дней чумнаго срока, каждый день одинъ разъ, слабою меркуріальною мазью по всему шѣлу, одинъ разъ теплою соленою рапою и одинъ разъ теплымъ деревяннымъ масломъ, и ежели чума не слишкомъ вкоренилась въ шѣло больного и сіи средства употреблены были при первомъ пораженіи, то навѣрно больной выздоравливалъ опъ оной. За симъ обыкновенно слѣдовали каждый разъ весьма обильные попы съ облегченіемъ чумныхъ припадковъ, и у всѣхъ шѣхъ, у которыхъ произошло слюнопеченіе, послѣдовало вѣрнѣйшее спасеніе жизни. Ежели изъ сихъ послѣднихъ кто погибъ, то сіе случилось послѣ 20-ти дней болѣзни, въ слѣдствіе глубокаго изъязвленія и нагноенія бубонныхъ ранъ. Я ссылаюсь въ справедливости сего на своихъ товарищей Гг. Медицинскихъ Чиновниковъ, бывшихъ со мною, а также и на другихъ невращующихъ моихъ помощниковъ, и готовъ убѣдить въ томъ cadaго на самомъ дѣлѣ. Вышеозначенныя средства представля-

юпъ сверхъ сказанной лѣчебной пользы еще и ту карантинную выгоду, что они, впиываясь въ кожу зачумленнаго, разлагающъ его вредоносную заразительную испарину, и здоровые люди, прикасаясь къ зачумленному, котораго платье напипано меркуріальной мазью и деревяннымъ масломъ, не заражаются чрезъ неосторожное прикосновеніе къ оному и смѣло могутъ больного подымать, выводить на дворъ вскорѣ послѣ напирания и омыванія сими средствами, наипаче прежде нежели онъ вспотѣетъ, чему я неоднократно былъ свидѣтелемъ. Сверхъ того напипавшаяся жиромъ и масломъ постель больного, въ которой сии средства уничтожаютъ чумный ядъ, лишается способности заражать другихъ: ибо я замѣнилъ, что если въ семействѣ какой либо больной былъ пользуется сими средствами, то зараза чумы рѣдко поражала прочихъ. По неимѣнію деревяннаго масла въ Карсѣ, съ равною пользою, употребляли всякаго рода жидкости масленистаго свойства; жиру же или масла коровьяго не испытывали. Когда вышеозначенныя средства поздно употребляются въ чумѣ, то они ничего не помогаютъ. Въ мозговоснапительномъ

пасочной чумѣ, гдѣ при первомъ пораженіи замѣчается жестокое спраданіе мозга, съ обмороками и прудностію выговора, гдѣ язычный нервъ сильно бываетъ пораженъ, хопя всѣ сіи средства, равно какъ и прочія, ничего не помогаютъ, но при всемъ помъ слабую меркуріальную мазь, по всему пѣлу напираемую, съ теплымъ деревяннымъ масломъ и теплою соленою рапою можно считашъ специфическимъ средствомъ, подобно какъ хину въ лихорадкахъ.

III.

О НѢКОТОРЫХЪ ПРОСТОНАРОДНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ, ВЪ СИБИРИ УПОТРЕБ- ЛЯЕМЫХЪ.

*Сообщено Штабъ-Лѣкаремъ Коллежскимъ Ассесоромъ
И. Брыковымъ, бывшимъ Членомъ Томской Врачеб-
ной Управы.*

Желая по возможности и долгу званія моего быть полезнымъ, я собралъ свѣденія о нѣкоторыхъ врачебныхъ средствахъ, распространенными въ Томскѣ употребляемыхъ, краткое описаніе которыхъ присемъ представляю. Средства сіи суть или собственно здѣшнія или привозятся изъ Кипая, какъ государства, граничащаго съ Сибирью. Къ первымъ принадлежатъ: корень ѣдокмелчника бодошнаго, синеголовникъ, колба или черемиса и липовеничная смола, а къ послѣднимъ куго и зынзуй.

1). Корень ѣдколистника получается опѣ прозябающаго здѣсь въ великомъ изобиліи, по низменнымъ и топкимъ мѣстамъ растѣнія, *Euphorbia palustris* по Линнеевой системѣ называемаго, шишковатый корень котораго выкапываютъ въ Маѣ мѣсяцѣ, напираютъ на перекъ и принимаютъ такимъ образомъ истертаго цѣлую споловую ложку, сухенаго же и приведеннаго въ порошокъ еще болѣе. Дѣйствіе сего корня сильно слабительное, *vis drastica*. Употребляется простымъ народомъ въ изгавъ, геморой и ломотѣ. Чѣмъ принадлежишь до первой и послѣдней болѣзней, то я не могъ быть очевиднымъ свидѣтелемъ дѣйствія онаго; касательно же гемороя я знаю здѣсь одного здороваго, крѣпкаго тѣлосложенія купца, спраждающаго *haemorrhoides* сѣса, который, при ожесточеніи геморроидальныхъ припадковъ, всегда принимаетъ съ пользою мелкія спружки (гавуга) свѣжаго напертаго корня сего растѣнія. Послѣ перваго приѣма его начинаетъ сильно слабѣть, чѣмъ продолжается дня три, а иногда и чѣтыре, съ чѣмъ вмѣстѣ боли въ запятокъ и поясницѣ уменьшаются, а наконецъ и совершенно исчезаютъ. Употреб-

леніе сего растѣнія хопя и общааетъ пользу; но по причинѣ оспроты своей приѣмъ долженъ быть уменьшенъ, а самыя спружки должно даватъ въ какомъ нибудь слизиспомъ опварѣ.

2). *Синеголовникъ*, *Eryngium campestre*, принадлежитъ ad Pentandr: dygyniam и есть многолѣпнее растѣніе, распущее въ Западной Сибири, наиболѣе по пещанымъ и глинистымъ мѣстамъ, въ великомъ изобиліи, особенно въ окрестностяхъ Томска, Колывани и Барнаула. Названіе синеголовника получило, кажется, отъ своего синяго цвѣта, который замѣненъ какъ на листьяхъ, такъ и на стеблѣ. Въ вышину достигаетъ футовъ; стебель онаго колючій, который на верьху имѣетъ множество зонпиковъ, приносящихъ на концѣ синеватыя головки. Всѣ сии зонпики укрѣпляются на продолговатомъ, перепончатомъ околоцвѣтникѣ, усаженномъ шипами. Сѣмена заключаются крѣпко въ своихъ щетинистыхъ пяпилистныхъ чашечкахъ. Коренные листья изодранные, широкіе, крючковаые и колючіе; листья стебельные перисто-ланцетовидные; корень весьма длинный, темнаго цвѣта, вкусъ коего сладковатый,

а при продолжительномъ жеваніи замѣчается небольшая пріяность. Употребляется крестьянами какъ самое расптніе, такъ и корень онаго въ видѣ крѣпкаго отвара, коего выпиваютъ въ день по фунту и болѣе, для лѣченія водяной, болѣзней брюшныхъ, заваровъ печени и разнаго рода разслабленій, особливо послѣ перемежающейся лихорадки. Дѣйствіе онаго мочегонное и крѣпительное. Примѣровъ излѣченія всѣхъ сихъ болѣзней самому мнѣ видѣть не удавалось; однакожь одинъ крестьянинъ, имѣвшій, послѣ перемежающейся лихорадки, первыя начала водяной болѣзни, то есть, блѣдность лица, вялость всего тѣла и опухоль ногъ, счастливо излѣчился, какъ увѣрялъ меня, употребленіемъ декокта сего расптнія; да и самъ я былъ свидѣтелемъ, что братъ его, имѣвшій также всѣ признаки leucophlegmatiae, отъ употребленія сего декокта примѣтно поправлялся.

3). *Колба или терелиса*, *Allium ursinum*, растетъ въ Западной Сибири въ великомъ количествѣ, по лугамъ и топкимъ мѣстамъ. Принадлежитъ ad Hexandr: monogyn. Корень имѣетъ луковичный, стебель трехъугольный, листья стеблистые, fol: petiolata, яйцо-

образно-ланцетовидные, *ovato-lanceolata*, цвѣто-расположеніе представляеть *umbellam fastigiatam*. Цвѣшетъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ. Вкусъ имѣетъ острый, кошорый гораздо сильнѣе въ корнѣ, чѣмъ въ листьяхъ. Запахъ чесночный. Дѣйствіе колбы прошивускорбунное, а правѣ приписываютъ нѣкоторыя и попогонное. Употребляется какъ корень, такъ и листья простолюдимами въ пищу, вмѣсто обыкновеннаго чеснока, а сверхъ того служить и домашнимъ лѣкарствомъ прошиву цынги. Коровы, пасущіяся по лугамъ, гдѣ расцвѣтъ много колбы, наѣдаясь оной, сообщаютъ молоку непріятный чесночный запахъ.

4. *Лиственная смола* получается отъ распущей здѣсь въ великомъ количествѣ лиственицы. Здѣшніе мѣщане, особливо женскій полъ, жуютъ оную во рту почти безпрестанно. Польза отъ сего первое та, что очищаются зубы и отъ содержащагося въ ней эфирнаго масла испребляется дурной запахъ изо рта; а второе, что, дѣйствуя на десны, кои при жеваніи и погруженіи всего зубнаго вѣнчика въ смолу приходять въ непосредственное соприкосновеніе съ оною, своими бальзамическими частями укрѣпляютъ

ихъ, а пошому весьма помогаешъ въ болѣзни десень, stomасасе называемой, да кажется и служишъ предохранительнымъ опъ оной средспвомъ: ибо сія болѣзнь никогда не замѣчается у жующихъ сію смоу. По моему мнѣнію, шаковое жеваніе смолы гораздо выгоднѣе употребленія зубныхъ порошковъ: ибо сіи послѣдніе, сколь бы ни были нѣжны и шонки, но всегда при шреніи порпяпъ зубный глазурь, опъ чего въ послѣдспвіи произраждаешся caries; жеваніе же смолы ни какъ не можешъ имѣшъ за собою сего неудобспва; да и проглашываемая слюна, напишываясь бальзамическими часпями, не только не можешъ бышъ вредною, но должна счишашся еще и полезною. Сверхъ того лисшвеничная смола и пошому заслуживаешъ преимущество предъ зубными порошками, что въ шѣхъ спранахъ, гдѣ, какъ въ Сибири, много лисшвеницы, она сосшавляешъ домашнее средство, получаемое изъ нашуральной ашпеки.

Китайскія лѣкарспва вывозяшся купцами изъ Кяхты, а пошому и въ употребленіи большею частію между людьми, производящимъ торгъ съ Китаицами; опъ нихъ переходъ

дѣлѣ уже и къ прочимъ классамъ народа. Обыкновеннѣйшія изъ нихъ сунѣ:

1. *Куго*. Наружный видъ онаго походитъ на миндальное сѣмя, очищенное отъ скорлупы своей, съ шюю только разностию отъ миндаля, что концы закруглены гораздо болѣе и на срединѣ выдается родъ горба; съ одного конца примѣчается даже росшокъ. Цвѣтъ сѣмени изъ-желта бурый, по краямъ съ просвѣтомъ, а держимъ будучи пропивъ пламени зажженной свѣчи, представляется полупрозрачнымъ. Отъ какого получается распѣнія, неизвѣстно; запаху особеннаго не имѣетъ. Вкусъ онаго весьма горькій. Употребляется въ видѣ водяной настойки слѣдующимъ образомъ: берутъ одно или два шаковыхъ сѣмянъ, кладутъ въ спаканъ, наливаютъ его полною горячею водою и по охлажденіи выпиваютъ разомъ. Послѣ принятія сей настойки больной чувствуетъ тошноту, головокруженіе, выступаетъ сильный потъ, потомъ слѣдуетъ крѣпкій сонъ, который продолжается нѣсколько часовъ. Изъ сихъ припадковъ можно, кажется, судить о наркотическомъ дѣйствіи сего лѣкарства. Употребляясь въ судорогахъ, въ истериче-

скихъ припадкахъ и падучей болѣзни. Кипайцы носятъ сіе средство при себѣ въ мѣшечкахъ и почти безпрестанно одно изъ шаковыхъ сѣмянъ жуютъ, будпо бы для укрѣпленія желудка.

2. *Зынзуй* образуетъ цилиндрическія, непрозрачныя палочки, толщиною равныя шаковымъ *lapidis caustici*, а длиною дюйма въ три и болѣе, на верхнемъ концѣ коихъ находящіяся скважинки, для продѣванія шелку; цвѣтъ сихъ палочекъ бываетъ красный и бѣлый; при основаніи палочки нѣсколько толще, нежели въ прочей длинѣ своей. Поверхность краснаго зынзуя гладкая, сильно блестящая, а бѣлаго не столь ровная и не имѣетъ никакого блеску. По переломленіи палочки изломъ представляется зернистый, крѣпость оныхъ не весьма велика, такъ что удобно могутъ скоблишься ножомъ, и послѣ скобленія красный шеряетъ свой блескъ и дѣлается оранжевымъ. Запахъ зынзуй имѣетъ свой собственный, весьма пронзательный, сходный съ камфорнымъ и искусовымъ, копорый гораздо сильнѣе въ красномъ зынзуѣ, чѣмъ въ бѣломъ. Порошокъ зынзуя возбуждаетъ сильное чиханіе. Вкусъ имѣетъ

*

острый; посыпанъ будучи на раскаленные угли, бѣлый зынзуй издаесть запахъ пригорѣлыхъ живописныхъ часпей, а красный горитъ съ синеватымъ пламенемъ и издаесть сѣрный запахъ. Пробы съ разными пропивождѣйствующими средспвами показали слѣдующее:

1. Чѣто зынзуй ни въ холодной, ни въ кипячей водѣ не растворяется и чѣто при погруженіи порошка его въ послѣднюю образующся на поверхности воды масляныя блеспки.

2. Въ деревянномъ маслѣ и прочихъ жирныхъ маслахъ не растворяется; но достаточное количество порошка зынзуя, расплываясь въ ономъ, образуесть родъ мази (Linimentum).

3. Въ шерпеншинномъ маслѣ вовсе не растворяется.

4. Въ лепучемъ нашатырномъ спиртѣ растворяется и сообщаетъ оному номеранцовый цвѣтъ.

5. Въ Гофманскихъ капляхъ несовершенно растворяется и сообщаетъ онымъ оранжевый цвѣтъ и запахъ, подобный шаковому яншарнаго масла.

6. Крѣпкая водка, будучи налита на порошокъ зынзуя, опдѣляетъ весьма тонкіе

нары, принимаетъ палевый цвѣтъ, а на днѣ дѣлается осадокъ. Изъ растворимости зынзуя въ эфиръ и нашатырномъ спиртѣ, изъ оставленія послѣ испаренія какой-то пахучей экстрактивной матеріи, равно какъ изъ плаванія на поверхности воды, при опущеніи въ оную порошка его, масляныхъ блесковъ и искусоваго запаха заключить слѣдуетъ, что между составными частями онаго долженъ быть мскусъ, а потому и внутреннее употребленіе онаго съ надлежащею осторожностію, кажется, можетъ быть допущено.

Употребленіе зынзуя, сколько мнѣ извѣстно, есть наружное и производится слѣдующимъ образомъ. По приведеніи въ порошокъ палочки зынзуя, распускается оный въ деревянномъ маслѣ, коимъ прутся на подобіе мази. Дѣйствіе онаго разрѣшающее (*resolvens*), а потому и употребляется въ ломотѣ, холодныхъ опухоляхъ и затвердѣніи грудей у женщинъ (*induratio mammarum*). Другой образъ употребленія его состоишь въ нюханіи, которое приноситъ величайшую пользу въ головокруженіи, насморкѣ и обморокахъ. Скважинка, дѣлаемая на верхнемъ концѣ палочекъ зынзуя, сквозь которую подрѣ-

раемая шелковинка показываетъ, что онъ
долженъ быть въ большомъ употребленіи
и что его носятъ съ собою, подобно какъ
наши дамы имѣютъ при себѣ, для предохра-
ненія отъ обмороковъ, въ прекрасныхъ пузырь-
кахъ ароматные спирты и разнаго рода ду-
хи. Наружное употребленіе сего средства
въ видѣ мази особенно похваляется in indu-
ratione mammarum.

IV.

ЗАМѢЧАНІЯ О ЛѢЧЕНІИ ПОРѢЗАН- НЫХЪ РАНЪ (Vulnera incisa).

Я. Сейма.

Въ то время, когда ученые практики лѣчили всѣ раны, даже простыя и склонныя къ заживленію, поспешенно употребляя такъ названныя очищающія, сваривающія, производящія плоть (incarnantia) и наводящія рубецъ средства; изъ коихъ наибольшая часть была болѣе или менѣе ѣдкія, и вообще присущимъ своимъ препяществовали соединенію, исключая, когда оно происходило чрезъ наращеніе плоти, было не удивительно, что успѣхъ опличнаго отъ сего способа лѣченія, употребляемаго *знахарями*, спарухами и простонародными лѣкарями и состоявшаго въ одномъ высасываніи ранъ, прикладываніи бальзамовъ и заговариваніи, сдѣлалъ сильное впечатлѣніе на народъ вообще, и даже на самыхъ Врачей, кошорые наконецъ рѣшились

не только узнать сей способ лѣченія, но и употребить его для пользы своихъ больныхъ,

Успѣхъ превзошелъ ихъ чаяніе. На опытѣ оказалось, что раны скорѣе заживали, нежели какъ предполагали, и лѣчение чрезъ соединеніе краевъ ранъ (*per primam intentionem*) такъ понравилось ученымъ, что простолюдимы начали пому смѣяться.

Послѣ того многіе Хирурги и Анапомы изслѣдовали процессъ, посредствомъ котораго совершается первоначальное соединеніе; однако, не смотря на постепенное усовершенствованіе нашихъ объ немъ понятій, практика претерпѣла мало измѣненія и еще и теперѣ имѣетъ въ себѣ много суевѣрнаго и жестокаго. Всякую порѣзанную рану, случайно либо съ намѣреніемъ сдѣланную, по перевязаніи ея, сообразно мнѣнію Хирурга, плотно увиваютъ длинною и искусно наложенною повязкою. И хотя больной скоро жалуется на жаръ, боль и давленіе и проситъ облегченія, однако всѣ его прозбы тщетны, повязка остается неприкосновенною до утра четвертаго дня, когда должна воспослѣдовать долго желаемое и спрашное перевязываніе. Теперь не трудно понять,

почему древніе знахари завязывали раны на опредѣленное время. Они хотѣли предохра-
нить ихъ отъ вредныхъ мазей, бывшихъ въ
большомъ употребленіи у ученыхъ Лѣкарей,
и по тому полагали, что ихъ бальзамы и за-
говариванія могутъ дѣйствовать съ пользою
только впайнѣ. Въ позже время благора-
зуміе повелѣвало имъ ограничивать безпокой-
ство и нетерпѣніе больного не долѣе, какъ
сколько совершенно необходимо, а опытность
научила ихъ, что первоначальное соединеніе
раны, если оно можетъ имѣть мѣсто, со-
вершается въ теченіи трехъ дней, и это
они приняли за срокъ своего таинственнаго
процесса.

Но намъ извѣстно, что соединеніе ранъ
зависитъ отъ особливаго жизненнаго про-
цесса, а не отъ силы бальзамовъ и суевѣр-
ныхъ обрядовъ; почему же мы откладыва-
емъ впору перевязку ихъ до истеченія се-
мидесяти двухъ часовъ по наложеніи первой?
Скажутъ: опытность вѣковъ такъ научила.
Но успѣшенъ ли въ самомъ дѣлѣ сей спо-
собъ? Всегда ли рана находится соединенною
при снятіи первой перевязки? На оба вопроса
я отвѣчаю отрицательно. На четвертый

день, по надлежащемъ приготовленіи пластырей и повязокъ, теплой воды и губки, оспорожно снимается бинтъ—дѣло часто не совсѣмъ легкое, если кровь скленила его различные обводы и засохла около булавокъ, — послѣ сего опнимающія компрессы одинъ за другимъ и рана открывается, и когда Хирургъ и предположащіе ласкались надеждою найти рану соединенною, спуская смраданаго гноя большею частию прекращающіе ихъ преждевременныя поздравленія. Обыкновеннѣе однако случается, что гной, раздѣливъ края раны, скопляется въ большомъ количествѣ между раною и непосредственно наложеннымъ пластыремъ. Само по себѣ явствуетъ, что въ обоихъ случаяхъ губы раны бывающіе раздѣлены такъ, какъ будто бы между ними, по Gallico, былъ положенъ свершокъ корпіи. Въ самомъ дѣлѣ Французскій способъ благоразумнѣе Англійскаго; сообразно своему мнѣнію объ образованіи гноя, они доставляютъ ему свободный выходъ и щѣмъ опвращающъ происхождение искусственныхъ, часто обширныхъ и разсироживающихся частицъ нарывовъ, нерѣдко случаю-

щихся при неблагоразумномъ спараніи залѣ-
чишь рану чрезъ первоначальное соединеніе.

Вразсужденіи хорошаго успѣха, какой
имѣли прежде проспонародные Лѣкари опъ
плошнаго перевязыванія ранъ, я повѣрю, что
онъ нѣсколько увеличенъ испориками, копо-
рые, не будучи сами Хирургами, привыкли ви-
дѣть жестокіе и несправедливые поступки
людей. Но при всемъ томъ мнѣ кажется,
что первоначальное соединеніе чаще удава-
лось во времена Талиакопи, нежели теперь:
ибо тогда еще не было изобрѣнено главное,
можно даже сказать, вѣрное препящствіе
соединенія ранъ, я разумѣю, липкій пластырь.
Я не говорю, что узенькая полоска или двѣ
сего пластыря, приложенныя накрестъ ра-
ны, непременно воспрепятствуютъ ея сое-
диненію; но я смѣло утверждаю, что если
вся рана будетъ покрыта полосками, прило-
женными шакъ плотно, что край одной бу-
детъ нѣсколько покрывать другую, то мо-
жно быть совершенно увѣреннымъ, что по
испеченіи шрехъ дней образуется нарывъ.

Испекающая изъ поверхности раны кровь,
не имѣя выхода, скопляется, раздвигаетъ гу-
бы раны и расстягиваетъ; посему не подь-

ко препятствуетъ ея соединенію, но и возбуждаетъ въ частяхъ сильнѣйшее противо-дѣйствіе; отъ шого жаръ, боль, жажда и всѣ другіе лихорадочные припадки—образуются гной и происходитъ нарывъ.

Для воспрепятствованія соединенію раны не нужно кровоизліянія: поелику въ ранѣ перваго, а частію и втораго дня всегда происходитъ обильное отдѣленіе сывороточной жидкости, которая также дѣйствительно препятствуетъ поверхностямъ соединиться, разумѣется, если поверхности будутъ значительной величины; но самыя малыя раны заживаютъ чрезъ первоначальное соединеніе, сколько бы мы тому ни противоподѣйствовали.

Я болѣе всего желаю обратишь вниманіе читателя на обильное и непрерывное отдѣленіе сывороточной жидкости во время соединительнаго процесса: ибо, имѣя это въ виду, не трудно понять, по чему запечатываніе ранъ составляетъ наилучшее средство содержать ихъ открытыми, либо сыскать лучший способъ къ достиженію инаго успѣха.

Изъ сказаннаго явствуетъ, что опіюнь не должно усиливаться закрыть, опроверженіе

совершенно; давленіе должно быть произведено болѣе на дно, нежели на края раны; кровь не должна засыхать на губахъ раны: ибо хощя кровь составлять наилучшій бальзамъ, т. е., наименѣе раздражающій, однако она часто уменьшаетъ сыворопочное опдѣленіе и тѣмъ препятствуетъ соединенію; опверстіе нужно обпираться и содержать сухимъ до тѣхъ поръ, пока изъ него опдѣляется какая либо влага.

Для выполненія сихъ показаній я совѣтовалъ бы, во первыхъ: гдѣ нужно, содержать края раны въ соприкосновеніи между собою; швы предпочипать пласпырямъ, поелику они дѣйствуютъ гораздо глубже и мало либо и совсѣмъ не препятствуютъ выходу жидкости. Нѣкоторые Хирурги употребляютъ вмѣстѣ проколы и пласпыри; но я этого не одобряю, ибо пласпыри, дѣйствуя только на поверхность, всегда крѣпко закрываютъ опверстіе раны, либо даже заворачиваютъ края внутрь, а при этомъ не только не оказываютъ никакого давленія въ глубину, но еще болѣе раздвигаютъ подъ ними лежащія части и благопріятствуютъ происхожденію пазухъ; проколы же, сдѣланные

довольно тѣсно, могутъ быть всегда достаточны для произведенія нужнаго стягиванія. Можно однакожь замѣтить, что маленькое отдаленіе губъ раны въ первое время отнюдь не вредно: ибо благопріятствуетъ свободному испеченію и уничтожается, коль скоро начинается соединеніе.

Во впорыхъ: я совѣпывалъ бы оставить всѣ длинныя, сложныя повязки, копорыхъ не можно спянуть или ослабить по часпямъ, либо снять, не безпокая больного.

Приложивъ компрессы по споронамъ раны, удобно можно произвести давленіе проспымъ способомъ, не упопреляя обводныхъ повязокъ, на прим: при ранахъ шуловища широкій кусокъ холспины, длиною нѣскольکو болѣе окружности шѣла, и на концахъ разрѣзанный по длинѣ на три или на чепыре часпи, будетъ дѣйствовать довольно сильно и его удобно поправлять, спягивая или ослабляя его концы, и снять въ одну минупу.

Для ранъ конечносшей можетъ служить такимъ же образомъ сдѣланная повязка, а для кулпы я могу рекомендовать самый проспый приборъ, копорый часпо избавлялъ меня отъ многоа безпокойства. Приложивъ

компрессъ (rollet) по обыкновенному сверху внизъ, такъ чшобы онъ проспирался на нѣсколько дюймовъ отъ кульшы, надобно его укрѣпишь, попомъ приколотъ либо иначе укрѣпишь на каждой споронѣ по нѣсколькѣ узенькихъ полосокъ холстины, перевесъ ихъ чрезъ кульшу и связаъ одну съ другою.

Наконецъ я совѣпывалъ бы прикладывать къ ранѣ сухіе компрессы, коль скоро будетъ примѣпно хопя немного влажноти.

При соблюденіи сихъ правилъ первоначальное соединеніе рѣдко будетъ неудачно, какъ я въ шомъ увѣрился изъ опытности. А сколько это важно во всѣхъ ранахъ, особливо же въ сопряженныхъ съ переломами костей, я почишаю излишнимъ говоришь Хирургамъ.

Edin. Med. et Surg. Journal. N LXXXIV.

V.

**СЪРНОКИСЛЫЙ ХИНИНЪ, РАЗСМА-
ТРИВАЕМЫЙ КАКЪ ВРАЧЕБНОЕ
СРЕДСТВО.**

Въ Medicinisch - Chirurgische Zeitung 1828.
1. Bd. представлено слѣдующее о семъ пред-
метѣ извлеченіе изъ сочиненія Доктора *Фр.
Иос. Виттманна*, удостоеннаго Гарлемскимъ
Общеспвомъ Наукъ награды *).

I. О достоинствѣ сѣрнокислоао хинина
вообще и въ особенности въ лихорадкахъ.
Дрезденскій Профессоръ *Фицинусъ* первый
обратилъ, въ 1816 году, вниманіе на *цинхо-
нинъ*, копорымъ названіемъ бывшій Харь-
ковскій Профессоръ *Гизе* уже прежде озна-

*) Das schwefelsaure Chinin als Heilmittel betra-
chtet. Eine von der holländischen Gesellschaft
der Wissenschaften zu Harlem am 26 May 1825
gekrönte Preisschrift, von D. Fr. Ios. Witt-
mann. 1827.

чилъ вещество, извлекаемое изъ хинной корки помощію виннаго спирта. Чепыре года послѣ того *Пеллетье* и *Кавантонъ* открыли въ сей коркѣ и другое ей свойственное вещество, которое назвали *хининомъ*, а въ 1821 году сдѣлалось извѣстнымъ употребленіе сихъ веществъ для излѣченія лихорадокъ и другихъ періодическихъ болѣзней. Въ 1823 и 1824 годахъ господствовавшія около Майнца лихорадки подали Г-ну *Виттману* случай узнать на опытѣ пользу сѣрно-кислаго хинина въ сихъ болѣзняхъ. Счастливыи успѣхъ своихъ опытовъ Г. В. приписываетъ наипаче добротѣ лѣкарства, которое приготавливали искусные аптекари, и замѣчаетъ припомъ, что аптекарь долженъ стараться, дабы въ семъ препаратѣ не было примѣси сѣрнокислой извести или глины, ни избытка сѣрной кислоты. Желая болѣе удостовѣриться въ дѣйствія сѣрно-кислаго хинина, Г. В. дѣлалъ фізіологическіе и терапевтическіе опыты самъ и просилъ о томъ другихъ почтеннѣйшихъ и досповѣрныхъ Врачей. Изъ сравненія своихъ фізіологическихъ опытовъ съ опытами *Эллиотсона* и *Мажанди* Г. В. вывелъ слѣдующія заключенія.

1. Сѣрноокислый хининъ не имѣетъ никакихъ свойствъ, подобныхъ свойствамъ простыхъ веществъ, извлеченныхъ изъ наркотическихъ средствъ. 2. Въ малыхъ приемахъ онъ совсѣмъ не обременяетъ желудка, и даже въ большихъ приемахъ немного его беспокоитъ. 3. Сѣрноокислый хининъ, особливо въ большихъ приемахъ, производитъ состояніе подобное лихорадочному, а именно: усталость, большое возбужденіе (кровеносной системы)? съ тугопостию головы. Слѣдствія терапевтическихъ наблюденій суть самыя благопріятныя. Средствомъ симъ скоро и надежно излѣчены: претѣдственные лихорадки, въ числѣ коихъ были такія, противъ которыхъ хины не лзя было употребить по слабости желудка или по особенному отвращенію къ ней больныхъ; лихорадки у дѣтей; лихорадки четвертодневныя, ежедневныя съ самыми малыми перемежками; также ежедневныя лихорадки, которыя иногда послѣ другихъ болѣзней, при слабости шѣла, появляются ввечеру съ легкимъ ознобомъ и имѣютъ видъ медленной; одинъ случай лихорадки пятодневной; лихорадки осеннія; лихорадки съ постоянною, острою болью въ сторонѣ селезенки; эпи-

демическія лихорадки съ желчною рвопою; лихорадки болопныя; febris intermittens larvata; наконецъ лихорадки злокачественныя и произведенныя лихорадками худосочія.

2. *Особенное дѣйствіе сѣрнокислаго хинина и его отношеніе къ другимъ препаратамъ хины.* 1. Сѣрнокислый хининъ есть особенное, основное, дѣйствительное вещество хины. 2. Особенное его дѣйствіе состоитъ преимущественно въ его проливи-хорадочной силѣ. 3. Свойство хинной корки излѣчивать лихорадки соотвѣтствуетъ содержанию въ ней хинина или цинхонина. 4. Хинная корка, по особенному смѣшенію всѣхъ составныхъ ея частей: дубильнаго, ароматнаго вещества, хинина, цинхонина, смолистаго вещества и проч., имѣетъ особливый цѣлительныя силы въ разныхъ болѣзненныхъ состояніяхъ, каковыхъ всѣхъ силъ не лзя и не должно приписывать хинину. Вразсужденіи излѣченія лихорадокъ хининъ имѣетъ слѣдующія преимущества предъ хинною коркою и ея препаратами: чистый и неподмѣшанный хининъ имѣетъ вѣрную, удобопредѣлимую силу излѣчивать лихорадки; хинная корка имѣетъ шуже силу только по коли-

честву содержащагося въ ней хинина. Хининъ дѣйствителенъ въ самыхъ малыхъ, гра-
нами взвѣшиваемыхъ приемахъ, а хины въ
порошкѣ, даже самой лучшей, надобно при-
нять нѣсколько унцій, для излѣченія лихо-
радокъ. Тоже надобно разумѣть и объ опва-
рѣ. Хининъ вообще не имѣетъ ничего не-
пріятнаго; его можно давать и дѣтямъ, и онъ
не ошягчаесть желудка; напротивъ того хи-
ны въ порошокъ многіе не могутъ перенѣсть,
и она у многихъ обременяетъ желудокъ де-
ревянистою своею часпію. Опваръ и эк-
спраклъ хины хотя и легче принимаютъ, но
за то они слабо дѣйствуютъ противъ ли-
хорадки. Не смотря на сіи преимущества, Г.
В. полагаетъ, что хина, иногда въ порош-
кѣ, а иногда въ опварѣ или выпяжкѣ, на-
всегда останется превосходнымъ пропиву-
гнилоспнымъ, крѣпительнымъ, специфически
возбуждающимъ лѣкарствомъ въ злокаче-
ственныхъ, гнилыхъ и нервныхъ горячкахъ, во
всѣхъ хроническихъ болѣзняхъ, въ коихъ нуж-
но употреблять легкія возбуждающія и крѣ-
пительныя средства; въ бѣльшей часпи ху-
досочій, несопровождаемыхъ мѣстнымъ воспа-
леніемъ и пребующихъ пропивугнилоспныхъ

и крѣпительныхъ средствъ; въ изнуреніи и слабости послѣ острыхъ болѣзней, или большой потери соковъ, особливо послѣ кровопеченій, слизепеченій, при бѣлахъ, при переходѣ воспаленія въ помертвѣніе; для преодоленія госпитального помертвѣнія при ранахъ, для поправленія гноя худокачественныхъ язвъ и для другихъ намѣреній въ хирургическихъ болѣзняхъ.

3. *Употребленіе сѣрноокислаго хинина и правила, кои притомъ нужно соблюдать.* Сѣрноокислаго хинина не должно употреблять въ горячкахъ съ возвышенною жизнедѣятельностію либо съ мѣстнымъ воспалительнымъ спаданіемъ. Напротивъ того въ горячкахъ съ уменьшенною жизнедѣятельностію, адинамическихъ, нервныхъ, нервныхъ, заразительныхъ (typhus), средство сіе въ послѣдствіи, вѣроятно, окажется столько же полезнымъ, какъ и другія приговощенія хины. Касательно нервной заразительной горячки наблюденія *Дюпре, Эллиотсона* и другихъ подтверждаютъ его дѣйствительность. Пользу сѣрноокислаго хинина во всѣхъ родахъ лихорадокъ доказываетъ опытность. Его, какъ и хину, должно давать во время пе-

ремежки (аругеѣа), и его прошивулихорадочная сила, равно какъ и сила хины, уничтожается всякою матеріальною или органическою причиною, поддерживающею лихорадку. Приемы сего лѣкарства различествуютъ по роду лихорадки (въ злокачественныхъ лихорадкахъ нужно, чтобы больной во время перемежки принялъ 20 до 24-хъ гранъ), возраста и сложения больного. Г. В. даетъ его преимущественно въ порошокъ либо въ растворъ съ нѣсколькими каплями сѣрной кислоты.

Съ 1825 года, когда Г. В. отослалъ свое сочиненіе Гарлемскому Обществу, онъ имѣлъ еще много случаевъ испытать дѣйствіе сѣрнокислаго хинина. Слѣдствія сихъ наблюдений присоединилъ онъ къ своему сочиненію. Онъ нашелъ сѣрнокислый хининъ полезнымъ въ подкожной водяной болѣзни (анасагса), происшедшей отъ четвертодневной лихорадки, въ лихорадкѣ изнурительнаго свойства, въ гнилой горячкѣ, въ злокачественной непрерывной горячкѣ, которая убиваетъ чрезъ истощеніе силы сердца, прежде нежели больной достигнетъ начала выздоровленія (Сочинитель присовокупилъ весьма хорошія замѣ-

чанія о распознаніи сей болѣзни *); въ продолжительной очень упорной четвертодневной лихорадкѣ Г. В. сообщилъ и дешевѣйшій способъ употребленія сѣрнокислаго хинина, заимствованный изъ *Annali universali di Medicina d' Omodei 1825 N 103* и 104, а именно: при грана tartar. stibii et potassæ и шесть гранъ sulphatis chinini смѣшиваются съ надлежащимъ количествомъ сахара и раздѣляются на шесть равныхъ частей. Во время перемежки больной принимаетъ каждые два часа по порошку. Обыкновенно послѣ перваго случается водянистая рвота горькаго вкуса, но прочіе приемы такого дѣйствія не производятъ. Нѣсколько позже появляется боль въ животѣ и больного слабитъ. Лихорадка почти всегда симъ прекращается. Г. *Виттманъ* нашелъ полезнымъ сей способъ лѣченія у людей крѣпкаго тѣлосложенія, особливо деревенскихъ; но для людей чувствительныхъ, для женщинъ и дѣтей онъ предпочитаетъ одинъ сѣрнокислый хининъ. Далѣе слѣдуетъ извѣ-

*) Въ извлеченіи они не помѣщены, и не имѣя оригинала, я не могу ихъ сообщить.

снѣ о превосходномъ дѣйстви сѣрноки-
слаго хинина in febre intermittente apoplec-
tica зорогова, свирѣпствовавшей въ 1826 году
въ сѣверныхъ странахъ Голландіи; in febre
intermittente quotidiana larvata; in. f. inter-
mitt. bullosa. П. Ч.

VI.

ВОСПАЛЕНІЕ КЛѢТЧАТОЙ ПЛЕВЫ.

1. Извлеченіе изъ клинической лекціи Г-на *Ирле* (Earle), помѣщенной въ The London Medical and Physical Journal, 1827. Vol. II. January, June.

Подъ обширнымъ воспаленіемъ клѣтчатой плевры Г. *Ирле* разумѣетъ всѣ случаи, которые извѣстны подъ названіемъ: Erysipelas phlegmonosum или erysipelas a vulneribus. Обыкновенная оспрая рожа, по его мнѣнію, есть спраданіе кожи, а при флегмонозной рожи спраждутъ наипаче подъ кожею лежащія часпи и сухожильныя расстяженія. Красноша кожи, замѣчаемая въ послѣднихъ случаяхъ, зависить болѣе отъ болѣзненныхъ перемѣнъ, происходящихъ въ подкожной клѣтчатой плевѣ, нежели отъ спраданія самой кожи. Теченіе воспаленія клѣтчатой плевры бываетъ очень скорое, и если воспаленіе не будетъ

ослаблено, то оно оканчивается обширным нагноением и помертвением клѣпчатой плевы и сухожильнаго распяженія, за которыми слѣдуетъ обширное помертвѣніе покрововъ. Г. Ирле видѣлъ нагноеніе общихъ покрововъ, воспослѣдовавшее въ 36 часовъ. Въ началѣ болѣзни по большей части находился явственнаго воспаленіе всасывающихъ сосудовъ, но скоро оно смѣшивается съ опухолью всего члена, такъ что его болѣе различить не возможно. Опухоль увеличивается скоро и на большое пространство; поверхность ея имѣетъ темнокрасный цвѣтъ. Въ первомъ періодѣ покровы на осязаніе значительно упруги и оказываютъ больше сопротивленія, нежели при опекѣ. Позже часто бываетъ примѣтно прещаніе, какъ бы воздушной опухоли или особливая пѣнчатая плотность, а по разрѣзѣ спраждающаго мѣста въ глубинѣ оказывается уже начавшееся распяженіе. Лѣченіе состоитъ въ большихъ, продолговатыхъ разрѣзахъ воспаленныхъ частей до самыхъ сухожильныхъ распяженій и мышцъ, сдѣланное, если можно, до наступленія нагноенія. Происшедшее отъ того кровотеченіе поддерживать, сколько воз-

можно долѣе и весь членъ покрыть теплою припаркою. Внутрь *Submurias hydrargyri cum opio et antimonial* и хорошее слабительное изъ Александрійскаго листа и соли.

2. Эдинбургскій Профессоръ *Дунканъ*, сынъ, представляетъ въ *Transactions of the medico-surgical society of Edinburgh vol. I. 1824* тридцать четыре случая сей болѣзни, и потомъ присоединяетъ описаніе оной, вкратцѣ здѣсь слѣдующее.

Причины. Кровопусканіе, перевязаніе венъ, раненія при вскрытіи шруповъ, болѣзненные отдѣленія, попавшія въ рану, иногда чрезвычайно малую, острия вещества, попавшія такимъ же образомъ, простыя уколосія и раненія, ушибы и шомуподобное. Ему кажется вѣроятнымъ, что состояніе воздуха имѣетъ вліяніе на происхожденіе болѣзни: поелику она въ одно время чаще случается, чѣмъ въ другое. Сіе однако не зависить отъ температуры воздуха. Въ городахъ, кажется, болѣзнь сія чаще встрѣчается, нежели въ деревняхъ, въ больницахъ чаще, нежели въ частныхъ домахъ. Расположеніе къ болѣзни, по видимому, зависить наипаче отъ особенной чувствительности кожи: поелику нѣко-

порые люди поражаются ею даже послѣ за-
нятія надъ свѣжимъ трупомъ, не имѣя ни-
какого поврежденія покрововъ на рукахъ, а
другіе и при ранахъ на рукахъ оспаюются здо-
ровыми. У нѣкопорохъ мѣсто укушенія пѣ-
вицею переходить въ нагноеніе, а у другихъ
и испанскія мушки едва раздражаютъ кожу.

Припадки у разныхъ людей различны. У нѣ-
копорохъ болѣзнь начинается тифозными
припадками, а мѣстное спраданіе появляеш-
ся спустя три или чепыре дня; большею
частію однако мѣстная болѣзнь предшеспуе-
етъ спраданію всего организма. Иногда бо-
лѣзнь ограничивается спраждающимъ членомъ,
но часто проспираетъ на шуловище и при-
чиняетъ смерть.

Опаснѣйшій видъ болѣзни имѣетъ ходъ за-
разишельныхъ болѣзней. На зараженномъ мѣ-
стѣ появляется язва, а потомъ слѣдуетъ
общее спраданіе, сходное съ высыпкою го-
рячкою оспрыхъ сыпей; послѣ сего сильное
воспаленіе клѣпчатой плевы какой либо ча-
спи, скоро распротраняющееся и въ ходъ
своемъ совсѣмъ несоотвѣтствующее пер-
воначально зараженному мѣсту, которое
большею частію скоро заживаетъ. Первона-

чальные припадки, по удобопонятной причинѣ, обыкновеннѣе появляются на ручной кисти или плечѣ. Вторичное воспаление обнаруживается преимущественно подъ мышкою, откуда простирается на шею, грудь или по боку внизъ, обыкновенно на спраждущей сторонѣ пѣла, но иногда переносится и на противоположную сторону. Оно бываетъ мало возвышенное, гладкое и ровное, безъ особенной въ какомъ либо мѣстѣ швердоспи или зерна (focus). Болѣзнь оплщается чувствованіемъ при осязаніи спраждущей части, состоящимъ въ большемъ или мѣньшемъ напряженіи. Отъ прижатія перстомъ въ опухоли не остаётся ямки, но плотность ея бываетъ средняя между флегмонозною швердоспію, отёкистою мягкоспію и упругоспію воздушной опухоли. Сіе неясное чувство зыбленія часто было причиною напрасныхъ разрѣзовъ. Боль почти всегда сильная, и часто появляется прежде красноты. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вторичное воспаление, даже безъ красноты, переходитъ въ обширное нагноеніе, и во всѣхъ наспоящихъ случаяхъ сей болѣзни воспаление кожи есть вторичное, слѣдствіе распространившагося

на кожу воспаленія клѣпчатой плевры. Пузыри появляются не прежде, какъ въ позднѣйшемъ періодѣ болѣзни. Естественная теплоота части бываетъ уменьшена, что зависитъ отъ скоропоспѣжнаго измѣненія въ клѣпчатую плевру; однако Г. *Дунканъ* рѣже замѣтилъ сіе явленіе, нежели О' *Галларанъ* и *Гомъ*. Въ бѣльшей части случаевъ была припомъ пифозная горячка; иногда даже шрудно было рѣшить, не состояла ли болѣзнь въ нервной горячкѣ, съ особливими мѣспными припадками. Горячка начиналась иногда исподоволь, а иногда сильно, и въ худшихъ случаяхъ скоро достигала высшей степени. Постоянное положеніе больного на спинѣ, бессонница, рѣдко продолжительный бредъ были примѣчательнѣйшія явленія сей болѣзни. Нѣкопорые еще при жизни издавали шрупный запахъ, а у одного больного выступилъ смрадный, цвѣпный, рѣшителный потъ.

Исходъ. Воспаленіе клѣпчатой плевры рѣдко разрѣшается. Г. *Дунканъ* ниоднажды невидѣлъ сего исхода въ шѣхъ случаяхъ, въ коихъ болѣзнь произошла отъ мѣспнаго поврежденія и уже появились опасные припадки. Вшорой исходъ составляетъ образованіе

нарыва, причемъ излившаяся пасока, вѣроятно, запираетъ клѣпочки и тѣмъ ограничиваетъ воспаленіе. Третій и въ трудныхъ случаяхъ обыкновеннѣйшій исходъ есть обширное нагноеніе *), случившееся у выздоровѣвшихъ и у умершихъ. Если воспаленіе простирается на клѣпчатую плеву, покрывающую сыворочныя оболочки, то и сіи принимаютъ въ ономъ участіе. Кости также не безопасны отъ сей болѣзни, и Г. Дужканъ находилъ ребра поврежденными костюдою и обнаженными отъ надкостной плевы. Смертію оканчивается болѣзнь нерѣдко на вто-

*) Какъ въ примѣрѣ, описанномъ въ Ч. X. № 2 и 3 В. М. Ж. Вообще болѣзнь сія у насъ, кажется, не такъ опасна. Изъ шести или семи встрѣпившихся мнѣ случаевъ только въ упомянутомъ воспослѣдовало обширное нагноеніе съ помертвѣніемъ. Прочіе всѣ окончились благополучно при простомъ лѣченіи, въ которомъ смягчающія припарки и fomentum comune Ph. Castr. теплые составляли главные средства. Болѣзнь большею частію приключалась послѣ кровопусканія.

рой или третій день, а иногда чрезъ столько же недѣль и позже.

Вскрытіе триповъ. Поелику болѣзнь постепенно распростирается отъ одной части на другую, то и при вскрытіи триповъ въ разныхъ частяхъ находящіяся различныя измѣненія. Посему подъ конецъ пораженная клѣпчатая плева, на прим: между нижними ребрами и подвздошною костью, бываетъ только опѣкшая и сосудистая, сыворопка, въ ней содержащаяся, жидкая и свѣшная или съ красными полосками и удобно выпекается изъ разрѣза. Гдѣ воспаленіе продолжалось долѣе, тамъ и жидкость гуще, темнѣе, но не гноевидна. Послѣ сего клѣпчатая плева представляется наполненною бѣлымъ полужидкимъ веществомъ, которое по разрѣзѣ не выпекается, но только скопляется въ ономъ въ большомъ количествѣ и раздвигаетъ жирныя частицы. Въ слѣдующемъ за симъ періодѣ излившееся вещество также бываетъ непрозрачно, бѣловато, красновато или зеленовато, но жиже, такъ что изъ разрѣза уже истекаетъ гноевидная матерія. Въ послѣднемъ періодѣ, по разстроении клѣпчатой плевы, находящи-

ся гнойныя скопленія съ перепончатыми комками; но еще заключенныя въ отдѣльныхъ полоскахъ, которыя поспепенно соединяющія между собою.

Распознаніе. Внимательный Врачъ едва ли смѣшаетъ воспалительную опухоль (phlegmone) съ неограниченнымъ воспаленіемъ клѣпчатой плевы, а шѣмъ менѣе простую рожу. Огнь воспаленія вень опличаетсѣ сія болѣзнь спруновиднымъ напряженіемъ вены и болью при прикосновеніи, ограничивающеюся направленіемъ вены. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ только съ трудомъ можно различить сіи двѣ болѣзни, и разлчїе ихъ трудно объяснить словами.

Для опвращенія болѣзни Г. *Дунканъ* совѣтуетъ, при вскрытіяхъ пруповъ, надѣвать перчатки и предъ вынятіемъ внутренностей руки намазывать камфорнымъ масломъ либо просто свинымъ саломъ, но прежде того внимательно осмопрѣть руки, нѣтъ ли на нихъ ранокъ или оцарапанныхъ мѣстъ.

Лѣченіе. Оно бываетъ мѣстное и общее. Мѣстное лѣченіе должно соопвѣтствовать слѣдующимъ премъ показаніямъ: г. удалить ядъ, прежде нежели онъ подѣйствуетъ на весь

организмъ; 2. сдѣлать его недействительнымъ, или 3. организмъ привести въ такое состояніе, чтобы онъ могъ противодействовать болѣзневому вліянію. Для выполненія перваго показанія сочинилъ совѣтуемъ поспѣшь высосать рану, сколько можно, и пѣмъ удалить ядъ, который для рѣш без-опасенъ; потомъ многократно вымывать рану холодною либо горячею водою, или попеременно то тою, то другою. Второе показаніе выполняется чрезъ разсирое-ніе зараженнаго мѣста химическими сред-ствами: сѣрно-кислымъ серебромъ, минераль-ными кислотами или ѣдкими щелочами, ко-торыя при всякомъ вскрытіи пѣла должно имѣть въ готовності, а всего лучше, гдѣ можно, раскаленнымъ желѣзомъ или ножомъ. Для выполненія третьяго показанія пред-ложены сильныя раздражающія средства. Докторъ Коллесъ совѣтуемъ поспѣшь послѣ раненія опустить перстъ въ скипидаръ. Г. Дунканъ почищаетъ полезнымъ крѣпко пе-ревязать членъ выше раны, дабы воспре-пятствовать всосанію яда и ограничить рас-пространеніе уже воспослѣдовавшей болѣзни. Для уменьшенія мѣстнаго воспаленія Г. Дун-

канѣ нашель особенно полезнымъ непрерывное прикладываніе самой холодной воды, пока еще не произошло наспящее воспаление (phlegmone); послѣ чего средство сіе казалось вреднымъ, а теплыя припарки полезными. Лучше всего здѣсь руководствоваться чувствованіемъ самаго больного. Піявки и насѣчки часли, въ началѣ, не должны быть забыты, для возбужденія проптивораздраженія и для отвлеченія воспаления отъ клѣпчатой плевы важныхъ частей. Для сего же намѣренія полезно прикладывать испанскія мушки въ самомъ началѣ, хотя послѣ онѣ бывають еще полезнѣе тѣмъ, что увеличивають испечение сыворощки. По той же причинѣ можетъ быть полезно и раскаленное желѣзо, которое еще *Морандѣ* употреблялъ. Коль скоро можно полагать, что въ клѣпчатой плевѣ находишься излившаяся жидкость, что въ сильнѣйшихъ случаяхъ весьма скоро случается, то для выхожденія ея нужно сдѣлать глубокія насѣчки, которыя бывають существенно полезны даже и тогда, когда излившаяся влага густа и не испекается: ибо она будетъ испекаться, сдѣлавшись жидкою. Г. *Дунканѣ*. полагаетъ, что шако-

*

выя насѣчки въ одномъ случаѣ спасли жизнь больному.

Общее лѣченіе сей опасной болѣзни еще не опредѣлено. Одни писатели совѣщаютъ противувоспалительный, а другіе возбуждающій способъ лѣченія. Г. *Дунканъ* придерживается середины; по его мнѣнію, кровопусканіе и возбуждающія средства не всегда несовмѣстны, и могутъ быть случаи, въ коихъ съ испражненіемъ крови полезно употреблять лѣкарства, возвышающія дѣятельность плотныхъ частей (?). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, говоритъ онъ, показанія къ лѣченію бываютъ очень противоположныя, на прим: весьма большая слабость пребудетъ крѣпительныхъ лѣкарствъ, а случившееся при томъ сильное воспаленіе можетъ быть преодолено только повторенными испражненіями крови. Въ шаковыхъ случаяхъ онъ совѣщаетъ употреблять попеременно, либо и въ одно время, противоположныя средства.

Magazin der ausl. Litteratur der gesammten Heilkunde. Bd. 10.

VII.

КЛИНИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ И ЗА- МѢЧАНІЯ.

Профессора Терапевтической Клиники П. Чаруков-
скаго,

1. Польза селитры въ брюшной водяной болѣзни.

Иванъ Трофиловъ, Гренадерскаго Графа Ру-
мянцова-Задунайскаго полка рядовой, 30-пи-
лѣтъ, плѣтосложенія хорошаго, нѣсколько раз-
дражжительнаго, поступилъ въ Клинику 10-го
Октября 1828 года, спустя двѣ недѣли отъ
начала болѣзни. Въ прежніе годы онъ немно-
гими спрдавалъ болѣзнями. Въ 1823 году
былъ болѣнъ каждодневною лихорадкою, отъ
копорой излѣчившись совершенно, продол-
жалъ службу до 1827 года. Въ семь году сит
arptis venereis primitivis поступилъ въ Военно-

сухопупную госпиталь, изъ которой, спу-
 ская пять недѣль, вышелъ здоровымъ; но
 вскорѣ послѣ того спрдалъ кашлемъ съ ли-
 хорадочными движеніями и излѣчился въ оной
 же госпитали. Въ концѣ Септября 1828
 года почувствовалъ онъ жестокою, прико-
 сновенія неперпящую боль въ брюхѣ, къ конпо-
 рой скоро присоединились лихорадочныя движе-
 нія, почему онъ паки поступилъ въ военно-
 сухопупную госпиталь, гдѣ при употребле-
 ніи нѣкопрыхъ средствъ боль и лихорадоч-
 ныя припадкы успокоились и больной чувспво-
 валъ себя немного легче; но щашельно
 наблюдая за собою, съ удивленіемъ замѣпилъ,
 что брюхо его начало увеличиваться и
 въ печеніи двухъ недѣль сдѣлалось оно такъ
 велико и тяжело, что препящспвовало боль-
 ному ходишь; припомъ его беспокоили и
 другіе нижеописанныя припадкы, замѣчен-
 ныя при поступленіи его въ Клинику. Объемъ
 брюха былъ чрезвычайно великъ; больной жа-
 ловался на тяжесть онаго и напряженіе;
 шуная боль во всемъ брюхѣ, при прижатіи
 болѣе чувспвишельная; боль въ обоихъ под-
 реберьяхъ, спѣсненіе въ груди, шрудное ды-
 ханіе, сухой, короткій кашель, запоръ на

низъ, недоспашокъ позова на пищу, слабость всего шѣла. Лице больного было блѣдное, припухшее, дыханіе частое, коропкое, неровное, шемперапура шѣла немного возвышена, особливо на брюхѣ, кожа сухая, пульсъ частый, малый, швердый, покровы на брюхѣ цвѣща естеспвеннаго, опухоль брюха, при положеніи больного на спинѣ, вездѣ ровная, упругая, съ явспвеннымъ зыбленіемъ; языкъ сухой, немного красный, моча блѣдножелповашая, въ маломъ количесшвѣ.

11-го Окпября прописано больному: Rec. Nitrat. potassæ dr. duas, solve in decoct. rad. althææ ℥vjij adde syrupi communis ℥℔ m. dr. 8. принималъ по унціи шакъ, чптобы въ сушки больной выпилъ все количесшво.

12-го. Непримѣтно никакой деремѣны; цѣлые сушки не было на низъ. Промывашельное; шаже микспура, прибавивъ полдрахмы селишпы.

13-го. Ночь безпокойная, по причинѣ кашля и стѣсненія въ груди; прочіе припадки шѣже. Прибавилъ полдрахмы селишпы.

14-го. Промывашельное, по причинѣ невозможнаго испражненія низомъ.

15-го. Кашель ночью менѣе беспокоилъ больного. Селистры полуунціи въ фунтѣ того же отвара.

16 и 17-го. Прибавлено по полудрахмѣ селистры и по двѣ унціи жидкости. Въ припадкахъ незамѣтно никакой перемѣны; мочи около фунта.

18-го. Дыханіе нѣсколько свободнѣе; боль подъ ложечкою сноснѣе; количество мочи увеличилось до двухъ фунтовъ; два сухія испражнения низомъ.

19-го. Сонъ довольно спокойный; языкъ начинается увлажаться; количество мочи увеличивается; объемъ брюха цѣлымъ дюймоу уменьшился. Селистры шестъ драхмъ на полшора фунта жидкости.

20-го. Больной веселѣе; проситъ кисловатого пища. Кремортартаръ, съ медомъ растворенный въ ячномъ отварѣ.

21-го. Объемъ брюха уменьшился на два дюйма, припомъ брюхо сдѣлалось гораздо менѣе напряженнымъ; боль въ подреберьяхъ только при сильнѣйшемъ прижатіи ощутительна; дыханіе довольно свободное, кашель рѣдкій, пульсъ не такъ частый, моча обильная, приняла цвѣтъ красный, безъ примѣтнаго осадка.

Семь драхмъ селипры въдвухъ фунпахъ жидкостни.

22-го. Ночь спокойная; дыханіе свободное, пульсъ приближается къ естественному, полнѣе, объемъ брюха гораздо меньше; больной чувствуетъ себя свободнѣе, позывъ на ѣду хорошій, моча обильно испражняется. Тоже лѣкарство.

23-го. Моча испражняется въ большемъ количествѣ, кирпичнаго цвѣта, съ подобнымъ осадкомъ; при жидкія испражненія низомъ; языкъ влажный, кожа мягкая, все еще сухая, боль въ подреберьяхъ и подвздохахъ совсѣмъ исчезла; объемъ брюха почти естественный. Унція селипры въ томъ же количествѣ жидкости.

24-го. Кромѣ слабости и сухой кожи нѣтъ никакихъ болѣзненныхъ припадковъ. Селипра оставлена; вечеромъ теплая ванна, и потомъ теплое питье.

25-го. Послѣ ванны легкая испарина; состояніе больного хорошо. Поутру и вечеромъ теплое питье; *infusi chamom. ʒiv, acetat. ammoni liquidæ ʒjj, syrupi avrantior. ʒβ. m. s.* приниматъ по унціи часа черезъ три.

30-го. Испарина кожи свободная; моча испражняется въ надлежащемъ количествѣ; больной прохаживается. Infusum millefolii cum tinctura gentianæ composita; ordinaria порція.

3-го Ноября. Больной чувствуетъ себя совершенно здоровымъ и просится на выписку. Опущень изъ Клиники.

Студентъ 4-го класса П. Поцолоевскій.

Около того же времени употреблялъ я селипру въ брюшной водяной болѣзни, въ госпитали, у одного больного, такимъ же способомъ и также съ хорошимъ успѣхомъ. Никто изъ сихъ больныхъ не жаловался на противный вкусъ лѣкарства или какіе либо неприянные припадки, которые слѣдовало бы приписать его дѣйствию.

Такое дѣйствіе селипры (per eminentiam пропивувоспалительнаго средства) въ водяной болѣзни сильно противорѣчитъ и понинѣ еще господствующему (по крайней мѣрѣ между Врачами прежнихъ школъ) мнѣнію о скопленіи сыворопочной влаги въ человѣческомъ организмѣ, т. е., что скопленіе сіе зависить отъ ослабленнаго дѣйствія всасывающихъ сосудовъ и, даже если бы не было

другихъ возраженій, достапочно къ опроверженію или по крайней мѣрѣ къ большому ограниченію онаго. Симъ же дѣйствіемъ селипры подпверждаешся мнѣніе нѣкопрыхъ изъ новѣйшихъ писателей, что явленіе сіе, исключивъ, когда оно происходишь опъ механическаго препяпспвія движенію влагъ въ венахъ и всасывающихъ сосудахъ, еспъ слѣдспвіе увеличеннаго опдѣленія сыворопчанныхъ сосудовъ, возвышенной ихъ дѣяпельности *).

2. Ущелленія тонкихъ кишекъ въ сальникъ.

Петръ Сибиряковъ, инвалидной команды Унперъ-Офицеръ, 42-хъ лѣтъ, росла и пѣлосложенія средняго, нѣсколько сухощавый, нрава, по собирааннымъ свѣденіямъ, вспыльчиваго, а впрочемъ пихаго, поведенія добропорядочнаго, владѣлъ болѣе лѣвою рукою, въ печеніи всей своей жизни не спрадалъ никакими важными болѣзнями, кромѣ венерической, опъ копорой уже давно излѣчился надлежащимъ образомъ, но нерѣдко былъ подверженъ запору на низъ,

*) Обстояпельнѣе о семъ предметѣ см. de hydropore in genere, J. Tscharoukowsky. 1825.

который продолжался дня три и болѣе, и разрѣшался самъ собою, либо простыми домашними средствами. Сверхъ того онъ имѣлъ въ лѣвомъ паху свободную грыжу, непричинявшую ему значительнаго беспокойства, и о которой онъ пошому ни въ приемной, ни пользовавшему его въ госпитали Врачу не объявилъ. Въ концѣ прошлаго Феврала восплѣдовавшій запоръ, продолжаясь болѣе обыкновеннаго, принудилъ его наконецъ искать врачебной помощи, для полученія которой онъ и поступилъ въ здѣшнюю Военно-сухопутную госпиталь, гдѣ въ теченіи шестидней были употреблены разные средства, но безъ всякаго успѣха. 3-го Марта больной сей переведенъ въ Терапевтическую Клинику, гдѣ, при испытаніи его, замѣчены слѣдующіе припадки и явленія. Брюхо во всемъ своемъ объемѣ значительно увеличено, на лѣвой нижней сторонѣ нѣсколько болѣе, а повыше пупка, по временамъ, какъ бы перехвачено, вездѣ мягкое, упругое и звонкое при удареніи рукою объ оное; по временамъ ворчаніе въ животѣ и судороги, швердой, ни даже изсѣковадой мѣстной опухоли нигдѣ примѣтно не было; напряжение и ту-

пая боль во всемъ брюхѣ, при осязаніи увеличивающаяся, особливо близъ лѣваго паха, откуда проспиралась вверхъ косвенно влѣво и вправо; пемперашура покрововъ брюха, равно какъ и всего шѣла, немного возвышена; въ лѣвомъ паху пусшой грыжевой мѣшокъ; грыжа опть начала сей болѣзни не выходила; моча испражнялась свободно, въ маломъ количествѣ; стѣсненіе въ груди, физиономія больного довольно спокойная, лице блѣдное, языкъ влажный, красноватый, посредственная жажда, пульсъ полный, швердоватый, не очень частый; изрѣдка легкая рвопа, особливо по ночамъ.

Не находя никакой доспапочной причины споль продолжительнаго и упорнаго запора на низъ и потому не имѣя никакихъ основательныхъ показаній, мы спарались эмпирически произвеспи испражненіе низомъ помощію разныхъ какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ средствъ. Я почипаю излишнимъ подробно описывать теченіе болѣзни и употребленныя лѣкарства, а скажу только вообще, что, не смотря, что больной въ продолженіи двадцати шести дней опть начал болѣзни до самой смерти почти ниче-

го не вѣлъ, что ему были сдѣланы два довольно обильныя общія кровопусканія, спавлены кровососныя банки (за недоспапкомъ піявиць), нѣсколько разъ дѣланы теплыя ванны до значительнаго ослабленія, и его рвало, впрочемъ изрѣдка и не въ большемъ количествѣ, не смошря, говорю, на всѣ сіи и другія съ болѣзнію сопряженныя ослабляющія вліянія, силы больного, опть природы, какъ упомянуто, не очень крѣпкія, упали почти непримѣпно, пульсъ долго оспавался полнымъ и довольно крѣпкимъ, и больной могъ самъ приподниматься и поворачиваться даже въ послѣдніе дни и не терялъ надежды на выздоровленіе. Извергаемое рвою было жидкое, въ маломъ количествѣ, темнобураго цвѣта, по временамъ какъ бы съ примѣсью небольшого количества кала, однажды кровянистое, подъ конецъ жизни непріятнаго запаха. Въ послѣдніе дни позывы на рвоту были почти безпреспанные, боль въ брюхѣ сдѣлалась довольно оспрою, наипаче около лѣваго паха и ниже пупка въ глубинѣ. По временамъ въ брюхѣ появлялось сильное ворчаніе и судороги; причемъ снаружи были видны возвышенія, образуемая раздушыми киш-

ками, и объемъ брюха значительнo увеличился. Промывательныя сначала входили довольно большія и были удерживаемы нѣскольکو времени, но не выводили никакихъ нечистотъ. Въ послѣдніе дни мягкая опухоль извнутри зашворила опверспіе прямой кишки и не позволяла впрыскивать промывательныхъ; нерспомъ однакожь можно было ее обойти.

Болѣе всего приносили больному облегченія опій внутрь и снѣгъ, прикладываемый къ брюху. Послѣ сего прикладыванія объемъ брюха примѣнно уменьшался и боль успокоивалась; но и во время сего послабленія почтѣннее изслѣдованіе брюха руками не опкрывало никакой мѣспной опухоли; все брюхо было мягко, какъ бы шѣсповало.

По вскрытіи брюха предспавились намъ шпонкія кишки, сильно раздушыя, цвѣша темнокраснаго, почши вездѣ ровнаго, безъ помершвѣлыхъ пяпень. Онѣ наполняли все брюхо и самую нижнюю полость шпаза. Сальникъ найденъ приросшимъ концами своими къ грыжевому опверспію и влѣво, косвенно кзади, къ брюшинѣ, а вправо къ позвоночному шполбу, напряженъ, въ срединѣ не-приросшій къ брюшинѣ, съ лѣваго бока

поясничныхъ позвонковъ прорванъ на большое проспранство, которое однако почти не опредѣлено. Тощая кишка, почти опъ своего начала, и подвздошная досамого начала толстыхъ кишекъ прошли чрезъ сказанное отверстіе сальника и были въ ономъ ущемлены; особливо послѣдняя была прижата къ позвоночному столбу крѣпкою, напряженною складкою сальника. Двенадцатиперстная кишка была немного красная, а толстые кишки совершенно блѣдны и пусы; послѣднія лежали всѣ на правой сторонѣ позвоночнаго столба и были укрѣплены къ задней части брюшной стѣны клѣшчатую плевою. Ободочная кишка дѣлала въ подвздошной и подреберной сторонѣ двѣ длинныя, узкія дуги. Ущемленные кишки, кромѣ газовъ, содержали много бурога, жидкаго и воющаго кала. Слизистая ихъ оболочка не была воспалена. Правая почка лежала выше лѣвой, и лѣвая доля печени обращена къ правому подреберью. Селезенки мы не нашли.

Въ грудной полости намъ пропчась представилось сердце въ правой половинѣ оной, верхушкою обращенное вправо и внизъ; дуга

начальственной артерії также была обращена въ правую сторону. Замѣшивъ сіи не-правильности, я сей часъ прекратилъ даль-нѣйшее изслѣдованіе шѣла и представилъ о томъ Конференціи, которая поручила Г-ну Экспраординарному Профессору Анапоміи Буальскому сдѣлать подробное описаніе сего субъекта.

Хотя *garra pop sunt artis* и подобный слу-чай едва ли скоро встрѣпятся, ибо для сего нужны нѣкоторыя необыкновенныя условія, неизлишнимъ однако почишаю присоединить къ описанію сего случая нѣкоторыя практи-ческія замѣчанія.

Можно ли было здѣсь при жизни распознать настоящее болѣзненное состояніе? Вопросъ сей рѣшивъ я предоставляю читателю. Что касается до меня, то мнѣ оное, при сужде-ніи о болѣзни, и на мысль не приходило: ибо мнѣ неизвѣстно, чтобы кто либо хотя упо-миналъ о подобномъ случаѣ, да и другіе опыт-ные Врачи, видѣвшіе больнаго или копорымъ я объ немъ говорилъ, судя по ихъ мнѣніямъ и совѣтамъ въ сужденіи лѣченія, того не предполагали.

Я замѣтилъ выше, что, не смотря на сподъ продолжительный запоръ на низъ, изверженіе рвою было необильное, и только по временамъ въ ономъ обнаруживалось присутствіе небольшого количества калу подобнаго вещества; раздушіе кишекъ гасомъ нерѣдко, особливо послѣ прикладыванія снѣга, уничтожалось и тогда все брюхо было равномерно полное, какъ бы пѣстоватой плотности. Сіи явленія были для меня примѣчательны; но я не могъ ихъ объяснить, а теперь они понятны. Верхняя часть кишекъ была прижата не очень плотно, и потому гасы, по возбужденномъ сокращеніи кишекъ приложеннымъ снѣгомъ, выходили, а при сильнѣйшемъ ихъ и брюшныхъ мышцъ сокращеніи могло пройти и нѣкоторое количество нечистотъ, содержащихся въ ущемленныхъ кишкахъ; бѣольшая часть оныхъ нечистотъ однако оспавалась въ кишкахъ.

Боль, обнаруживавшаяся наипаче при прижатіи близъ лѣваго паха и проспиривавшаяся косвенно въ обѣ стороны и вверхъ, происходила отъ напряженныхъ складокъ приросшаго сальника, ущемлявшихъ кишки; но при жизни я совсѣмъ не предполагалъ сей причины.

Сроспѣніе сальника, вѣроятно, воспослѣдовало уже давно: поелику ни въ немъ, ни въ тѣхъ мѣстахъ брюшины, къ коимъ онъ приросъ, не было и слѣдовъ воспаленія; даже не лзя было опредѣлить границъ между ними; онъ, такъ сказать, сливались между собою.

Сжатіе брюха выше пупка и судорожное напряженіе онаго съ раздупіемъ кишекъ по временамъ, особливо въ первые дни пребыванія больного въ Клиникѣ, появлявшіяся, возбуждали во мнѣ мысль, не зависипъ ли болѣзнь опъ вліянія нервовъ или судорогъ, и съ намѣреніемъ ослабипъ сіе вліяніе, употребилъ я кровопусканіе, теплыя ванны до ослабленія больного и пошному возбуждающія и противусудорожныя средства внутрь и въ промывательныхъ; но не видя опъ сего пользы, я скоро оставилъ какъ сію мысль, такъ и упомянутыя средства.

Предпринявъ какую либо операцію для спасенія сего больного опынѣйшіе Хирурги, съ копорыми я о семъ совѣпвался, почипали дѣломъ неумѣстнымъ: ибо изъ припадковъ не лзя было опредѣлить ни рода, ни мѣста механической причины запора на низъ, а вскрытіе тѣла показало, что если бы мож-

*

но было угадать главную причину болѣзни и вскрыть брюхо прошивъ самага ущемленія, то и тогда сіе предпріятіе было бы тщетное: поелику раздутыя кишки наполняли все брюхо такъ, что даже въ трупѣ не лзя было опыскавъ складокъ, прижимавшихъ кишки, не выпустивъ изъ нихъ газа; не говорю уже о томъ, что самый смѣлый Хирургъ при такихъ обстоятельствахъ не отважился бы провести ножъ въ брюхо, къ самому позвоночному столбу и разрѣзать оныя складки.

Гальскій Профессоръ Клиники *Кругенбергъ* видѣлъ ущемленіе кишекъ необыкновенно образованнымъ салникомъ; но наблюденіе его мнѣ извѣстно только изъ *Rust's Repertorium für die gesammte Heilkunde 1824*, гдѣ объ немъ только кратко упоминается. Больной умеръ на второй день отъ начала болѣзни.

VIII.

**АНАТОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАЙДЕННОГО
ВЪ ТѢЛѢ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМЪ ПРЕВРАТНАГО ПО-
ЛОЖЕНІЯ СЕРДЦА, ВСѢХЪ БОЛЬШИХЪ КРО-
ВОНОСНЫХЪ ЖИЛЬ И НѢКОТОРЫХЪ ДРУ-
ГИХЪ ВНУТРЕННОСТЕЙ, СЪ НЕДОСТАТКОМЪ
СЕЛЕЗЕНКИ (*situs perversus cordis, vaso-
rum maiorum et nonnullorum viscerum,
cum defectu lienis*),**

*По препорученію Начальства разсматривалъ и
описалъ Докт. Мед. и Хир. и Экстраординар-
ный Профессоръ Анатоміи Надв. Сов. Илья Бу-
льскій.*

Въ Терапевтической Клиникѣ Император-
ской Медико-Хирургической Академіи нахо-
дился больной, инвалидной команды Унцерь-
Офицеръ *Петръ Сибиряковъ*, 24-хъ лѣтъ отъ
роду, копорый умеръ отъ ущемленія пюн-
кихъ кишекъ въ образовавшуюся въ сальникѣ
(*omentum*) дыру.

По смерти его, вскрывши пѣло про-
шедшаго 22-го Марша, нашли въ немъ серд-

це, всѣ большія кровеносныя жилы, также и прочія грудныя и брюшныя внутренности, исключая желудокъ и двенадцатиперстную кишку, въ превратномъ положеніи, то есть, лѣвѣ части, которыя лежатъ въ правой половинѣ тѣла, въ ономъ найдены въ лѣвой, и на оборотъ, которыя должны лежать въ лѣвой сторонѣ, были въ правой.

Сердце по величинѣ должно опреспить къ малымъ. Основаніемъ своимъ лежало совершенно на срединѣ позвонковъ, верхушка же обращена была въ правую сторону. Однимъ словомъ, сердце лежало на правой сторонѣ, точно, такъ какъ оно должно лежать на лѣвой.

Правое предсердіе было на лѣвой, а лѣвое на правой сторонѣ; а потому легочныя вены происходили на правой, а полая верхняя вена (*vena cava superior*) на лѣвой сторонѣ, и сообразно сему величина пазухъ и ушковъ была также въ превратномъ содержаніи.

Правой желудочекъ сердца былъ на лѣвой, а лѣвой на правой сторонѣ: ибо спѣчныя желудочка начальственной артеріи бывають толще, а легочной тоньше; а потому на-

начальственная артерія (aorta) происходила изъ своего желудочка, но лежавшаго на правой, а артерія легочная также изъ своего, но находившагося на лѣвой споронѣ.

Поверхность сердца верхняя была выпуклая, нижняя плоская (какъ и должно быть). Край правой (на оборотѣ), соотвѣтственно желудочку, былъ полсшой, а лѣвой тонкой. Передняя вѣтвь задней вѣтвечной артеріи сердца (*ramus anterior arteriæ coronariæ cordis posterioris*), проходящая на верхней поверхности онаго, также передняя вѣтвечная артерія сердца (*arteria coronaria cordis anterior*), проходящая на нижней поверхности, проходили обѣ ближе къ правому краю онаго, что также было на оборотѣ.

Начальственная артерія, при началѣ своемъ отъ сердца, шла вверхъ и на лѣвую спорону; потомъ, образуя дугу, заворачивалась на правую спорону (превратно) и по правой споронѣ позвонковъ спинныхъ и поясничныхъ доходила до 4-го поясничнаго позвонка, гдѣ и раздѣлялась на двѣ подвздошныя артеріи, правую и лѣвую (*arteria iliaca dextra et sinistra*).

Отъ дуги начальственной артеріи съ лѣвой стороны происходила артерія безымянная (*arteria innominata*), которая была длиною на полпюра поперечнаго пальца, а отъ сей артеріи происходила подключичная лѣвая и сонная лѣвая артеріи (*asubclavia et carotis sinistra*), что, какъ извѣстно, должно быть на оборотъ; потомъ подлѣ безымянной близко начиналась сонная правая артерія (*arteria carotis dextra*), и наконецъ подключичная правая (*arteria subclavia dextra*).

Артерія легочная, какъ сказано выше, происходила изъ своего желудочка, но лежавшаго на лѣвой сторонѣ сердца и раздѣлилась на двѣ правую, которая была короче и меньше лѣвой и имѣла круглую связку, бывшую прежде до рожденія сего человѣка на свѣтъ Божіимъ пропокомъ (*ductus arteriosus Botalli*). Лѣвая легочная артерія была болѣе и длиннѣе правой (что также на оборотъ).

Полая верхняя вена (*vena cava superior*) начиналась изъ верхняго предсердія и проходила по лѣвой сторонѣ. Отъ полой верхней вены происходила вена непарная (*vena azygos*), которая была велика и также по лѣвой сторонѣ спинныхъ позвонковъ проходила

(поже превратно) и попомъ перемѣнялась въ полую нижнюю вену (*vena cava inferior*), копорая по лѣвой споронѣ позвоночнаго столба проходила до раздѣленія своего на подвздошныя вены.

Полая верхняя вена, пришедши къ вилочкамъ грудины (*iugulum sterni*) раздѣлилась на двѣ подключичныя вены; правая была длинная и лежала почти поперечно, а лѣвая короткая и толстая шла прямо вверхъ впереди безымянной, находящейся на лѣвомъ боку (все совершенно на оборотъ).

Происходящія отъ подключичныхъ венъ вены яремныя внутреннія (*venæ iugulares internæ*), правая была тонѣе, а лѣвая толще (что также на оборотъ).

Правое легкое лежало въ лѣвой половинѣ груди: ибо оно было болѣе другаго и раздѣлено на три доли, и вѣшвъ дыхательнаго горла, въ сіе легкое входящая, была короче, но толще и пространнѣе, а лѣвое легкое лежало на оборотъ въ правой половинѣ: поелику оно было менѣе и раздѣлено на двѣ доли, и сверхъ того имѣло вырѣзку, подъ копорою находилось сердце, и вѣшвъ дыхательнаго горла, въ оное входящая, была длиннѣе, но тонѣе,

Печень лежала въ лѣвомъ подреберьѣ и на срединѣ; лѣвой конецъ былъ полстой и пупой, а правой тонкой и узкой (на оборотъ). На заднемъ краю полудилиндрической борозды вовсе не было: ибо полая нижняя вена происходила опть непарной (*vena azugos*); опть нижней же части лѣваго, по положенію, предсердія, гдѣ должна начинапья полая нижняя вена, происходила только вена печеночная (*vena hepatica*).

Подъ лѣвою большою долею печени лежалъ желчный пузырь, котораго протокъ (*ductus cysticus*) былъ наклоненъ на правую сторону къ 12-пиперстной кишкѣ.

Селезенки вовсе не было, и не было также и слѣдовъ болѣзненнаго распротспва оной; однимъ словомъ, какъ въ правомъ, такъ и въ лѣвомъ подреберьѣ всѣ части были совершенно здоровы; а посему артеріи и вены селезеночной также не было.

Лѣвая почка лежала ниже, а правая выше (на оборотъ). По превратному положенію главныхъ сосудовъ въ брюшной полоспи, то есть, артеріи начальспвенной на правой, а полой нижней вены на лѣвой сторонѣ, и сосуды почечные въ своей длинѣ были въ

превращенномъ содержаніи, именно: артерія правой почки короче, а лѣвой длиннѣе; вена же правой почки длиннѣе, а лѣвой короче (что также должно быть на оборотъ).

Желудокъ и двенадцатиперстная кишка имѣли правильное положеніе, то есть, въ лѣвомъ подреберьѣ конецъ лѣвой толстой, соединяющійся съ пищепріемнымъ каналомъ и копорый называется дномъ желудка, а правой тонкой, соединяющійся съ 12-типерстной кишкою и называемый исходомъ (*exitus s. pylorus*).

Толстая кишки лежали также превращенно, именно: слѣпая кишка (*intestinum caecum*) находилась въ лѣвой подвздошной спорѣ, только ближе къ позвоночному столбу, а заднепроходная (*intestinum rectum*) опускалась въ пахъ съ правой стороны. При перемѣненіи нисходящей ободочной кишки въ прямую въ нѣкопорыхъ мѣстахъ находима бываетъ сія часть ободочной кишки длиннѣе, и пошому образуешь она въ семь мѣстъ различной величины удвоеніе, копорое въ семь мѣстъ было весьма большое.

Брыжеечная нижняя артерія (*Arteria mesenterica inferior*) отъ начала своего шла по

правой споронѣ, а не по лѣвой, равно и происходящія отъ нее вѣтви.

Полая нижняя вена, какъ сказано, лежала на лѣвой споронѣ позвоночнаго столба, и раздѣлившись на двѣ подвздошныя вены, правую вену имѣла длинную, а лѣвую короткую (на оборотъ), смотря по своему положенію.

Сей случай превращающаго положенія сердца, большихъ кровеносныхъ жилъ и нѣкопыхъ внутренностей есть довольно рѣдкій, и у насъ въ Россіи, сколько извѣстно, первый. Однакожъ въ Анатомическомъ Кабинетѣ С. Петербургской Императорской Медико-Хирургической Академіи имѣется подобный препаратъ превращающаго положенія, привезенный изъ Англіи въ числѣ препаратовъ *Круйкшанка* и *Томаса*. Также въ послѣднемъ десятилѣтіи было печатано въ разныхъ иностранныхъ Журналахъ раза три о найденныхъ таковыхъ же примѣрахъ.

Но сей самый человекъ заключалъ въ себѣ ту наивеличайшую рѣдкость, что онъ вовсе не имѣлъ селезенки, что до сего времени всѣ Врачи считали весьма необыкновен-

нымъ (Lieutenant T. I. p. 234) и едва ли сей случай не есть вѣроятный.

Можетъ быть, нѣкоторые Врачи budouтъ въ семь сомнѣваться и полагать, что не случившеюся ли какою либо болѣзнію селезенка совершенно испреблена. Пропиву сего я именно объявляю, что на сіе было обращено все мое вниманіе, и я разсматривалъ оное пѣло въ печеніи чепырехъ дней и не нашелъ ни малѣйшихъ слѣдовъ болѣзненнаго состоянія ни въ какой часпи пѣла.

IX.

**Хиноидинъ (Chiniodin), откры-
тый вновь Г-мъ Сертирнеромъ
въ хинъ, составляющій третій
алкалоидъ оной.**

Сообщилъ Профессоръ А. Нелюбинъ.

Историческое извѣстіе.

Г. Сертирнеръ, извѣстный Химическій Писатель и Аналирикъ, открывшій морфій и наркотинъ въ опіѣ, въ недавнемъ времени представилъ ученому свѣту свои любопытныя изслѣдованія нѣкопородныхъ породъ хины и открывшаго имъ новаго алкалоида въ оной. При лѣченіи упорныхъ, равно какъ и эпидемически свирѣпствовавшихъ перемежающихся лихорадокъ, говоритъ Г. Сертирнеръ, много разъ удавалось мнѣ замѣчать самому и также другимъ общечественнымъ

Врачамъ, что исцѣленіе оныхъ хиною и хинными алкалоидами не всегда бываетъ вѣрно и надежно. Сѣрнокислый хининъ, признанный за единственное и споль же вѣрное пропивулихорадочное средство, нерѣдко употребляется безъ успѣха или излѣченная имъ болѣзнь чрезъ короткое время возвращается съ новою силою. Въ продолженіи многихъ лѣтъ, говоритъ Г. *Сертирнеръ*, дѣлалъ я наблюденія надъ употребленіемъ хины съ кислотами (которая въ полной мѣрѣ замѣняетъ сѣрнокислый хининъ при лѣченіи перемежающихся лихорадокъ) и замѣнилъ, что не всѣ породы хины, но нѣкоторыя только виды оной бываютъ доспапочно для совершеннаго исцѣленія недуга и прегражденія возврата болѣзни. Въ особенности оказались для сего способными красная и желтая Королевская хина. Разность дѣйствія, производимаго сими средствами, заставила Г-на *Сертирнера* думать, что въ сихъ породахъ хины содержишься особенная щелочь, незамѣченная до сего времени Химиками. Сіе предположеніе подало поводъ къ произведенію новыхъ химическихъ изслѣдованій надъ обѣими

породами хины (кои подробно изложены въ периодическомъ сочиненіи Г-на Сертирнера: *Annalen für das Universal System der Elemente etc.* 1828.), увѣнчанныхъ счастливымъ успѣхомъ.

Приготовление хиниодина.

Отваръ желшой Королевской хины, приготовленный съ слабыми кислошами, бывъ смѣшанъ съ щелочами, доставляетъ осадокъ, содержащій въ себѣ извѣстные алкалоиды хины, п. е., хининъ и цинхонинъ; но въ семъ осадкѣ содержица также особенная щелочь, незамѣченная до сихъ поръ Химиками, которая составляетъ измѣненіе хинина и содержица къ оному, подобно какъ морфій къ нарकोпину.

Сей новый алкалоидъ (хиниодинъ) находится въ ономъ хинномъ осадкѣ въ тѣсномъ соединеніи со смолистыми часпями, кислошами и другими составными часпями хины, отъ коихъ весьма трудно отдѣляется. Сей осадокъ настаивается съ алкоголемъ, шинктура выпаривается до густоты экстракта, который растворяется въ разжиженной (изъ одной часпи крѣпкой сѣрной кислошы и 4-хъ

частей воды соспавленной) сѣрной кислотѣ, и сей распворъ, помощію живопнаго угля, ос-
вѣпляется и чрезъ выпариваніе и кристал-
лизованіе опдѣляется изъ онаго хининъ и
цинхонинъ. Оспавшаяся жидкость выпари-
вается до густоты сиропа и настаивается
съ алкоголемъ для опдѣленія сѣрнокислой из-
вести; наконецъ сей спиртный распворъ вы-
паривается и доставляетъ хиноіодинъ.

Сей алкалоидъ въ красной и Королевской
хинѣ бываетъ опмѣнно сокрытъ; почему и
оспавался понинѣ неизвѣстенъ аналипикамъ.
Онъ соспавляетъ измѣненіе хинина и цин-
хонина, и для опличія опъ оныхъ весьма
справедливо долженъ бытъ названъ хиноіоди-
номъ. Онъ по превосходству своему соеди-
няется съ большимъ количествомъ кислотѣ,
а по опличному дѣйствію въ перемежающих-
ся лихорадкахъ долженъ бытъ признанъ пер-
вымъ членомъ сей фамиліи между алкалоида-
ми хины.

Свойства.

Хиноіодинъ, опносительно цвѣща, запаха,
вкуса и нераспворимости своей въ водѣ,
имѣетъ общія съ прочими алкалоидами хи-

ны свойства. Онъ существенно отличается отъ другихъ бѣльшею способностію соединяясь съ кислотами, равно и превосходнымъ пропивиулихорадочнымъ дѣйствіемъ, а не мѣньше щелочною своею напурою и пѣснымъ соединеніемъ съ экстрактивнымъ веществомъ. Соли сего допотримѣчательнаго алкалоида (очищеннаго совершенно отъ постороннихъ веществъ) содержащаяся въ жару подобно естественнымъ бальзамамъ, п. е., сначала дѣлаются мягкими, липкими и плавкими, а потомъ совершенно оптвердѣвають и получающіяся въ пвердомъ состояніи.

Динамическое дѣйствіе.

Хиноидинъ составляетъ невинное, но весьма дѣйствительное средство въ перемежающихся лихорадкахъ. Пропивиулихорадочная сила сего средства содержится къ хинину въ такомъ точномъ содержаніи, какъ хининъ къ пропивиулихорадочной коркѣ.

Болезни.

Въ перемежающихся лихорадкахъ, гдѣ только предлагается употребленіе красной и Королевской хины или хинныхъ щелочей, тамъ

съ большею пользою и припомъ вѣрнѣе дѣй-
 ствуесть хиноіодинъ. Г. *Сертирнеръ* имѣлъ
 случай въ прошломъ 1828 году испытать
 сіе средство въ перемежающейся лихорадкѣ,
 эпидемически свирѣпствовавшей въ окрест-
 ностяхъ Гамелна, наипаче въ мѣстечкѣ
 Гаспенбекѣ. Изъ числа 15-ти больныхъ,
 одержимыхъ сею болѣзнію, всѣ были излѣче-
 ны въ самое короткое время симъ сред-
 ствомъ. Они принимали по два грана хиноіоди-
 на, три раза въ сутки, и запивали небольшимъ
 количествомъ уксуса, съ водою смѣшаннаго
 (сіе нужно для насыщенія желудочнаго сока,
 который въ лихорадкѣ получаетъ щелочное
 качество, разлагаетъ хинныя соли, дѣлаетъ
 ихъ нераспворимыми и лишаетъ пропигули-
 хорадочнаго дѣйствія). Для совершеннаго из-
 лѣченія лихорадки потребно было отъ 6 до
 12-ти порошковъ, слѣдовательно отъ 12-ти
 до 24-хъ гранъ хиноіодина. Докторъ *Фридрихсъ*
 подтверждаетъ наблюденія Г-на *Сертирнера*
 собственными опытами. Сей Врачъ въ прош-
 ломъ году испыталъ отличное дѣйствіе хино-
 іодина въ перемежающейся лихорадкѣ, свирѣп-
 ствавшей въ окрестностяхъ Гамелна, особ-
 ливо въ низменныхъ долинахъ по теченію

*

Везера. Онъ говоритъ, что употребленіе лихорадочной корки, впираніе рвотнаго виннаго камня и самое употребленіе хинина во многихъ случаяхъ не приносили пользы, или оставляли по себѣ слѣды предшешей болѣзни, а чаще всего слѣдовалъ возвратъ оной съ большимъ ожесточеніемъ. Одно только употребленіе хиноїодина успранило сіи неблагоприятныя послѣдствія; для чего доспаечно было 24-хъ гранъ сего средства въ самыхъ упорныхъ случаяхъ.

Г. Сертирнеръ приводитъ многія любопытныя испоріи болѣзней, кои излѣчилъ онъ хиноїодиномъ. Изъ числа оныхъ бѣльшее заслуживаютъ вниманіе слѣдующія:

1. Споляръ В., 36-ти лѣтъ отъ роду, сухощавый, гекпическаго тѣлосложенія, чувствую себя съ нѣкотораго времени не совсѣмъ здоровымъ, получалъ однакожъ по временамъ нѣкоторое облегченіе, но безъ явственныхъ признаковъ перемежающейся лихорадки. Изнурительныя попы, непомѣрная слабость силъ, мучительная жоска, давленіе въ груди, корешкое дыханіе, кашель и другіе припадки заставляли думать объ органическомъ разспроеніи грудныхъ внутренностей.

Сіе еще болѣе подтверждалось судорожною одышкою, угрожавшею задушеніемъ больного, спрадавшаго за годъ передъ пѣмъ и излѣченнаго въ попъ разъ щелочами и наливкою Александрійскихъ лисповъ. Не лзя было имѣть никакой надежды при таковомъ соспояніи больного, копорый оспавался уже около 9-ти недѣль почти въ одномъ и шомъ же положеніи, за исключеніемъ нѣкопорыхъ дней, въ кои больной чувспвовалъ себя лучше, что однакожь было приписываемо вліянію лихорадочной эпидеміи. Больной имѣлъ по временамъ дрожъ и чувспво ползающихъ мурашковъ по спинѣ; ему даваемъ былъ хининъ, но безъ всякой пользы. Соспояніе больного спановилось весьма неблагопріятно: ибо припадки прежней его болѣзни возвратились съ большимъ ожеспоченіемъ. Въ семъ случаѣ Г. *Сертирнеръ* прибѣгнулъ къ употребленію хиноіодина и давалъ онаго по два грана при разѣ супки. По прошеспвіи нѣсколькихъ дней, къ немалому всѣхъ удивленію, припадки совершенно исчезли, и больной до сего времени находипся въ наилучшемъ соспояніи.

2. Другой, не менѣе важный и заслужи-
вающій всякое вниманіе, случай свидѣтель-

сплвуепть обѣ опличномъ дѣйствіи сего новаго средспва. Одна дама, весьма раздражительная, нервнаго шѣлосложенія, спрадала съ давняго времени жестпокими судорогами желудка и вмѣспѣ съ шѣмъ непомѣрною слабостію памяпи, шакъ чпо соспояніе ея было весьма близко къ помѣшательспву въ умѣ. Больная, по предписанію своего Врача, начала упопреляпѣ хиноіодинѣ и въ скоромъ времени излѣчилась совершенно опѣ своей болѣзни.

3. Молодой, плопнаго шѣлосложенія, 18-пи лѣпній сынъ Г-на Тайнаго Совѣшника Р., въ провинціи Минденѣ, одержимъ былъ въ шеченіи 15-пи мѣсяцовъ 2, 3 и 4-хъ дневною лихорадкою. Сей спрадалецъ пользованъ былъ опыпнѣйшими Врачами, копорые надъ нимъ повпорили, шакъ сказапѣ, всю науку о лихорадкахъ и не оставили ниодного средспва безъ испыпанія, но все было шщепно и не принесло ожидаемой пользы. Наконецъ Г. *Сертирнерѣ*, шакже въ свою очередь, безъ всякаго успѣха испыпалъ прославленныя имъ щелочи и офосфоренное гвоздичное масло. Онѣ предписывалъ шакже сему больному въ большихъ приемахъ хининѣ, да-

валъ по цѣлому лопу Королевской хины и сію послѣднюю соединялъ съ кислопами. Лихорадка хопя и была исцѣляема, но по прошествіи 2 и даже 4-хъ недѣль паки возвращалась съ новою силою. Одинъ только хиноіодинъ, даваемый съ кислопою опъ 3-хъ до 6-ти [гранъ, воспановилъ совершенно здорovie сего молодого человѣка.

Къ сему надлежитъ присовокупить, что хиноіодинъ естъ одно изъ дѣйствительнѣйшихъ пропивулихорадочныхъ средствъ, на которое мы смѣло можемъ полагаться. Во всѣхъ видахъ перемежающихся лихорадокъ, наипаче упорныхъ и обнаруживающихся подъ видомъ другихъ періодическихъ болѣзней, составляетъ онъ всегда вѣрное лѣкарство. Онъ можетъ быть предписываемъ во всѣхъ формахъ, подобно сѣрнокислому хинину, но всего лучше въ соединеніи съ кислопами, сначала по одному, а потомъ по два грана, утромъ и вечеромъ, либо три раза въ сутки.

Х.

С М Ъ С Ъ.

1. ОВЪ УПОТРЕБЛЕНІИ И ПОЛЪЗѢ СЪРНОПЕЧЕНОЧНОЙ МАЗИ.

Доктора Медицины Войнакуринскаго.

Многіе Врачи предлагали любостраспную болѣзнь излѣчиваѣь минеральными кислопами, куреніями и другими способами; но лѣчение сей болѣзни, прежде и нынѣ упопрелемое, помощію меркуріальныхъ средствъ, естѣ скорѣйшее, удобнѣйшее и надежнѣйшее. Не спану дѣлаѣь здѣсь сиспематическаго описанія любостраспной болѣзни и способовъ пользоваѣь каждый видѣ оной; сіе не полько Врачу, но даже начинающему учипсья Медицинѣ болѣе или менѣе извѣспно. Скажу полько, что часпо, очень часпо, время и обстояптельствва не позволяюѣь больному въ

точности выполнитъ шѣхъ правилъ, кои при лѣченіи назначаетъ ему Врачъ: ибо при употребленіи внутрь меркуріальныхъ средствъ діетѣ и вообще содержаніе больного должны соотвѣлствовать врачебной цѣли. Уклоненіе отъ сего правила, въ какомъ бы то ни было случаѣ, неминуемо влечетъ за собою худыя послѣдствія, копорыя часпо бывають пагубныѣ и упорныѣ первоначальной болѣзни. Отъ невожденія въ пищу и питье уменьшаетъ и даже совсѣмъ уничтожаетъ благодѣтельное дѣйствіе меркуріальныхъ средствъ и первоначальная болѣзнь, пакъ легко теперь излѣчиваемая, поспепенно усиливаясь или отъ наружныхъ только пособій скрываясь внутрь, является потомъ съ болѣею жестокостію и спановится опасна для больного и затруднительна въ лѣченіи. Слѣдствіемъ сего по болѣеи часпи бывають костныя боли (*dolor. osteosori*), кои, производя несносное ощущение въ конечностяхъ, къ ночи усиливающееся, спановятся наконецъ нестерпимыми. Сіе обстоятельство снова обращаетъ Врача къ распознанію свойства болѣзни и онъ спарается опредѣлить: происходятъ ли сіи боли отъ несовершен-

но излѣченной любострастной болѣзни или только сушь послѣдствія излишняго употребленія внутрь и снаружи меркуріальных средствъ безъ потогонныхъ и кровочистительныхъ лѣкарствъ? Въ первомъ случаѣ Врачъ начинаетъ опять употребленіе меркуріальныхъ и другихъ средствъ, а во второмъ прибѣгаетъ къ потогоннымъ и кровочистительнымъ, между коими преимущественно употребляющіяся сѣриопеченочныя ванны.

Для сей послѣдней цѣли я нахожу удобнѣйшимъ, скорѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ пособіемъ сѣриопеченочную мазь, кошорая была мною употребляема всегда въ приватной практикѣ и въ Динабургской военной госпитали съ величайшимъ успѣхомъ въ слѣдующемъ составѣ:

Rp. Hepat. sulphur.

Axungiaë porcin. an. unc. unam

M. D.

Мазь сію совѣпывалъ я больнымъ употребляль непременно въ Руской банѣ, въ кошорую больной пришедши, долженъ въ легкомъ пару хорошо вспотѣть, дабы болѣе открыть кожныя поры, и послѣ, вышедши въ передбанникъ, или на полу самой бани, всю

поверхность пѣла вымазать сѣрнопеченочною мазью и дать сколько возможно болѣе времени всосаться оной внутрь пѣла; послѣ чего опяť лечь на полокъ въ легкой же щарѣ и оспаваться шамъ довольно значительное время. Опдѣляющимся изъ пѣла въ обильномъ количествѣ попомъ обмывается оставшаяся на пѣлѣ мазь; но не смотря на сие, должно раза два или три вытереть пѣло мягкой мочалкою или суконкою съ мыломъ и, если больной въ силахъ и привыченъ, париться вѣнникомъ. Сие втира́нiе, принаравливаясь къ обстоятельствамъ и степени болѣзни, можно дѣлать два, три раза въ недѣлю и даже ежедневно, что продолжать до тѣхъ поръ, пока больной почувствуетъ себя совершенно свободнымъ отъ мучительныхъ болей, что обыкновенно бываетъ очень скоро.

Преимущество предлагаемаго мною здѣсь способа употребленiя сѣрнопеченочной мази предъ сѣрнопеченочными ваннами неоспоримо и употребленiе сихъ послѣднихъ всегда бываетъ продолжительно и для неимущаго больного затруднительно и обременительно: ибо для приготовленiя теплой ванны

берется, положимъ, около 10-ти вѣдеръ воды, имѣющей теплоты отъ 27 до 30-ти градусовъ по Реомюрову термометру, наливается въ деревянный или жестяной сосудъ, буде же таковыхъ не находится, въ простую большую кадку и въ оной распускають одну, полпоры, рѣдко двѣ унціи сѣрной печенки; сія, совершенно распуспившись въ 320-ти фунтахъ воды, всасывается чрезъ кожу въ плѣло въ самомъ маломъ и незначительномъ количествѣ; припомъ же очень часто отъ небреженія приготавливающихъ ванну оная распуспившись только въ половину, оспальная же ея часть падаетъ на дно сосуда нераспущенною. Пользуясь же вышеизъясненнымъ мною способомъ, сѣрная печенка вбирается въ плѣло въ довольно значительномъ количествѣ и по химическому средству своему соединяясь въ ономъ съ меркуріемъ, производитъ благотворное дѣйствіе, чрезъ что и самое выздоровленіе больного бываетъ несравненно скорѣе, и для бѣдныхъ больныхъ дешевлѣ и удобнѣе.

Самое употребленіе парной Руской бани есть первѣйшее условіе къ изверженію изъ плѣла всего того, что, будучи вредно, въ

самомъ же пѣлѣ оидѣляется живоюною економіею. Общіе покровы нашего пѣла соспавляютьъ важнѣйшій органъ, дѣйствіемъ и опправленіемъ коего по большей части сохраняется здоровье и самая жизнь, какъ сіе всякому уже извѣстно.

Тренье пѣла мочалками, суконкаими или другимъ образомъ и пареніе вѣникомъ, въ теплой водѣ размоченнымъ и мыломъ нашерпымъ, имѣетъ также свою пользу: ибо здоровыхъ людей предохраняетъ отъ многихъ болѣзней, содержишь въ чистотѣ кожу, равняетъ обращеніе крови, разрѣшаетъ застои оной, поправляетъ ея испорченность, укрѣпляетъ швердыя части и, производя легкое возбужденіе во всемъ пѣлѣ, дѣлаетъ его живѣе и крѣпче.

Въ Москвѣ, въ приватной практикѣ, встрѣчались мнѣ довольно разипельные примѣры лѣченія больныхъ, зараженныхъ любоспраспною болѣзнію въ сильнѣйшей степени, изъ числа коихъ поваръ помѣщика В а въ печеніи цѣлаго года лѣчился совѣтами простолюдимовъ и шарлапановъ и довелъ себя до весьма худого положенія. Призванъ будучи къ нему для пособія, я нашелъ, что ядъ

распространился уже по всему тѣлу, естественный цвѣтъ лица измѣнился, показалась краснота и боль глазъ, боль и раны въ горлѣ, мѣшавшія глотанію, значительная сыпь на головѣ и нестерпимыя боли въ костяхъ, совершенно изнурившія больного. Въ семь домѣ была собственная баня, и я велѣлъ больному ежедневно разъ, а чрезъ нѣсколько времени и по два раза въ день мазаться въ ней сѣрнопеченочною мазью, париться вѣникомъ и перестыться мочалкою съ мыломъ; по выходѣ изъ бани больной, помимый жаждою, пилъ кружку, спакана въ два, отвара изъ корня лапушника (*Decoct. radic. bardanæ*) и чрезъ нѣсколько послѣ сего часовъ принималъ споловую ложку *solut. oxumir. hyd-garg.* Чрезъ принадлецать дней такового пользованія больной совершенно освободился отъ удручавшей его болѣзни.

Сидѣлецъ купца Сыромѣшниковъ, употребляя почти сряду два года внутрь меркуріальныя средства и будучи всегда, даже и зимою, на открытомъ воздухѣ, довелъ себя до жалкаго положенія. Тѣло его было изнурено, руки и ноги тряслись безпрестанно, въ соснавахъ не имѣли никакой твердости

и при малѣйшемъ къ нимъ прикосновеніи болѣли, волосы лезли пучками и голова сильно болѣла. Сему молодому человѣку, имѣвшему отъ роду не болѣе двадцати лѣтъ, велѣлъ я ежедневно ходитъ въ баню, мазаться сѣрно-печеночною мазью, париться вѣнникомъ и переться мочалкою съ мыломъ. Къ удовольствію моему, всѣ вышеписанные припадки миновались и чрезъ двѣ недѣли больной былъ совершенно здоровъ. Сіи и многіе другіе примѣры увѣрили меня, что употребленіе сѣрно-печеночной мази полезно, удобно и выгодно сѣрнопеченочныхъ ваннъ, кои не всегда и не вездѣ можно съ пользою употребить; баня же у насъ въ Россіи находится почти въ каждомъ домѣ, и здоровые даже рѣдкую недѣлю не пользуются благодѣтельнымъ ея вліяніемъ.

Сверхъ сего употребленіе сѣрнопеченочной мази вышеизъясненнымъ образомъ чрезвычайно полезно и въ проспомъ косполомѣ (Arthritis), что также подтвердили мнѣ опыты.

2. ОВЪ ОТКРЫТІИ МЫШЬЯКА ПРИ ОТРАВЛЕНІЯХЪ.

Сообщилъ Профессоръ Химіи С. Нетаевъ.

Ежели бѣлой мышьякъ или такъ называемая мышьяковая кислота (*oxydum arsenici album, acidum arsenicosum*) растворенъ въ чистой водѣ, то его легко открыть можно посредствомъ извѣстковой воды, сѣрноводороднаго газа, сѣрноводородныхъ щелочей, раствора селитроокислаго серебра или сѣрнокислой мѣди въ амміакѣ; но если въ жидкости находятся фосфорнокислыя или солянокислыя соли, либо вещества органическія, то на показанія сихъ прощиводѣйствующихъ средствъ никакъ полагаться не можно. Въ сихъ случаяхъ только одно *возстановленіе* мышьяка даетъ удовлетворительныя результаты, при коихъ всякая другая проба становится ненужною; но для возстановленія малаго количества мышьяка надобно прежде опдѣлить его отъ всѣхъ органическихъ веществъ, и сіе, равно какъ и

самое возстановленіе, производится по способу *Берцелиуса* слѣдующимъ образомъ:

1) Изрѣзавъ желудокъ, варящъ его нѣсколько времени вмѣстѣ съ жидкостію, въ немъ найденною и нѣсколькими драхмами *тисаго кали*, прибавивъ напередъ, если нужно, небольшое количество воды.

2) Черезъ вареніе полученную жидкость насыщающъ *тисною соляною кислотою*, и прибавляющъ небольшой избытокъ сей послѣдней.

3) Смѣсь выливаютъ на бумажную цѣдилку и въ процѣженный растворъ пропускаютъ достаточное количество *сѣроводороднаго газа*. Если въ растворѣ находился мышьякъ, то онъ принимаетъ желтый цвѣтъ (что однакожъ не есть еще вѣрный знакъ присутствія сего металла), и даетъ желтый осадокъ, какъ скоро излишняя часть воды удалится чрезъ выпареніе. Впрочемъ при нѣсколько значительномъ количествѣ сего яда осадокъ является и безъ помощи выпаренія. Жидкость снова процѣживаютъ сквозь самую малую бумажную цѣдилку, чѣмъ собрать на ней весь оный осадокъ, который на сей же цѣдилкѣ промывается пере-

гнанною водою. Онъ есть ничто иное, какъ желтый сѣрнистый мышьякъ.

4) Пошомъ расплавляютъ въ спекляной пробочкѣ нѣсколько *селитры* и бросаютъ въ нее съ цѣдилки собранный *), высушенный, осѣренный мышьякъ, одну часпицу за другою. Присемъ мепалль и сѣра окисляюся безъ огня и вспышки.

5) Соляное вещество, опъ сего въ пробочкѣ образовавшееся, растворяютъ въ самомъ маломъ количествѣ перегнанной воды, прибавляютъ къ раствору *известковую воду* въ избыткѣ и нагрѣваютъ оный до кипѣнія.

6) Образовавшійся въ семъ случаѣ осадокъ (мышьячнокислая извесь, *arsenias calcis*) высушивается при умѣренномъ разгоряченіи, смѣшивается съ порошкомъ свѣжепрокаленного *угля* и кладется въ пробочку, съ одно-

*) Если осадокъ, по малому количеству онаго, съ цѣдилки собранъ бытъ не можеть, то кладутъ оную *въ жидкій амміакъ* (*ammonia liquida. Ph. C.*), въ которомъ сѣрнистый мышьякъ легко растворяется. Чрезъ выпареніе жидкости въ часовомъ стеклѣ оный опять въ плотномъ сосноянніи легко полученъ бытъ можеть.

го конца запаянную *), такъ чтобы наполнивъ сею смѣсью четвертую или третью часть пуспосы ея. За симъ разгорячаютъ сперва самую пробочку для удаленія изъ оной всякой влажноти, а потомъ раскаляютъ **) до размягченія спекла ту часть оной, въ которой заключена сказанная смѣсь. Мышьякъ изъ оной скоро *возстановляется*, и возгоняясь, получается въ видѣ спально-цвѣтнаго, блестящаго, совершенно явспвеннаго, металлическаго кольца, которое образуется въ пробочкѣ тамъ, гдѣ она выходитъ изъ пламени лампы.

При семъ дѣлопроизводствѣ:

1) Во время варенія желудочной смѣси ѣдкое кали прибавляется для того, что оно соединяется съ бѣлымъ мышьякомъ какъ съ кислотою, составляя мышьяковатокислое кали (*arseniz potassæ*) и дѣлая его чрезъ то удобораспворимымъ, совершеннѣе извлекаетъ

*) Въ діаметръ не болѣе двухъ линій; длиною отъ 5 до 6-ти дюймовъ.

**) Надъ спиртною лампадою, или предъ паятельною пробкою.

✱

изъ матерій, съ которыми онъ былъ смѣшанъ.

2) Прибавленная попомъ соляная кислота, соединяясь со щелочью, отдѣляетъ отъ оной бѣлый мышьякъ и удерживаетъ его избыткомъ своимъ въ растворѣ.

3) Сѣроводородный газъ, пропускаемый въ жидкость, разлагается мышьяковою кислотою, такъ что водопворъ газа съ кислотою ея составляетъ воду, а сѣра съ металломъ сѣрнистый мышьякъ, который является въ видѣ желтаго осадка.

4) Расплавленная селифра кислотою своимъ окисляетъ совершенно обѣ составныя части сего осадка; причемъ сѣра превращается въ сѣрную кислоту, а мышьякъ въ мышьяковую; обѣ оспаются соединенными съ кали, происходящимъ отъ разложенія селифры, образуя мышьячнокислое, сѣрнокислое и селифрокислое кали.

5) Извѣстковая вода осаждаетъ изъ раствора сихъ солей одну только мышьяковую кислоту: ибо извѣсть, соединяясь съ кислотою сею, образуетъ нерастворимую мышьяковую извѣсть.

6) Уголь при доспапочномъ разгоряченіи опнимаесть кислоторъ опъ мепаллической кислоты сей, причемъ воспановленный мышьякъ, по лепучеспи своей, воспановляеься въ корольковомъ соспояніи.

3. Пиротонидъ (Pirothonide).

Сообщено Г-мъ Нелюбинымъ.

Пиротонидъ еьть новое врачебное средство, опкрытое Французскими Врачами и введенное въ общее упопребленіе во всѣхъ Французскихъ госпипаляхъ. Симъ именемъ Французскіе Врачи называютъ красное, неприяшнаго, пригорѣлаго запаха и жгучаго, оспраго вкуса вещество, получаемое помощью медленнаго сожиганія бумажной матеріи (калинкора, мипкала и другихъ пканей, изъ хлопчатой бумаги пригошовленныхъ) въ мепаллическомъ сосудѣ, при свободномъ доступѣ атмосфернаго воздуха. Надъ симъ средствомъ сдѣланы въ прошломъ 1828-мъ году многіе любопытные опыты, кои свидѣельствуютъ объ опличномъ его дѣйствіи во многихъ болѣзняхъ, и въ семъ опношеніи оно

дѣйствительно заслуживаетъ особенное вниманіе Врачей.

Болезни, въ коихъ пиротонидъ оказался полезнымъ, суть слѣдующія:

1. Воспаленіе глазъ хроническое (ophthalmia chronica).

2. Пятна на роговой оболочкѣ (nubeculae et maculae corneae).

3. Язвы на роговой оболочкѣ (ulcuscula corneae).

4. Болѣзни горла, воспалительнаго качества. Докторъ Ранкъ (Ranque, Главный Врачъ при госпитали Hôtel-Dieu въ Парижѣ) въ сихъ болѣзняхъ много разъ употреблялъ сіе средство съ опимѣнною пользою.

5. *Крупъ* и *жаба*, съ англоновымъ огнемъ сопряженная (angina polyporea et gangraenosa), излѣчены были въ короткое время пиротонидомъ.

6. Въ скарлатинѣ и кори пиротонидъ оказался также опимѣнно полезнымъ.

Докторъ Ранкъ весьма много говоритъ въ пользу сего лѣкарства и дѣйствіе его въ сихъ болѣзняхъ сравниваетъ съ дѣйствіемъ сѣрнокислаго хинина въ перемежающихся ли-

хорадкахъ. Если сіе справедливо, то Фармакологія сдѣлаеть важное пріобрѣтеніе въ семь драгоцѣнномъ и весьма дешевомъ средствѣ, что однакъ же пребудеть дальнѣйшихъ наблюденій и опытовъ безприсраспныхъ Врачей.

Пиропонидъ, по мнѣнію моему, много сходствуетъ съ древнимъ пригорѣлымъ бумажнымъ масломъ, которое напредъ сего употреблялось въ зубной боли и глазныхъ болязняхъ.

Пиропонидъ можетъ быть приготоовленъ въ большемъ количествѣ, и притомъ довольно дешево, слѣдующимъ образомъ: середина желѣзнаго ружейнаго спвола, около фута длиною, наполняется изрѣзанною бумажною матеріею; спволь кладется горизонтально въ опивную печь, коего одинъ конецъ соединяется съ небольшимъ пріемникомъ, погруженнымъ въ холодную воду, а въ другой конецъ вкладывается небольшой раздувательный мѣхъ. Ружейный спволь мало помалу разогрѣвается и наконецъ раскаливается. Въ сіе время атмосферный воздухъ пропускается помощію мѣха сквозь трубку, отъ чего бумажные лоскупки исподоволь сожигаются при

дослупъ воздуха, а образующійся пирошо-
идъ переходить въ пріемный сосудъ.

4. Средство противъ тесотки.

Докторъ *Пеллегрени* весьма одобряетъ пропивъ сей болѣзни болиголовъ (*Conium maculatum*). Свѣжіе лиспы распѣнія толкуш-
ся въ каменной ступкѣ и изъ нихъ выжи-
мается сокъ, коимъ омываются, пяць или
шестъ разъ въ день, сыпью покрыпыя ча-
спи. Болѣзнь проходитъ скоро. Нѣсколько
разъ онъ также употреблялъ порошокъ ля-
сповъ, опваръ и экстрактъ, и всегда съ
хорошимъ успѣхомъ.

Notizen von Frohier. Bd. xх. стр. 192.

5. Средство противъ чумы.

Г. *Лессепсъ*, Французскій Консулъ въ
Алеппо, прислалъ Парижской Медицинской
Академіи извѣстіе о пользѣ *Лабарракова*
хлорюра для предохраненія и лѣченія чумы.

Тамъ же.

6. Іодинъ противъ подагры.

Основываясь на томъ, что Іодинъ былъ
употребленъ съ хорошимъ успѣхомъ пропивъ

холодныхъ опухолей членосоединеній, Г. Жан-дренъ рѣшился испытать сіе средство противъ застарѣлыхъ наростовъ подагранныхъ, и оно такъ скоро оказало разрѣшающее дѣйствіе, что Г. Жандренъ, полагая, что оно дѣйствуетъ противъ самой причины болѣзни, употребилъ его снаружи и внутрь при острыхъ припадкахъ подагры. Первый опытъ, сдѣланный надъ очень крѣпкимъ человѣкомъ, имѣвшимъ сильный припадокъ подагры, былъ споль удаченъ, что сказанный Врачъ пожелалъ увеличить число своихъ наблюденій въ семь отношеніи, и послѣ того онъ еще семь человѣкъ совершенно излѣчилъ опъ припадковъ острой подагры. Только у двухъ лѣчение было затруднительно; они должны были, при появленіи первыхъ признаковъ приступа, глотать нѣсколько приѣмовъ Іодина, дабы отврапитъ совершенное его развитіе. Всѣ больные, продолжавшіе употреблять лѣкарство 2-3 мѣсяца, по прекращеніи приступа, не имѣли никакихъ припадковъ болѣзни. Одинъ изъ сихъ больныхъ, въ продолженіи сего времени, долженъ бы имѣть восемь приступовъ подагры, три по пяти, одинъ четыре и два по три приступа, но онъ со-

всѣмъ не появлялись. Изъ чепырехъ болѣ-
ныхъ, спрадавшихъ подагрою съ хроническою
опухолью соспавовъ, два излѣчились совер-
шенно чрезъ продолжительное наружное упо-
требленіе Іодина, пому уже чепыре года,
одинъ за годъ, а чепверпый еще лѣчипся.
У всѣхъ больныхъ лѣченіе поддерживалось
соотвѣпспвующею діешюю, коппора при хро-
нической подагрѣ была нѣскольпо крѣпипель-
ная, а при оспрой *болеутолительная*.

Тамъ же спр. 255.

7. Spina bifida.

Г. *Пробартъ* предспавляетъ въ Medico-
Chirurg. Review примѣръ сей болѣзни, излѣ-
ченной повпоренными прободеніями. Проис-
ходившее опъ прокалыванія воспаление по-
крововъ надъ опухолью и судороги были лѣ-
чены півками и слабипельными.

8. Средство противъ слюнопеченія отъ *ртуты*.

Докторъ *Филе*, въ Бенбриджѣ (Огіо), упо-
требляетъ проптивъ слюнопеченія, произве-
деннаго ртутью, рвопный камень (tartar.
stibii et potassæ) слѣдующимъ способомъ: онъ
даетъ всякіе два часа $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ часпн грана сей

соли, растворенной въ водѣ, такъ чтобы она легко дѣйствовала на кожу и кишечный каналъ, и продолжаетъ до тѣхъ поръ, пока слюнопеченіе совсѣмъ прекратится. Г. Филе увѣряетъ, что чрезъ супки примѣрно бываетъ значительное облегченіе, особливо боль въ рту и глоткѣ уменьшается, и что онъ симъ способомъ въ нѣсколько дней уничтожилъ слюнопеченіе, продолжавшееся цѣлые мѣсяцы.

Notizen. Bd. xx. стр. 320.

9. *Употребленіе рожковъ ржи (vesale cognutum) для возбужденія родовыхъ потугъ и для изгнанія послѣда.*

1. Одна беременная женщина сильно испугалась, послѣ чего движеніе младенца вдругъ прекратилось, такъ что и помощію степоскопа оно не было слышно. Чрезъ 16-ть дней появились родовыя потуги, отверстіе матки открылось, дѣтскія воды вышли и показалось легкое кровошеченіе изъ матки, какъ вдругъ потуги прекратились. Призванный Врачъ сперва долго ожидалъ возвращенія потугъ, но наконецъ рѣшился употребить рожки ржи. Въ печеніи двухъ часовъ

больная приняла ихъ двѣ драхмы. Послѣ сего появились сильныя попуги, роды окончились благополучно и по выходѣ зародыша, уже начавшаго гнить, кровопеченіе прекратилось.

Тамъ же.

2. Одна женщина выкинула, 13-го Генваря 1828 года поушру въ 8 часовъ, зародыша мѣсяцовъ чепырехъ, но послѣдъ оспался. 14, 15 и 16-го были употреблены разныя средства, но безъ пользы. Ввечеру 16-го числа пригоповлена наливка изъ драхмы рожковъ на чепыре унціи воды, полчася наспоаянная, и въ 9 часовъ женщина приняла половину оной, а въ 10 часовъ и другую. Чрезъ полчася появились спягиванія и нѣсколько крови, ночью вышла большая часть послѣда, а оспальное вечеромъ слѣдующаго дня, безъ всякаго лѣкарства.

Тамъ же спр. 304.

3. Уже пять лѣтъ, говоритъ Докторъ *Келеръ* (въ Пруссіи), употребляю я *zesele cognitum* для возбужденія попугъ съ отличнымъ успѣхомъ. Обыкновенно я даю пять гранъ каждый часъ, пока воспослѣдуелтъ около осьми сильныхъ попуговъ въ часъ. Это случается большею частію послѣ втораго

или третяго приѣма, тогда я прекращаю употребленіе лѣкарства и не имѣю въ немъ болѣе надобности, поелику возбужденныя пошуги достапочны для совершенія родовъ. До сего времени средство сіе мнѣ не измѣняло. При родахъ, продолжавшихся уже три и четыре дня, когда по причинѣ общей и мѣстной слабости, пошуги совсѣмъ прекрапились и другія одобряемая средства остались не дѣйствительны, *vesale cornutum* дѣйствовало превосходно. Таковую же пользу я видѣлъ отъ сего средства и въ тѣхъ случаяхъ, когда пошуги отъ судорогъ прекрапились и когда *stosus*, *orіum* и проч. были употреблены безъ всякаго успѣха. Въ одномъ случаѣ пошуги прекрапились, по видимому, отъ полнокровія, но кровопусканіе не принесло никакой пользы, а рожки оказали желаемое дѣйствіе. Мнѣ кажется, что рожки дѣйствуютъ на мапку также вѣрно, какъ *bella-dona* на радужную перепонку глазъ.

Rust's Magazin. Bd. xxv. Hft. 1. стр. 104.

10. Трудное прорѣзываніе зубовъ.

Познаньскій Докторъ *Фретеръ* видѣлъ весьма хорошее дѣйствіе на прорѣзываніе зу-

бовъ опъ обвиванія шеи повязкою, намазанною ungu. suboxydi hydrargyri; послѣ чего появляется легкое слюнопеченіе и шѣмъ отвращается воспаленіе десенъ и другіе опъ того зависящіе болѣзненные припадки.

Rust's Magazin. Bd. xxv. Heft. 1.

11. Вліяніе возраста родителей на опредѣленіе пола дѣтей.

Тибингенскій Профессоръ Гофаккеръ, разсмошрѣвъ полъ 2000 дѣшей, въ опношеніи къ возраспу ихъ родипелей, вывелъ изъ шого слѣдующія заключенія:

1. Опъ браковъ, въ коихъ жены спарше мужей, число рожденныхъ мальчиковъ содер-
жипся къ числу дѣвочекъ—90, 6: 100 (въ
Тибингенѣ вообще раждается 107 мальчи-
ковъ пропивъ 100 дѣвочекъ).

2. Мужъ и жена равныхъ лѣтъ 92 маль-
чика: 100 дѣвочекъ.

3. Мужъ 3—6 лѣтъ спарѣ жены—103, 4:
100, слѣдовательно какъ въ Европѣ вообще.

4. Мужъ 6—9 лѣтъ спарѣ жены—124, 7:
100.

5. Мужъ 9—12 и болѣе лѣтъ спарѣ же-
ны—143, 7: 100.

6. Мужъ 48 лѣтъ и болѣе \equiv 200 мальчиковъ: 100 дѣвочекъ.

7. Молодые (24-36 лѣтъ) мужа съ молодыми женами 16—24-хъ лѣтъ рождаютъ 116, 6 мальчиковъ: 100 дѣвочекъ.

8. Молодые мужа съ женами среднихъ лѣтъ (26-36) \equiv 94, 2: 100.

9. Молодой мужъ съ пожилою женою (36-46 лѣтъ) \equiv 95, 4: 100.

10. Мужъ среднихъ лѣтъ (36-48) съ молодою женою \equiv 176, 9: 100.

11. Мужъ и жена среднихъ лѣтъ \equiv 114, 3: 10.

12. Мужъ среднихъ лѣтъ съ пожилою женою \equiv 109, 2: 100.

13. Пожилой мужъ (48-60 лѣтъ) съ молодою женою, не опредѣлено по малому числу примѣровъ.

14. Пожилой мужъ съ женою среднихъ лѣтъ \equiv 190: 100.

15. Мужъ и жена пожилыхъ лѣтъ \equiv 164, 3: 100.

Такое же точно содержаніе найдено и въ одной деревнѣ близъ Тибингена.

Medicinisch-Chirurgische Zeitung. Bd. iv. 1827. стр. 398.

XII.

ОФИЦИАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО ЯНВАРЯ ПО 1-Е МАРТА 1899 ГОДА.

1. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ на высшія мѣста.*

Полевыми Генералъ-Штабъ-Докторами во 2-ю Армію назначены по Высочайшему повелѣнію Главный Доктор Придворной госпитали Доктор Медицины и Хирургіи Дѣйствительный Спасскій Совѣтникъ Вишнь. Дивизионными Докторами въ 12-ю пѣхотную Дивизію Старшій Доктор Старорусской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Шарфскій. Старшими Медиками въ 4-ю Драгунскую Дивизію Штабъ-Лѣкаръ 12-й Артиллерійской Бригады Коллежскій Ассесоръ Наумовъ. Старшими Лѣкарами Штабъ-Лѣкары: въ Костромскій пѣхот-

ный полкъ Младшій Лѣкаръ 4-й Артиллерійской Бригады Бѣлинскій; въ Елецкій пѣхотный полкъ Конно-Артиллерійской Но 11-го роты Гагеманъ; въ 43-й Егерскій полкъ Волгскаго Козачьяго полка Ивановскій; во Владикавказскую военную госпиталь Владикавказскаго гарнизоннаго полка Докучаевъ; въ Навагинскій пѣхотный полкъ Моздокскаго гарнизоннаго баталіона Борцевскій; въ Анапское госпитальное отдѣленіе Лѣкаръ Таманскаго гарнизоннаго полка Шпрингеръ, а въ сей полкъ Штабъ-Лѣкаръ Хоперскаго Козачьяго полка Рябцовъ; въ Гродненскую военную госпиталь Ординашоръ Варшавской Гвардейской военной Россійской госпитали Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Любимовъ; въ Черниговскій Конно-Егерскій полкъ Штабъ-Лѣкаръ Дерптскаго Конно-Егерскаго полка Спасскій; въ дѣйствующую армию Ординашоръ Московской военной госпитали Докшоръ Медицины Бекъ.

2. *Вновь поступившіе въ службу.*

Изъ Императорскаго Московскаго Университета Лѣкаръ 1-го отдѣленія Адольфъ Гассень-Миллеръ въ Иркутскій Гусарскій

полкъ Младшимъ Лѣкаремъ. *Изъ Императорскаго Дерптскаго Университета Докторы Медицины:* Геральдъ Пельхау въ Могилевскій пѣхотный полкъ, Августъ Дрейеръ, Лѣкарь 1-го отдѣленія Адольфъ Линднеръ во 2-ю армію. *Изъ иностранныхъ Докторовъ:* Алоизій Церцъ, Александръ Тавержіо и Павелъ Тоджіо во 2-ю армію. *Изъ вольнопрактикующихъ:* Лѣкарь 2-го отдѣленія Владиславъ Ревельдъ въ Курскій пѣхотный полкъ Младшимъ Лѣкаремъ, Лѣкарь 1-го отдѣленія Василій Фусъ въ С. Петербургскую военносухопутную госпиталь Ординашоромъ, Лѣкарь Андрей Авраамовъ въ 10-й Егерскій полкъ Младшимъ Лѣкаремъ. *Бывшій въ Польской службѣ Штабъ-Лѣкарь* Игнацій Кржиманскій въ дѣйствующую армію. *Изъ Гражданскаго вѣдомства:* Лѣкари Коллежскіе Секретари: Пётръ Рѣпьевъ въ Омскую военную госпиталь Ординашоромъ, Михайло Рапшковъ въ Кизильскій гарнизонный баталіонъ, Лѣкарь Швинскій въ Бобруйскую военную госпиталь Ординашоромъ, Штабъ-Лѣкарь Коллежскій Сопроводникъ Кладкевичъ во 2-ю армію, Лѣкарь Коллежскій Секретарь Мокржицкій въ Брестскій пѣхотный полкъ Младшимъ Лѣкаремъ.

Изъ Императорской Медико-Хирургической Академіи Лѣкари 1-го отдѣленія: Николай Благовѣщенскій 2-й въ Нижегородскій Драгунскій полкъ, Кипріанъ Бобровницкій въ Рыльскій пѣхотный полкъ, Семень Боголюбовъ въ Симферопольскую военную госпиталь Ординапоромъ, Ефимъ Дроздецкій въ 22-ю Артиллерійскую Бригаду, Александръ Жураковскій въ Тифлисскій пѣхотный полкъ, Θεодосій Заушкевичъ въ Спароскольскій пѣхотный полкъ, Константинъ Лоппашо въ 12-ю Артиллерійскую Бригаду, Николай Максимовичъ въ Воронежскій пѣхотный полкъ, Степанъ Поцолоевскій въ Тульчинскую военную госпиталь Ординапоромъ, Данило Якушкевичъ въ Казанскій пѣхотный полкъ, Дмипрій Песоцкій Лейбъ-Гвардіи въ Гарнизонный баталіонъ, Моисей Ямковскій въ 38-й Егерскій полкъ, Игнапій Назаровъ въ Грузинскій Гренадерскій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича полкъ. 2-го отдѣленія: Θεодоръ Андреевскій и Александръ Хлѣбниковъ въ Одесскую военную госпиталь Ординапорами; Фридрихъ Арнингъ, Николай Благовѣщенскій 1-й, Иванъ Богдановскій, Захаръ Боровниковъ, Ефимъ Бупашевичъ—Петрашев-

*

скій, Анеиногенъ Добржанскій во 2-ю армію, Михайло Любомудровъ въ Крымскій пѣхотный полкъ, Павелъ Можилевскій, Василій Разумовскій, Романъ Фяшеръ, Алексѣй Тяжеловъ во вновь учрежденный подвижный магазинъ 2-й арміи, Александръ Симаковъ въ 44-й Егерскій полкъ, Николай Циповичъ въ Тенгинскій пѣхотный полкъ. 3-го *отдѣленія*: Николай Борнатиный, Гаврило Краковскій, Николай Пепровъ и Григорій Циповичъ во 2-ю армію. Изъ Императорскаго *Вилenskaго Университета*: Лѣкари 1-го *отдѣленія*: Казимиръ Эйсимонпъ въ 4-ю Артиллерійскую Бригаду Младшимъ Лѣкаремъ, Карлъ Герлопъ въ 10-й Егерскій полкъ, Николай Куцевичъ въ 5-ю Артиллерійскую Бригаду, Войтехъ Мезеръ въ Нижегородскій пѣхотный полкъ, Амвросій Минковский въ Пензенскій пѣхотный полкъ, Левъ Оссовскій въ 17-й Егерскій полкъ, Ромуальдъ Сѣмашко въ Якутскій пѣхотный полкъ, Касперъ Будзыньскій въ Армейскій Конно-Піонерный Эскадронъ, Адамъ Гоздовскій въ резервный 3-й баталіонъ 16-го Егерскаго полка, Пепръ Козловскій въ 3-й баталіонъ Брянскаго пѣхотнаго полка, Гаврило Остаповичъ въ 3-й баталіонъ

Сшароскольскаго пѣхотнаго полка. 2-го *отдѣленія*: Игнапій Чаплинскій въ 3-й баталіонъ 24-го Егерскаго полка, Онуфрій Корженевскій въ 3-й баталіонъ Низовскаго пѣхотнаго полка, Варнабъ Рогоулько, Осипъ Шверинъ, 3-го *отдѣленія*: Игнапій Гележинскій, Осипъ Марцынкевичъ, Павелъ Ордынецъ, Николай Шрейберъ, Пеліръ Спаверей, Казимиръ Здзиповецкій во 2-ю армію. Кандидатъ Медицины Викентій Флорковскій въ Виленскую военную госпиталь Ординапоромъ.

3. *Производство въ чины званія.*

Во Штабѣ Лѣкари. Лѣкари: Ординапоръ Артиллерійской госпитали Бурмейсперъ, вновь сформированной ракетной № 4-го роты Прозоровъ, Черноморскаго Козачьяго войска Гедушекъ, Таманскаго Гарнизоннаго полка Шпрингеръ, Кабардинскаго пѣхотнаго полка Ребровъ, Крымскаго пѣхотнаго полка Смирновъ, Нагдебургскаго пѣхотнаго полка Графъ, 22-й Артиллерійской Бригады Барпашевичъ, Драгунскихъ полковъ: Каргопольскаго Барановъ, Новороссійскаго Белюстинъ, Лейбъ-Гвардіи Измайловскаго полка Владиміровъ, состоящій во 2-й арміи сверхъ комплекта

Михайловскій, 8-го Егерьскаго полка Бушовскій, Ординапоръ Тихильской полугоспитали Баумгаршенъ, 1-й Гренадерской Артиллерійской Бригады Вороновъ, Виленскаго пѣхотнаго полка Гиньковъ, Минскаго пѣхотнаго полка Грищенковскій, Житомирскаго пѣхотнаго полка Піотровскій, 25-й Артиллерійской Бригады Скворковскій, Гренадерскаго Наслѣднаго Принца Прусскаго полка Яхшиповичъ, Конно-Артиллерійской Но 1-го роты Громовъ, Архангелогородскаго Гарнизоннаго полка Виноградовъ.

4. Производство въ чины.

Въ 3-й классъ произведенъ Шпабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Павловскаго полка Докторъ Медицины Тихомировъ.

5. Увольненіе отъ службы.

Ординапоръ Чугуевской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣшникъ Трепьяковъ съ пенсіономъ по 900 рублей въ годъ; Старшій Лѣкаръ Гродненской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣшникъ Кудрявцовъ съ Военно-Медицинскимъ мундиромъ; Шпабъ-Лѣкаръ Нарвскаго Гусарскаго

полка Шефферъ; Старшій Ветеринарный Лѣкарь Лейбъ-Гвардіи Коннаго полка Лебедевъ; Ветеринарный Лѣкарь Сумскаго Гусарскаго полка Гончаровъ. Перемѣщенъ въ Гражданское вѣдомство Ординапоръ Чугуевской военной госпитали Шпабъ-Лѣкарь Коллежскій Ассесоръ Коморницкій. За непрезвое поведеніе исключенъ изъ службы Ординапоръ Тульчинской военной госпитали Лѣкарь Красносельскій.

6. Награды.

По засвидѣтельствванію Главнокомандующаго Опдѣльнымъ Липовскимъ Корпусомъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича объ опличномъ усердіи къ службѣ Всемилоштивѣйше награждены: Бѣлостокскаго госпитальнаго опдѣленія Шпабъ-Лѣкарь Кондонъ *тиноиъ Коллежскаго Ассесора*; Старшій Лѣкарь Гродненской военной госпитали Шпабъ-Лѣкарь Надворный Совѣтникъ Кудрявцовъ 900 *рублей единовременно*. По засвидѣтельствванію Начальсва объ опличномъ усердіи къ службѣ Всемилоштивѣйше пожалованы: Корпусный Шпабъ-Докторъ Опдѣльнаго Кавказскаго Корпуса Смаишскій Совѣт-

никъ *Зубовъ Кавалеромъ ордена Св. Владимира 3-й степени*; 13-го Егерскаго полка *Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Баршашскій ордена Св. Владимира 4-й степени*; 15-го Егерскаго полка *Штабъ-Лѣкаръ Цыпрановичъ*, 16-го Егерскаго полка *Штабъ-Лѣкаръ Бошняговъ* и *Штабъ-Лѣкаръ Конно-Артиллерійской Но 22-го роты Коллежскій Ассесоръ Преторіусъ ордена Св. Анны 3-й степени*; *Штабъ-Лѣкаръ Ериванскаго Карабинернаго полка Коллежскій Ассесоръ Силичъ награжденъ единоновременно годовымъ жалованьемъ. Въ награду оплочно-усердной службы, Начальствомъ засвидѣтельствованной, Всемилостивѣйше пожалованы въ Коллежскіе Ассесоры: Старшій Лѣкаръ Глуховскаго Кирасирскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Вейсбахъ и Конно-Егерскаго Его Величества Короля Виртембергскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Богоявленскій. За выслугу 20-ти лѣтъ въ Лѣкарскомъ званіи Высочайше повелѣно производить половинный пенсіонъ Старшимъ Лѣкарямъ военныхъ госпиталей: Выборгской Спашскому Совѣтнику Валперу и Омской Надворному Совѣтнику Орлову, Штабъ-Лѣкарямъ: Екашеринославской казенной еукон-*

ной фабрики Коллежскому Совѣшнику Зегеру, Ординапору Ораніенбаумской военной госпитали Штабъ-Лѣкарю Надворному Совѣшнику Попову, Штабъ-Лѣкарю Александровской Манифактуры Коллежскому Совѣшнику Анжу и Полковому Штабъ-Лѣкарю Лейбъ-Гвардіи Липовскаго полка Надворному Совѣшнику Генрицію.

7. Умершіе.

Ординапоръ Рижской военной госпитали Докторъ Медицины Спальскій Совѣшникъ Баумеръ, Старшій Лѣкаръ Елецкаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассессоръ Вахе, Старшій Лѣкаръ Тульчинской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣшникъ Рихтеръ, Лѣкаръ Тобольскихъ Эшапныхъ командъ Дьяковскій, Мангальской военно-временной госпитали Ординапоръ Лѣкаръ Мироль, 22-й Артиллерійской Бригады Лѣкаръ Галкинъ, Тифлискаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Покровскій, Старшій Лѣкаръ Нарвской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣшникъ Лолонгъ, Крымскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Рейхъ, Старшій Лѣкаръ Казанскаго пѣхотнаго пол-

ка Шпабъ-Лѣкаръ Георгезонъ, 38-го Егерскаго полка Лѣкаръ Погожевъ, Дивизионный Докторъ сводной Гвардейской и Гренадерской Дивизии Отдѣльнаго Лишовскаго Корпуса Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Слауповичъ, Шпабъ-Лѣкаръ Пензенскаго пѣхопнаго полка Николаевъ, Апшеронскаго пѣхопнаго полка Лѣкаръ Халуйскій, Ординапоръ Гирсовской военной госпитали Лѣкаръ Соколовъ, пѣхопнаго Герцога Веллингтона полка Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Шпигельбергъ, 44-го Егерскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Депаловичъ и Ветеринарный Помощникъ 1-го *отдѣленія* Гусарскаго Принца Оранскаго полка Терентьевъ.

XII.

ЛУЧШИЯ НОВѢЙШИЯ МЕДИЦИНСКИЯ СОЧИНЕНІЯ *).

1. De l'auscultation mediate ou Traité du diagnostique des maladies des poumons et du conur, fondé principalement sur le nouveau moyen d'exploration, par R. T. H. Laennec. Paris, 1819. II. Tomes.

*) Пространство сего Журнала не позволяеть помѣщать въ немъ рецензіи даже лучшихъ Медицинскихъ и другихъ, для Врача полезныхъ иностранныхъ сочиненій; посему Редакція вознамѣрилась сообщать по крайней мѣрѣ заглавія таковыхъ сочиненій, съ намѣреніемъ обратиться на оныя вниманіе тѣхъ изъ читателей, которые, не имѣя возможности получить о семъ свѣденія другимъ путемъ, желали бы выписать хорошее сочиненіе по какому либо предмету.

Въ выборѣ сочиненій Редакція будетъ руководствоваться частію мнѣніемъ своихъ со-

Die mittelbare Auskultation, oder Abhandlung über die Diagnostik der Krankheiten der Lungen und des Herzens, von Laennec, nach dem Französischen im Anzuge bearbeitet. 2 Bde, Weimar, 1822.

2. Traité des maladies des articulations, par B. C. Brodie. Traduit de l'Anglois par L. Marchant. Paris, 1819.

5. Grundsätze der Geburtshülfe, von Burns Aus dem Engl. von Dr E. H. C. Köplin. 1820.

4. Medecine pratique éclairée par l'anatomie et la physiologie pathologique, par. J. Cruveilhier. Paris, 1821.

5. Ueber Schusswunden in den Extremitäten und die dadurch bedingten verschiedenen Operationen, von G. J. Guthrie A. d. Engl. von G. Spangenberg. Berlin, 1821.

спрудниковъ и другихъ свѣдущихъ Врачей, а частію рецензіями лучшихъ иностранныхъ журналовъ.

Касательно издающихся въ Россіи, къ Медицинѣ относящихся сочиненій Редакція приняла за правило помѣщать извѣстія, болѣею частію съ замѣчаніями, только о тѣхъ изъ нихъ, которыя свѣдущими о томъ предметѣ лицами будутъ признаны достойными вниманія Врачей.

6. Abhandlung über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen, von K. Hastings. A. d. Engl. von Busch. Berlin. 1822.

7. Practical observations on distortions of the spine, chest and limbs, by W. T. Ward. London, 1822.

8. Handbuch der practischen Augenheilkunde, von Dr. T. W. Benedict. 4. Bde. Leipzig. 1822. и слѣд.

9. Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt von Dr Joh. Wendt. Breslau und Leipzig, 1822.

10. Die Krankheiten der Künstler und Handwerker und die Mittel sich vor denselben zu schützen, von Ph. Patisier. A. d. Franz. von Schlegel. Jlmeneau. 1823.

11. Von der Stellung des Arztes im Staate, von Fr. Nasse. Leipzig. 1823.

12. Die Lehre von den Lungenkrankheiten, nach ihrem gegenwärtigen Zustande, von Dr. C. J. Lorinser. Berlin, 1823.

13. De la moëlle epinière et de ses maladies, par Ollivier. Paris; 1824.

Ueber das Rückenmark und seine Krankheiten, von Ollivier. A. d. Franz. mit Zusätzen von Dr J Radius. Leipzig, 1824.

14. Allgemeine medicinisch - diagnostische Untersuchungen, von Dr S. G. Vogel. 1. Thl. Stendal, 1824.

15. Gründliche Darstellung des Heilverfahrens in entzündlichen Fiebern überhaupt, und ins-besondere im Scharlache, mittelst der Anwendung des lauwarmen, kühlen oder kalten Wassers, von Dr A. Fröhlich. Wien. 1824.

гносисъ
Vogel, :
teilverh
aupt, z
telst d
oder r
ed. 182

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

**МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.**

~~~~~  
**Часть XIII. N. 9.**  
~~~~~

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

САНК.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

**ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.**

1 8 2 9 г о д а .

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стр</i>
I. О жизненныхъ припасахъ, какъ предметъ Медицинской Полиціи.	165.
II. Замѣчанія о перемежающейся лихорадкѣ	247.
III. Наблюденія надъ напущнымъ (кровавымъ) поносомъ	265.
IV. Хлориновая сода	276.
V. С М Ъ С Ъ:	
1. Средство для открытія мышьяка.	291.
2. Дѣйствіе зеленого чая. . . .	294.
3. Употребленіе сѣрнокислой жѣлѣзы при воспаленіи наружныхъ оболочекъ глазъ	298.
VI. Официальныя извѣстія съ 1-го Марта по 1-е Маія 1829 года.	304.

**О ЖИЗНЕННЫХЪ ПРИПАСАХЪ ,
КАКЪ ПРЕДМЕТЪ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОЛИЦИИ (Cura victualium, quatenus
Politiam Medicam spectat).**

Сочиненіе Докт. Мед. Ст. Хотовицкаго.

Жизненными припасами называются вещества, служація для вознагражденія убыли, причиняемой нашему организму самымъ жизненнымъ процессомъ. Одни изъ сихъ веществъ служатъ къ успокоенію голода, а другія къ утоленію жажды. Первые именуются пищею, а послѣднія пипіемъ, и принадлежатъ посему къ такимъ потребностямъ, безъ коихъ чловѣкъ не можетъ продолжатъ бытія своего.

Два естественныя побужденія, голодь и жажда, напоминають чловѣку о необходимости питательныхъ веществъ, какъ первый изъ условій продолженія жизни. Природа, одаривъ чловѣка сими двумя побужденіями,

*

снабдила его вмѣстѣ и средствами, служащими къ успокоенію оныхъ,—пищательными веществами. Такимъ образомъ значительная часть естественныхъ произведеній найдена способною для питанія нашего плѣа, не говоря уже о томъ, что родъ жизни, воспитаніе, привычка, климатъ и другія многія обстоятельствова могутъ превратить въ безвредную пищу и питье такіа вещества, которыа, по свойству своему, суть очевидно вредны для здоровья и жизни человека.

Поелику пища и питье, при всемъ оныхъ разнообразіи у различныхъ народовъ, тогда только соотвѣтствуютъ въ полной мѣрѣ своему назначенію, когда люди не терпятъ никакого недосыатка въ оныхъ: то конечно нужно прежде всего досыаточное и съ народонаселеніемъ каждой страны сообразное количество жизненныхъ припасовъ. Досыаточное однакожъ количество съспныхъ припасовъ, неимѣющихъ должной свѣжести и здоровости, едва ли не вреднѣе самаго недосыатка въ оныхъ, хотя впрочемъ вредныа качества питательныхъ веществъ сопряжены весьма плѣсно съ недосыаточнымъ количествомъ оныхъ.

Для отвращенія недостатка въ съѣстныхъ припасахъ нужно, какъ по само собою явствуетъ, устранять по возможности причины онаго. Въ семъ отношеніи слѣдующія средства почитаются главнѣйшими: 1) усовершенствованіе земледѣлія и скотоводства; 2) запасъ на будущее время, составляемый въ плодородные годы избыткомъ пищевыхъ веществъ; 3) строгая разборчивость и экономность касательно употребленія пищевыхъ веществъ на гонку вина и другія, какъ хозяйственныя, такъ и торговыя потребности. Въ Россіи изданы по сему предмету Высочайшіе Указы, а именно: Указъ 1810 Августа 17, „Объ отдѣленіи дѣлъ, входящихъ въ составъ Министерствъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, показано по предмету части Медицинской и о карантинныхъ.—Росписаніе предметовъ, входящихъ въ составъ Министерства Полиціи.—Министерства Внутреннихъ Дѣлъ изъ 1-й Экспедиціи всѣ дѣла по охраненію народнаго продовольствія жизненными припасами. Сюда относятся: 1. объ охраненіи общихъ постановленій, относительно продовольствія; 2. о мѣрахъ, принимаемыхъ въ случаѣ неурожая и

другихъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, къ продовольствію относящихся; 3. содѣйствіе въ заготовленіи провіанта и фуража для войскъ и мѣстъ казенныхъ; 4. составленіе, содержаніе, возобновленіе и распорядокъ сельскихъ и городскихъ хлѣбныхъ магазиновъ и шабели ихъ соспожня“ и п. д.—Указъ 1812 Генваря 2. „Высочайше конфирмованное учрежденіе и образованіе Военнаго Министертва. Ч. I. гл. 7. Составъ и предметы Департаментна Провіантскаго. § 102. Предметы перваго Стола сего Оудѣленія суть: собраніе нужныхъ свѣдѣній и картъ для соображенія о удобнѣйшихъ и выгоднѣйшихъ способахъ всякаго рода заготовленій и перевозовъ провіантскихъ припасовъ; систематическое собраніе вѣдомостей: о ежегодномъ урожаѣ хлѣба въ губерніяхъ, о годовой потребности онаго по числу жителей, о расходѣ хлѣба на винокурение и тому подобныя надобности, о расходахъ онаго за общимъ продовольствіемъ народа, и о цѣнахъ на хлѣбъ, въ губерніяхъ постановленныхъ. Гл. 6. Составъ и предметы Департаментна Коммиссаріатскаго. § 88. Предметы втораго Стола сего Оудѣленія суть: заготовленіе для госпита-

лей посуды и разныхъ потребностей“ и ш. д.

Сими и подобными мѣрами удаляются причины недоспапка въ свѣспныхъ припасахъ, а Медико-Полицейскими распоряженіями сохраняется надлежащее качество пищательныхъ веществъ, такъ что Врачебная Полиція въ семъ случаѣ главнымъ своимъ предметомъ имѣетъ смотрѣніе за свѣжестію и здоровостію жизненныхъ припасовъ, и пошому недоспапачное количество оныхъ разсмаприваетъ только, какъ одну изъ причинъ вреднаго качества пищательныхъ веществъ и какъ поводъ къ опасѣйшимъ болѣзнямъ.

И такъ, кромѣ недоспапка въ жизненныхъ припасахъ, причиною вреднаго качества оныхъ можетъ быть: 1) алчность и корыстолюбіе продавцовъ, 2) еспественные недоспапки и вредныя свойства самыхъ сихъ веществъ, 3) неосмопрительность и неопряпность жищелей при заготовленіи и употребленіи пищательныхъ веществъ, 4) вредное свойство орудій и посуды, употребляемыхъ для заготовленія и храненія пищи, питья и проч. По сей причинѣ Законодатели всѣхъ временъ обращали особенное вниманіе на ка-

чество жизненныхъ припасовъ. Сколь превосходны въ семъ отношеніи и поучительны законы, данныя Моисеемъ Іудейскому народу, сіе всѣмъ извѣстно. По свидѣтельству Юстина, Ксерксъ запретилъ Карфагенянамъ, между многими другими вещами, употребленіе въ пищу собачьяго мяса. У древнихъ Римлянъ было постановление *) (*Aedilitium Edictum*), которымъ запрещалось употребленіе нѣкоторыхъ яствъ и напитковъ. Для сего опредѣлены были четыре Сопришеля (*Aediles*). Даже и прежде Римлянъ находимы мы постановленія, касательно здоровости жизненныхъ припасовъ, у самого древняго народа, положившаго основаніе наукамъ и художествамъ, и. е. у Египтянъ, которые имѣли діететическія предписанія, частію для духовныхъ особъ, частію для нѣкоторыхъ округовъ, частію же для всего вообще народа; послѣднимъ предписаніямъ никто не смѣлъ противиться. **). Гусь, сія любимая пища

*) Mich. Alberti Diss. comentationem medicam, in *Aedilitium Edictum sistens* § 1. In Eiusdem tomo quinto *Medicæ Jurisprudentiæ*. Lipsiæ et Goerlitzi. 1740. 4.

**) *Rècherches philosophiques sur les Egyptiens et Chinois* T. I. p. 107.

у древнихъ Египтянь, запрещаемъ была всякой разъ при появленіи повальныхъ болѣзней въ какомъ либо округѣ; вся пища ихъ состояла въ шакомъ случаѣ почти изъ однихъ только голубей. Въ послѣдующія времена, равно какъ и нынѣ, во всѣхъ благоустроенныхъ государствахъ существуютъ мудрые законы, клонящіеся къ безвредному употребленію жизненныхъ припасовъ. Касательно Россійскихъ узаконеній, сюда принадлежатъ слѣдующія: Уставъ Управы Благочинія *), въ кошоромъ говорится: „буде кто учнетъ про-
„давать испорченные припасы пропитанія,
„шого имать подѣ спражу и опослать къ
„суду, гдѣ поступать съ нимъ по мѣрѣ ви-
„ны его, какъ въ законѣ написано.“ Въ Провіантскихъ Регулахъ **) сказано: „О взятомъ
опѣ непріятеля провіантѣ. „И шопѣ прові-

*) Уставъ Управы Благочинія. Пункты 232, 273 и 274. О преступникахъ разноса заразительной болѣзни, или продажи испорченныхъ припасовъ. (П. Хавскаго Собраніе законовъ, кн. 12. стр. 92 и 105).

**) Провіантскіе Регулы. (1758 года), претѣмъ писменіемъ. С. Петербургъ, 1821. 8. стр. 160-162. §§ 35, 36.

„антъ пристойнымъ образомъ апробовать,
 „нѣтъ ли въ немъ умышленнаго поврежде-
 „нія, дабы опть раздачи онаго на армію ни-
 „какого вреда не послѣдовало.“ О пробѣ взя-
 „таго опть непріятеля провіанта. „Когда
 „оному проба чинена будетъ, шо крайне
 „спарашься въ шомъ оспорожно поступашь
 „и къ лучшему увѣренію и безопасности всѣ
 „удобовозможные способы сыскивал, въ дѣй-
 „ство упошреблять, дабы чрезъ скорое въ
 „пробѣ увѣреніе ошибки не учинить; и для
 „шого оное чинено бытъ должно чрезъ упо-
 „ребленіе скопу и прочими примѣры, къ
 „чему Провіантскіе Чины, не полагаясь соб-
 „спвенно на себя, должны присовокуплять
 „знающихъ людей,“ и ш. д.—Въ Регламентѣ
 Адмиралтейства *) сказано: „Когда прійдетъ
 „время провіантъ принимашь на служителей
 „флота и Адмиралтейства у Генераль-Про-
 „віантмейстера, тогда велѣтъ Адмиралтей-
 „скому Оберъ-Провіантмейстеру принести
 „въ Коллегію каждой маперіи пробу и оныя
 „при Конпролерѣ и при промышленникахъ
 „шѣхъ дѣлѣ, а именно, какъ солодъ и хмѣль

*) Регламентъ Адмиралтейства. 1724 года. гл.

1. § 19. глава 4. §§ 2. 4. 5.

„при пивоварахъ, мясо при мясосолахъ, такъ
 „и прочія вещи при такихъ людяхъ, копо-
 „рые въ чемъ силу знаютъ, свидѣтельствво-
 „вашь, и копорыя являся добраго качества,
 „пѣ надлежитъ запечатать Адмиралтейскою
 „печатью и подписать руками всея Коллегіи,
 „и такія велѣтъ приниматъ, а копорыя не
 „апробуются въ Коллегіи, такихъ не велѣтъ
 „приниматъ, но опсылатъ съ Оберъ-Прові-
 „антмейстеромъ къ Генераль-Провіантмей-
 „стеру, дабы оныя перемѣнилъ, а худаго ни-
 „чего опіюдь не велѣтъ приниматъ.“ Поло-
 женіе для временныхъ военныхъ госпиталей
 § 97 *). Обязанность дежурнаго Лѣкаря при
 раздачѣ пищи. „При раздачѣ пищи находит-
 „ся сверхъ караульнаго Унтеръ-Офицера де-
 „журный Лѣкарь, который непременно дол-
 „женъ опвѣдывать какъ изгоповленную,
 „такъ и гошовую уже пищу, и если за-
 „мѣтитъ въ оной какой либо недоспапокъ,
 „доноситъ немедленно Военному Коммисару.“
 Успавъ о непремѣнныхъ военныхъ госпита-
 ляхъ, Высочайше утвержденный 2 Мар-

*) Указъ 1812 Генваря 27. Положеніе для вре-
 менныхъ военныхъ госпиталей при большой
 дѣйствующей арміи. Гл. 1. Опд. 1.

та 1828 года. Глава X. О должности дежурнаго Врача при госпитали. § 158. „Бу-
 „де при свидѣтельствѣхъ съѣстныхъ припасовъ
 „или приготовленной пищи найдеть какую
 „либо неисправность или злоупотребленіе,
 „то объявляеть о томъ немедленно Спар-
 „шему Врачу и Смотрителю госпитали.“

Предотвращеніе вреднаго качества жиз-
 ненныхъ припасовъ достигается, также какъ
 и удаленіе недоспадка въ оныхъ, чрезъ пре-
 кращеніе всѣхъ поводовъ къ сему или при-
 чинъ, выше (спр. 167) изложенныхъ. Проис-
 шедшее же при всемъ томъ поврежденіе здо-
 роваго качества жизненныхъ припасовъ из-
 слѣдывается и открывається помощію Вра-
 чебно-Полицейскихъ мѣръ. Слѣдственно все-
 возможное прекращеніе и удаленіе пагубныхъ
 слѣдствій отъ употребленія испорченныхъ
 жизненныхъ припасовъ есть весьма важный
 Врачебно-Полицейскій предметъ, который въ
 нижеслѣдующихъ отдѣленіяхъ будетъ вкрат-
 цѣ изложенъ.

Поелику же, какъ выше сказано (спр. 164),
 плотныя и жидкія пищепельныя вещества,
 т. е. пища и питье, суть весьма многооб-
 разны; поелику также, не смотря на упо-

прѣбленіе въ пищу нѣкоторыми народами однихъ только распительныхъ, а другими народами однихъ только живописныхъ питательныхъ веществъ, опытъ показываетъ способность человѣка питаться пѣми и другими, чрезъ простое только взаимное смѣшеніе оныхъ, или же чрезъ весьма искусственное со-спавленіе разнообразныхъ яспвъ и напипковъ, проспирающеея, въ наши особливо времена, до невѣроятной и не всегда безвредной сложности и утонченности: по таковое измѣненіе въ образѣ употребленія сихъ веществъ затрудняетъ насъ не только въ сужденіи о качествахъ жизненныхъ припасовъ, но даже и въ самомъ наименованіи оныхъ. Тоже самое должно сказать и о различныхъ родахъ посуды, служащей для жизненныхъ припасовъ. Впрочемъ во всякой странѣ сущность Медико-Полицейскаго попеченія о жизненныхъ припасахъ, касаясь употребляемыхъ въ таковой странѣ яспвъ и напипковъ, равно какъ и посуды для оныхъ, состоитъ, какъ изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, преимущественно въ слѣдующихъ мѣрахъ.

Первое. Въ означеніи различныхъ видовъ порчи и подмѣси жизненныхъ припасовъ, и

пришомъ какъ естественной, такъ и искусственной.

Второе. Въ показаніи причинъ или поводовъ къ таковой порчѣ и подмѣси.

Третье. Въ предложеніи средствъ къ предотвращенію порчи и подмѣси жизненныхъ припасовъ.

Четвертое. Въ предложеніи способовъ для узнанія естественной порчи и открытія искусственной подмѣси жизненныхъ припасовъ.

И такъ въ семь четвероюкомъ отношеніи разсмотримъ мы вообще и въ особенности употребительнѣйшіе въ нашихъ справахъ жизненные припасы, какъ то:

I. Пищу,

- а) Живошную,
- б) Распительную,
- с) Съѣстные приправы.

II. Питіе или напитки,

- а) Водянистые,
- б) Спиртные.

III. Посуду.

П И Щ А.

А. Животная пища.

Употребительнѣйшую въ нашихъ спра-
вахъ животную пищу составляютъ:

- 1) Мясо многихъ домашнихъ и дикихъ жи-
вотныхъ, свѣжее, соленое, копченое, колба-
сы; также рыбы, раки, усприцы и проч.;
- 2) молоко и приготовленные изъ онаго яствы,
куда особливо относятся: а) масло, б) сыръ
и проч. 3) яицы, особливо куриныя.

I. М Я С О.

Виды порчи и подмѣсей мяса. Многораз-
личные виды порчи и подмѣсей мяса вообще
заключаются:

Во первыхъ. Въ порчѣ мяса животныхъ
предъ закланіемъ ихъ.

Во вторыхъ. Въ порчѣ мяса при самомъ
закланіи бойныхъ животныхъ и послѣ онаго.

Порча мяса предъ закланіемъ животныхъ
зависитъ, либо а) отъ болѣзней ихъ, либо
б) отъ неблагоприятнаго выбора совершен-
но здоровыхъ, впрочемъ бойныхъ животныхъ.

а) Многія болѣзни животныхъ, коихъ мясо употребляется въ пищу, сообщаютъ и сему послѣднему болѣзненное и слѣдственно не всегда безвредное качество. Нижеслѣдующія болѣзни дѣлаютъ мясо животныхъ совершенно неспособнымъ къ употребленію и очевидно вреднымъ для здоровья людей, а именно:

Чума рогатаго скота (*pestis bubula*), немѣющая въ началѣ своемъ, кромѣ прилипливости, никакихъ опличительныхъ признаковъ, но въ высшей своей степени являющаяся въ видѣ чумныхъ желваковъ на основаніи языка, въ горлѣ и около задняго прохода, при всеобщемъ разспроисвѣ въ опправленіяхъ всего тѣла. Мясо падшихъ отъ сего недуга животныхъ бываетъ блѣдно-красное; припомъ все тѣло лишено жира и весьма малокровно. Самая кровь свѣтло-красна. Первые два желудка находящіяся наполненными несвареннымъ кормомъ, а третій изсохшими затвердѣлыми лепешками, и попому сей послѣдній на ощупъ оказывается твердъ. При отдѣленіи изсохшаго корму отъ желудка отдѣляются вмѣстѣ и перепонки сей

внутренности, откуда и взято Нѣмецкое названіе Löserdürre. Четвертый желудокъ представляетъ характеристическій признакъ сей болѣзни: онъ вмѣстѣ съ 12-пиперстной кишкою почти всегда бываетъ воспаленъ, обаятъ омертвѣлыми пятнами.

Осетій мытъ (Diarrhoea ovium), сходствующій во всемъ съ чумою рогатого скота.

Омертвѣніе селезенки (Typhus carbunculозus, Sphacelus lienis), убивающее нерѣдко живописныхъ мгновенно, подобно поспрѣлу, на паствѣ или на улицѣ, а при медлительнѣйшемъ своемъ теченіи производящее обыкновенно широкіе желваки на головѣ, груди, брюхѣ и въ пахахъ. Появленіе сихъ желваковъ можетъ иногда быть поводомъ къ самоскорѣйшей продажѣ такого живописнаго. За исключеніемъ оспы, болѣзнь сія есть единственная, которая отъ рогатого скота переходитъ на людей въ видѣ черной коросты или омертвѣлаго огневика. Кромѣ домашняго скота, даже птицы, зайцы и олени подвержены сей ужасной болѣзни. Какъ скоро живописное издыхаетъ, то въ мѣстахъ тѣла его, покрытыхъ жирною кожею, какъ то: въ споронѣ прикрѣпленія ногъ къ пуловищу, около

желѣзъ, почекъ, вдоль дыхательнаго канала, находится много желтой, большею частію студенообразной воды. Посему при подозрѣніи сей болѣзни должно тщательно изслѣдовать переднія и заднія ноги. Въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ находится желтая вода, примѣчается выпупленіе черной спекшейся крови. Селезенка бываетъ мягка, раздута, губчатая, рыхла, почти всегда болѣе обыкновенной величины и налита черносинею пѣнящеюся кровью. Такого же цвѣта бываетъ мясо, которое припомъ издаетъ вонючій запахъ пошчасъ по снятіи шкуры съ живошнаго. Кровь въ большихъ сосудахъ спонка, жидка, на подобіе черной жидкости растворена *). Легкія омерпѣлы, вялы, спадшія, темноцвѣтны, мягки и при разрѣзываніи представляются въ видѣ куска спекшейся крови. Кишки весьма раздуты и худаго цвѣта. Трупъ очень скоро гніетъ.

Разлитнаго рода жабы и загриницы у рогатаго скота и свиней (angina, gangre-

*) Посему-то при закланіи cadaго живошнаго качество испекающей крови весьма важно и даже у древнихъ народовъ разсмаприваемо было съ особенною точностію.

поза, *maligna*, *glossanthrax* etc.), отличающіяся, кромѣ обыкновенныхъ признаковъ жабы, появленіемъ на языкѣ и нѣбѣ пузырей, копорые, лопающься, образуютъ въ высшей степени болѣзни весьма вонючія язвы и нерѣдко разспроиваютъ совершенно языкъ, поражаемый, особливо на основаніи своемъ, желваками, также почно, какъ въ чумѣ рогапаго скопа. Присемъ видна бываетъ, болшею частію, твердая опухоль на шеѣ, имѣющая красный, темнокрасный, свинцово-синій цвѣтъ и достигающая до самыхъ висковъ. По смерпи полосъ рта и зѣва обьяла бываетъ антоновымъ огнемъ. Мясо имѣетъ темнокрасный цвѣтъ, равно какъ и кровь, копорая однакожъ удерживаетъ еще способность ссѣдаться. Легкія сильно воспалены.

Крoвавоe мoтeиcпyсканіe oвeцъ (*Haematologia ovium*) есть почти всегда припадокъ дынги и рѣдко зависить отъ прогложенія острыхъ нравъ. Посему какъ при жизни, такъ и въ трупѣ живошнаго усмапривается вялость, блѣдность, кровоточивость мягкихъ частей и проч.

Воспаленіе подреберной плевы и легких (pleuritis, peripneumonia), поражающее наиболѣе рогаѣый скотъ, рѣже другихъ домашнихъ животныхъ и превращающееся нерѣдко въ заразу. Въ сей болѣзни, кромѣ всѣхъ воспалительныхъ явленій, животное имѣетъ сильную лихорадку, кашель и нимаѣо не ложится. Въ прусахъ, смотря по степени болѣзни, легкія находятся увеличенными; одна по крайней мѣрѣ часть оныхъ бываетъ болѣе или менѣе подпекшая кровью, опчасти еще воспалена, а частью приросшая къ подреберной плевѣ, гниѣла, наполнена язвами, иногда покрыта извѣскообразными узлами, желѣзиста и тверда, а при разрѣзѣ бѣѣла и красно-мраморна. Въ полости грудной находится желтоватая вода. Мясо, въ высшей степени болѣзни, блѣдное, вялое и водянистое.

Овечья оспа (variola ovilla), болѣзнь, по видимому, сходная съ человѣческой оспою, никогда однакожъ непереходящая на людей, такъ точно, какъ и человѣческая оспа никогда не переходитъ на овецъ. Болѣзнь сія, исключительно свойственная овцамъ, являющаяся въ видѣ оспины, которая выпускаетъ на голыхъ частяхъ шѣѣ и въ высшей степени

своей сопровождаются гнилою горячкою. Въ трупѣхъ первый желудокъ бываетъ покрытъ оспою, а претій, какъ и послѣ другихъ бо- лѣзней, наполненъ сухою лепешкою; сальникъ воспаленъ; печень и почки сухи, цвѣта тем- нозеленаго; мочевый пузырь пустъ; легкія вя- лы, покрыты пятнами, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и оспинами.

Водобоязнь (Hydrophobia), опличающаяся, какъ названіе показываетъ, отъ обращеніемъ отъ всего жидкаго; къ чему присоединяет- ся испеченіе пѣниспой слюны изъ рта; съ бѣшенствомъ и кусаніемъ себя и другихъ животныхъ, равно какъ и людей. Трупы жи- вотныхъ, павшихъ отъ сей ужасной заразы, представляють слѣдующія явленія: основа- ніе языка и вся полоса зѣва бываютъ опухшія, бурокрасныя, воспаленныя. Слюн- ныя желѣзы раздупы, равно какъ и кишеч- ный каналъ. Дыхательное горло наполнено пѣниспою слизью, а околосердечіе большимъ количествомъ водяной влаги. Существо моз- га мягче обыкновеннаго.

Овечій лишай (Herpes ovilis), овечья бо- лѣзнь, рѣдко поражающая другихъ домашнихъ животныхъ и состоящая въ появленіи на

поверхности кожи чешуй и прещинъ, отъ копорыхъ кожа дѣлается жесткою и образуетъ кору. Въ носу появляются водянистыя, нерѣдко весьма опврапшительныя, глубокія и широкія язвы. Болѣзнь сія не убійственна. По закланіи живоцнаго явленія сія довольно примѣпны.

Проказа, пузыристая болѣзнь свиней (aphthæ suillæ). Болѣзнь сія, копорую, какъ замѣчаетъ *Исфординкѣ* *), свойственнѣе можно бы назватъ гнилью рша, обнаруживается въ началѣ бѣлыми, круглыми пупырышками на языкѣ и деснахъ, переходящими при усилившейся болѣзни въ черныя пузыри. Присутствіе сихъ пузырей причиняетъ сыпучій, хрипчивый визгъ съ удушьемъ и гнилымъ запахомъ изъ рша. Сіе состояніе называютъ нѣкоторыя наружною пузырчатую болѣзнію, для отличія ея отъ внутренней пузырчатой немочи, составляющей совершенно особенную болѣзнь (Cachexia cellulosa).

*) Militärische Gesundheits - Polizey—V. J. N. Isfordink. I. B. 2-te Aufl. Wien. 1827. S. 327. (§ 160).

zæ hydatigenea) *). Хошя первая степень сей болѣзни не измѣняетъ свиного мяса, однакожь дѣлаетъ оное негоднымъ къ употребленію. Внутренняя пузырчатая немочь раждается опъ болѣзненного распворенія соковъ и дѣлаетъ свиное мясо вреднымъ. Сія болѣзнь продолжительностію своею отличается опъ жабы свиней, умерщвляющей весьма скоро сихъ живошныхъ. По закланіи живошнаго усматриваются малые кругловатые узелки и пузырьки въ клѣпчатой плевѣ мяса. Чрезъ вареніе мяса спановящся они явственнѣе.

Вычисленныя доселѣ болѣзни сообщаютъ мясу живошныхъ всегда и постоянно вредное свойство. Напротивъ того болѣзни, о которыхъ ниже сего упомянемъ, поршаютъ мясо живошныхъ при извѣстныхъ только обстоятельствахъ. Именно, болѣзни сіи, будучи открыты заблаговременно, прежде нежели перейдутъ въ другую болѣзнь или изнурятъ силы больного и испортятъ соки его, не оказываютъ вреднаго вліянія на мясо

*) E. Veith's Handbuch der Veterinärkunde. 2. B. Wien. 1818. 8. S. 453. §. 114.

животныхъ, споражающихъ оными. Къ болѣзнямъ сего рода принадлежатъ:

Болѣзненная похотливостъ рогатаго скота (*Cachexia boum tuberculosa*), кошорая, кромѣ великой наклонности къ сонпю, не сопровождается довольно долго никакими особенными явленіями и наконецъ переходить въ худосочіе. По закланіи животного усматриваются въ грудной полости, на поверхности легкихъ или на подреберной плевѣ малые, круглые, твердые, величиною съ горошину или бобъ, чаще же винограду подобные, совокупно висящіе желвачки. Они особенно находятся у хорошо упитанныхъ животныхъ и нимало не повреждаютъ ихъ мяса; но если присемъ и брюшныя внутренности поражены подобными зернами, если зерна сіи покрываются вязкою слизью и при разрѣзѣ распростираютъ вонь, въ такомъ случаѣ мясо дѣлается вреднымъ *).

Круженіе (*Hydrocephalus hydatideus*), болѣзнь, преимущественно свойственная ов-

*) Пузыри, величиною въ куриное яйцо, находямые въ брюшной полости свиней и почитаемые прежде за водянки, дѣлаютъ мясо безвреднымъ.

цамъ и состоящая въ нѣкоторомъ почти кругообразномъ движеніи животного въ ту или другую сторону при хожденіи. По закланіи животного усматриваются подъ мозговыми оболочками пузырьчатые черви; но мясо сихъ животныхъ дѣлается вреднымъ не прежде, какъ когда они примѣрно поху-дѣютъ. Тоже разумѣется о мясѣ овецъ, имѣющихъ ленточные глисты въ кишкахъ своихъ,—болѣзнь весьма обыкновенная между сими животными. Равнымъ образомъ круженіе опъ кладенія оводами яичекъ въ носу и лобныхъ пазухахъ овецъ и накожные волдыри, опъ укушенія сихъ насѣкомыхъ рождающіеся, не имѣютъ вреднаго вліянія на мясо, по тому что насѣкомыя сіи, по внутреннему побужденію, избираютъ здоровыхъ, молодыхъ животныхъ, дабы пѣмъ лучше упрочить свои яички; но какъ скоро изъ сего произраждается повсемѣстная болѣзнь, то и мясо дѣлается вреднымъ.

Болѣзни, опъ которыхъ мясо животныхъ, оными спраждающихъ, не измѣняется болѣзненнымъ образомъ, суть:

Болѣзнь въ копытахъ рогатаго скота (*Paronychia epizootica*), состоящая между

прочимъ въ воспалительномъ опуханіи копытъ, хроманіи животноныхъ, при явленіяхъ общаго спраданія. Если болѣзнь сія происходитъ отъ наружныхъ причинъ, отъ большаго жару, нечистоты или вонючей жидкости, въ коей споятъ животноныя, то она незначительна; если же она есть припадокъ или послѣдствіе опасной болѣзни, особливо рака на языкъ или болопной горячки, то мясо становится весьма опаснымъ.

Весенній поносъ (Diarrhoea vernalis) домашнихъ животноныхъ, *начало отвердѣнія внутренностей* (induratio viscerum incipiens), равно *присутствіе пузырчатыхъ червей* (Nudatides) въ грудной и брюшной полостяхъ, легко узнаются и даже неузнанные не имѣютъ худыхъ послѣдствій: ибо мясо не дѣлается вреднымъ.

Раздутіе брюха (Tympanitis ruminis), появляющееся обыкновенно у рогатаго скота весною или лѣтомъ, когда скотъ упрямъ и на пощакъ выгоняется на паству и питается здѣсь молодою, незрѣлою травою, прилипликомъ и другими подобными кормовыми травами; равно также когда скотъ вдругъ съ сухихъ луговъ переходитъ на

стучные и обжирается. Съ выходомъ въпровъ и послабленіемъ на низъ болѣзнь прекращается; въ пропивномъ случаѣ живошное издыхаетъ опъ нѣкопорого рода поспрѣла.

Члю касается до дичины и домашнихъ пшицъ, по шѣ изъ нихъ, коихъ мясо употребляешся въ пищу, равно какъ и всѣ прочія, подвержены хопя и немногимъ и мало еще извъспнымъ, однакожъ невсегда маловажнымъ болѣзнямъ. Такъ *олертивніе селезенки* (*typhus carbunculозus*) поражаетъ иногда, какъ уже упомянуто (спр. 177), не только домашнихъ, но и дикихъ живошныхъ. Такъ во время продолжительной, жестокой зимы, при глубокихъ снѣгахъ, оказывалась великая смерпельность между оленями, сайгами, зайцами, и по часпю по причинѣ жестокой спужи, часпю же опъ голода и жажды. Куры спраждупъ нерѣдко шакъ называемымъ *типуноиъ*, голуби нѣкопорого рода *оспою*, а молодые гуси въ Іюнѣ и Іюль мѣсяцахъ подвержены бывають *болѣзненноиу паданію*, съ хроманіемъ и бездѣйствіемъ крыльевъ. Рыбы подвержены также нѣкопорымъ болѣзнямъ. Такъ между прудо-

выми рыбами въ жаркіе лѣпніе дни и зимою, когда ледъ не допускаетъ прохода воздуха къ водѣ, возникають повальные болѣзни. Рыбы въ мупныхъ рѣкахъ и прудахъ иловатыхъ, неимѣющихъ печенія, получаютъ глисты въ своихъ внутренностяхъ и нѣкоторый родъ вшей между жабрами. Форели (*Salmo lacustris* L.) спраждутъ часто проказою и получаютъ во внутренностяхъ своихъ узлы, наполненные червями.

б) Неблаговременный выборъ совершенно здоровыхъ, впрочемъ бойныхъ живошныхъ касается содержанія живошныхъ, ихъ корма, возраста и другихъ подобныхъ обстоятельствъ. Дабы мясо составляло безвредную пищу, для сего недостаточна одна только, совершенная впрочемъ, здоровость бойныхъ живошныхъ.

Такимъ образомъ скотъ, привязанный постоянно къ яслямъ, зависящій отъ своего нравія челоѣка, даетъ по закланіи блѣдное, тусклое, жиромъ пресыщенное, вялое и губчатое мясо, которое хотя при вареніи скоро мякнетъ, но дѣлается при этомъ сладковатымъ, безвкуснымъ, неудобоваримымъ: ибо жиръ онаго, болѣе салу подобный, не можетъ

надлежащимъ образомъ соединиться ни съ похлебкою, ни съ соками нашего плѣла *).

Слишкомъ перекормленный скотъ уже по причинѣ излишняго своего жира не доставляетъ здороваго мяса, не упоминая о томъ, что чрезъ насильственное кормленіе животныхъ болѣе располагаются къ болѣзнямъ. Извѣстно далѣе, что жиръ и въ живомъ уже плѣлѣ начинаетъ иногда какъ бы разлагаться на свою составную часть—воду и способствовать образованію водяной болѣзни, коей жирные люди, что также извѣстно, прежде всѣхъ подвержены.

Въ низменныхъ мѣстахъ, на болописныхъ, наводненію подверженныхъ лугахъ содержаемый скотъ, а зимою кормленный мякиною, проспниковымъ сѣномъ, выбитыми при молоченіи хлѣба колосьями, маслеными лепешками и другими сего рода смѣсями, даетъ не только худое и пощее мясо, но также и жесткое, трудно варимое, имѣющее по свареніи его проливной, пошноту наводящій вкусъ. Кормленіе свиней водою, смѣшанною

*) Systematisches Handbuch der Staatsarzneykunde von Ios. Bernt. Erster Theil. Wien. 1816. S. 248. § 611.

съ остатками человѣческихъ яствъ, а также и съ жиромъ, закисающею уже прежде самаго употребленія ея, для свиней вредно. Въ Египтѣ, по причинѣ кормленія свиней весьма опиврапительными составами, мясо ихъ причиняетъ вредъ *); напропивъ шого въ Южной Америкѣ мясо свиное очень здорово: ибо тамъ, какъ замѣчаетъ *Шнурреръ* **), свиньи кормятся корнемъ змѣиной травы (*racé argi maculati* L.), остатками сахарного просовника (*Arundo zacharina* L.) и другими подобными веществами.

Весьма молодые или же новорожденные животныя оламѣютъ очень мягкое, водянистое мясо, которое осклизаетъ желудокъ, мало питаетъ и сладкостію своею наводитъ пошноту. Спудень такого мяса попка и водяниста, болѣе слизиста и неспособна къ образованію истиннаго животнаго клею. Напропивъ шого мясо старыхъ животныхъ весьма твердо, опягчаетъ желудокъ, даетъ густую, вязкую, кожеобразную спудень, ко-

*) *Geographische Nosologie von Friedrich Schnur-
rer. Stuttgart. 1813. 8. S. 395.*

**) *Прив. соч. стр. 186.*

порая прудно смѣшивается съ пищеварительными соками. Вообще органы возмужалыхъ и спарыхъ живоныхъ содержатъ въ себѣ болѣе жилаковоспи (fibrinum) и выпяжки, а въ молодыхъ живоныхъ находится болѣе студени. Посему мясо первыхъ вкуснѣе и шверже, а послѣднихъ слаще и нѣжнѣе.

Мясо живоныхъ, убитыхъ во время пѣчи, имѣетъ отвратительный запахъ и вкусъ, какъ по уже *Аристотель* замѣнилъ *), припомъ скоро гниетъ. Равно рыбы во время мепанія икры не доставляютъ безвредной пищи. Лососи (*Salmo salar*. L.) пѣчаютъ во время мепанія икры нѣкопору рыбы на своемъ пѣлѣ. По свидѣтельству *Бергера* **), въ лѣпнее жаркое время находятъ въ рѣкахъ икра морскихъ звѣздъ (*Asterias ophitra* L.), служащая раковинамъ пищею, отъ чего сіи послѣднія, бывъ употреблены въ пищу людьми, причиняютъ опуханіе шеи и сыпь съ сильнымъ зудомъ, а посему и вредны, также почно какъ и устрицы (*Ostrea edulis* L.),

*) *Historia animalium*. Cap. 29.

**) *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Brüssel*. T. 1. und *Auszüge aus Franz. period. medicin. Schriften*. B. 1. S. 199.

ловимыя, особливо въ Адриатическомъ морѣ; въ жаркое лѣтнее время, когда онѣ сидятъ на ящахъ. По наблюденіямъ *Эвергарда Гоше* *), яичники усприць отъ Маія до Іюня мѣсяца наполнены бывають яичками и пошому усприцы въ сіе время невкусны и небезвредны. Раки, говоритъ *Меницеръ* **), небезвредны въ продолженіи мѣсяцовъ, въ имени конхъ находится *буква р* (Генварь, Февраль и проч.); напротивъ того вредны усприцы въ продолженіи мѣсяцовъ, неимѣющихъ въ своемъ имени *буквы р* (Май, Іюнь и проч.).

Мясо живошныхъ предъ закланіемъ разъяренныхъ (чрезъ правлю собаками и ш. п.) столь же вредно, какъ и мясо живошныхъ, отъ природы ядовитыхъ, къ каковымъ относятся нѣкоторые роды рыбъ (*raja torpeda L., silurus electricus L. etc.*). Ловля рыбъ оглушающими веществами (*menispermum co-*

*) Philosophical Transactions. Year. 1827. P. 1. p. 39.

**) Neues Medicinisches Kochbuch für Kranke, Genesende und selbst Gesunde von J. Ph. Bodo Menzzer. Erster Theil. Bremen. 1817. 8. S. 228.

eculus, strychnos nux vomica, delphinium staphysagria) дѣлають ихъ вредными. Небезвредны также рыбы, пойманныя въ водахъ, омывающихъ мышьячныя, свинцовыя и мѣдныя руды, рыбы изъ водъ, въ копорыхъ намачиваеиця лень, пенька, или въ копорыя прохояптъ свинныя спойла, опходныя мѣста, либо куда выбрасываются опилки, смѣшанные съ иломъ, изъ пильныхъ мѣльницъ, бумажныхъ фабрикъ, красиленъ и проч. Рыбы, вынупыя изъ вонючихъ прудовъ, скоро умирають.

Наконецъ мясо живошныхъ, незакланыхъ, но лишившихся жизни случайно, какъ поупонувшихъ, задавившихся, замерзшихъ, равно мясо живошныхъ, кои ловятся западнями, пенешами и умерщвляются шамъ собаками, всегда вредно, какъ по причинѣ измѣненія въ качестввахъ самаго мяса, такъ и пошому, что вся кровь, оставаясь внутри тѣла, весьма скоро, по свойству своему, загнивается и заражаетъ мясо. Тоже должно сказать о живошныхъ, убитыхъ молніею. Во время грозы, когда молнія устремляется въ воду, многія рыбы умирають; ошъ чего и происходитъ, что между рыба-

ии, ловленными послѣ грозы, бываетъ очень много мертвыхъ. Молніею убитыя живошныя гниютъ весьма скоро и вообще скорѣе живошныхъ, умершихъ отъ другой случайной причины.

Вторая главная причина порчи мяса при самоубійствѣ закланіи животныхъ и послѣ онаго состояніи частію въ небрежномъ закладаніи живошныхъ, частію же въ неблаговременной продажѣ мяса.

Если при закладаніи живошнаго употребляются жестокіе способы и невѣрные приемы, то, не упоминая о томъ, что нехорошо связанное присемъ живошное можетъ сдѣлаться опаснымъ, яросль и бѣшенство закалаемаго такимъ образомъ живошнаго доставочны уже для поврежденія здоровости мяса.

Если изъ закалаемаго живошнаго не будетъ выпущено надлежащаго количества крови, то мясо не только получаетъ синекрасный цвѣтъ, дѣлается безвкуснымъ и трудноваримымъ, но и переходитъ весьма быстро въ гнилость. Присемъ замѣтивъ нужно, что въ желудкѣ птицъ нерѣдко находящаяся сѣмена ядовитыхъ растѣній, удаленіе коихъ споль же необходимо, какъ и выпущеніе крови.

Другая причина вредности мяса во время закалания животных состоитъ въ томъ, что иногда больные люди, спраждающіе онѣмъ и сведеніемъ членовъ, открытыми язвами и другими подобными недугами, стараются облегчить свои страданія чрезъ погруженіе больного члена въ открытыя, полости свѣже-заколотыхъ животныхъ и для сего обращаются къ бойникамъ съ предложеніемъ запланы. Таковое мясо, если попомъ продаваемо будетъ жителямъ, можетъ быть причиною весьма важныхъ болѣзней.

Сверхъ сего бойники, по снятіи кожи съ заколотого животного, надувають нерѣдко посредствомъ прубочки, либо рпомъ своимъ, клѣпчашую плевую мяса, дабы доставить ему лучшій видъ или большую полную. Таковой обманъ производился всего чаще надъ шелячимъ мясомъ и очевидно вредитъ здоровости онаго, не только попому, что надуватель можетъ имѣть зловоніе рта, гниль зубовъ, слюнотеченіе, но также и отъ того, что онъ можетъ страдать злокачественными венерическими язвами рта, одышкою, легочною чахоткою и ш. п.

✱

Кромѣ всего доселѣ сказаннаго, и по надле-
жащемъ закланіи живоупнаго мясо дѣлается
вредною пищею, если оное варится или жа-
рится поспѣвъ по самомъ закланіи живоуп-
наго. Мясо такое, едва, такъ сказать, по-
лумертвое и нелишившееся еще свойствен-
наго живоупнымъ пара, при вареніи и вся-
комъ другомъ приготовленіи изъ онаго пищи
дѣлается пвердымъ, вязкимъ, не доставля-
етъ варной похлѣбкѣ никакого вкуса, именно
потому, что теплога и паръ кипячей воды
неудобо проникаютъ въ промежутки воло-
конъ его. Сверхъ сего мясо такое пребуеетъ
болѣе продолжительнаго варенія, нежели мя-
со, надлежащимъ образомъ провѣпрившееся.
Чѣмъ грубѣе мясо, тѣмъ долѣе по закланіи
живоупнаго удерживаетъ въ себѣ живоупный
паръ, и на оборотъ. Посему бычачье и ба-
ранье мясо долѣе удерживаетъ сей паръ, не-
жели шелячье и ягнячье. Мясо некормлен-
ныхъ живоупныхъ также медленнѣе лишается
сего пара, нежели мясо кормленныхъ,
тѣмъ болѣе, что въ семь послѣднемъ слу-
чаѣ жиръ очень скоро поршился. Наконецъ
мясо спарыхъ живоупныхъ медленнѣе инер-
летъ живой паръ свой, нежели мясо живоуп-

ныхъ средняго возраста и молодыхъ. Кромѣ сего степень теплоты, холода, сухости и влажности атмосфернаго воздуха, вообще перемѣна погоды въ разныя времена года, равно также качество мѣсна, въ коемъ собирается мясо и самой видъ мяса, имѣющъ величайшее вліяніе на скорѣйшее или медленнѣйшее улептаніе живошнаго пара изъ мяса свѣже-закланныхъ животныхъ, равно какъ и на гніеніе мяса. Такъ замерзшее и потомъ распаявшееся мясо и рыба перяютъ много во вкусъ и скоро гніютъ. Такъ свиное мясо, по самому уже корму свиней, расположенное къ гнилости, весьма скоро поршится, и пѣтъ конечно скорѣе, чѣмъ жарче время года. Мозги всѣхъ вообще животныхъ не могутъ долго оставаться безъ порчи. Замѣчено также *), что всякое животное свѣжеубиное скорѣе гніетъ при свѣтѣ луны, нежели въ темнотѣ ночной.

Если же, какъ изъ вышесказаннаго явствуетъ, мясо, такъ сказать, полумертвое не составляетъ здоровой пищи: то съ другой стороны также само собою явствуетъ,

*) *Frorierp's Notizen etc. Februar. 1826. Band XIV.*

сколь гибельно пропитное состояніе, — мясо
 едва неполусогнившее. Оно, бывъ употребле-
 но въ пищу, влечетъ за собою опаснѣйшія
 болѣзни гнилаго свойства. Легкую спечень
 гнилости мяса стараются мясники скрывать
 чрезъ намазываніе поверхности онаго свѣже-
 выпущенною кровью и пѣмъ самымъ болѣе
 ускоряютъ гнилость, безъ копорой выпу-
 щенная кровь распадется, какъ извѣстно, не-
 долго. Если же посредствомъ сего обмана не
 удалось продать гнилаго мяса, то прибѣга-
 ютъ къ солению и копчению онаго. Сіе по-
 стыдное ремесло неоднократно уже распро-
 странялось въ приморскихъ особливо городахъ,
 гдѣ столь великая предположить надобность
 въ соленомъ и копченомъ мясѣ для морскихъ
 путешественниковъ и гдѣ, кромѣ худаго мяса, ис-
 порченная рыба просаливается и намачи-
 вается иногда въ вредныхъ жидкостяхъ, а не-
 рѣдко и поддѣлывается припомъ извѣстью,
 какъ это особливо бываетъ при моченіи пре-
 фки въ извѣстковой водѣ. Столь уважаемая
 нѣкошторыми охотниками зеленая усприца
 получаютъ свой цвѣтъ посредствомъ искус-
 ственнаго окрашиванія ихъ мѣдною ярью и
 проч. Плаваніе усприцы и прилипаніе къ ко-

раблямъ, обшитымъ мѣдью, также можетъ быть причиною сего вреднаго цвѣта оныхъ. Равнымъ образомъ если соленое мясо хранилось въ мѣдныхъ, свинцовыхъ, особливо худовылуженныхъ сосудахъ, или же въ худовымуравленной глиняной посудѣ (о чемъ сказано будетъ въ своемъ мѣспѣ): то очевидно вредность шакowej пищи чрезвычайно увеличивается.

Обыкновеніе дѣлать начинки и колбасы есть другой способъ, копорымъ пользуются иногда мѣсники и колбасники для скрыванія болѣзненнаго состоянія или начавшейся уже гнилости въ мясѣ. Такъ почечныя сумки иногда начиняются старымъ жиромъ и опрѣвращенными попрахами живошныхъ, особливо же, по наблюденію *П. Франка* *), свиною печенкою, которая часто бываетъ наполнена гнойными опухолями. Далѣе извѣстно, что кровяныя особливо колбасы, и свѣжія и копченныя, вообще не составляютъ особенно здоровой пищи: ибо въ лѣтнее время свѣжія колбасы скоро гниютъ, а копченныя имѣютъ часто прогорклый вкусъ. Но

*) Mediz. Polizey. 3. B. Dritte Aufl. Wien. 1787.

3. § 17. стр. 77.

если для пригото́вленія сихъ колбасъ, какъ свѣжихъ, такъ и копченыхъ, употреблена была вмѣсто свѣжей крови сѣрая; если къ тому примѣшаны испорченныя пряно́сти (аромата): то пища сего рода превращается въ дѣйствительный ядъ. Испорченныя колбасы, бывъ употреблены въ пищу, дѣйствуютъ преимущественно на сочувствительные нервы, производя особливо постепенное онемѣніе сердца, легкихъ и брюшныхъ органовъ, безъ примѣтнаго распрѣисыва общаго чувствительнаго. Дальнѣйшіе припадки и явленія присемя суть: затрудненіе въ глотаніи, расширеніе зѣницъ, или же, что чаще бываетъ, неровное расширеніе зѣницъ, двойное зрѣніе, параличъ вѣкъ, осиплость голоса, нѣмота, воспаленіе въ дыхательномъ горлѣ, съ припадками перепончатой жабы (сгоуер), необычайная сухость ладоней и подошвъ, вѣкъ и даже сухое испражненіе низомъ, затрудненіе въ мочеиспусканіи, одеревѣлость конечностей, сгущеніе крови и великая жесткость мышцъ послѣ смерти. Въ припадкахъ замѣчается особенная сухость, одеревѣлость членовъ и весьма долгое негненіе. Достопримѣчательно присемя сходство въ

дѣйствіи съ медленнымъ оправленіемъ чрезъ мышьякъ, съ змѣинымъ ядомъ и оправленіемъ чрезъ оспро-наркопическія расптвнїя, съ явленіями перепончатой жабы и съ припадками изнуришельнаго мочепеченїя (diabetes). Воспаленіе желудка и кишекъ не всегда замѣчено, и вообще ядъ сей въ дѣйствіи своемъ есть средній между расптвельными и минеральными ядами. Виртембергскій Врачъ *Юстинъ Кернеръ* *) собралъ разншельные примѣры оправленїя испорченными колбасами и другими живопными яспвами. По наблюденїямъ и опытамъ сего Врача, ядовитое дѣйствіе испорченныхъ колбасъ зависить отъ особенной кислоты, образующейся въ шпакowychъ колбасахъ при вліяніи шеплоты, элекпричеспва и другихъ причинъ, содѣйствующихъ вообще гніенію живопныхъ шѣлъ. Кислоту сію называетъ Г. Кернеръ *жирною кислотою* (acidum sebaci-

*) Das Fettgift oder die Fettsäure und ihre Wirkungen auf den thierischen Organismus, ein Beitrag zur Untersuchung des in verdorbenen Würsten giftig wirkenden Stoffes, von D. J. Kerner. Stuttgart und Tübingen. 1822. 8. S. 101—249.

sum); но какъ она образуется, вѣроятно, при гніеніи каждой живошной части, равно и крови, по можно приличнѣе, говорить о ней *), называть ее кислотою мертвыхъ тѣлъ живошныхъ или шруповъ (*acidum cadaverum*, *acidum azoonicum*?) Въ колбасахъ кислота сія соединена бываетъ съ амміакомъ, или, можетъ быть, съ особеннымъ алкалоидомъ, подобно тому, какъ сія или сродная ей кислота во многихъ ядовитыхъ растѣніяхъ, содержащихъ въ себѣ жиръ, также соединена бываетъ съ нѣкоторымъ особеннымъ алкалоидомъ (*principium amaro-flavum Welteri*?). Кислота сія наиболѣе образуется въ свиномъ жирѣ, пошому что жиръ сихъ живошныхъ, приводимыхъ часшо искусственнымъ кормленіемъ въ водяную болѣзнь, начинается и безъ того уже разлагаться **). Впрочемъ, кромѣ колбасъ, оправленія сего рода причинаемы были неоднократно сыромъ, раковинами и другою живошною пищею, изъ чего и явствуетъ, что жирная кислота образуется не только при разложеніи жира, но что разложеніе всѣхъ вообще живошныхъ ве-

*) Спр. 36.

**) Спр. 12.

щесствъ, не исключая и слюны, при содѣйствіи теплоты, электричества и другихъ извѣстныхъ вліяній, сопровождается, вѣроятно, развитіемъ сей кислоты. Посему къ условіямъ развитія сей кислоты въ колбасахъ принадлежишь, во первыхъ то, когда колбасы, свѣже-сдѣланныя и еще теплыя, кладутся одна на другую и въ семъ положеніи подвергаются дѣйствию горячихъ водяныхъ паровъ, особливо въ закрытыхъ сосудахъ. Чѣмъ толще, больше и мягче колбасы, чѣмъ болѣе мясная смѣсь, заключенная въ полсныя кинки, смѣшана бываетъ съ мясною похлебкою, тѣмъ скорѣе происходитъ сія ядовитая порча. Посему въ колбасахъ, крѣпко начиненныхъ, выжатыхъ и пакихъ, кои состояются изъ тонкихъ кишекъ, порча сія оказывается весьма рѣдко. Менѣе также замѣтна сія вредная переменъ въ пакихъ колбасахъ, которыя не варятся, подобно печеночнымъ и кровянымъ колбасамъ; болѣе напротивъ въ колбасахъ, начиненныхъ не сырымъ, но свареннымъ уже мясомъ. Брауншвейгскія и Италіанскія колбасы (salami) вовсе почти не подвержены сей порчѣ. Кроме теплоты, вліяніе электричества при раз-

вишія жирной кислоты въ животныхъ смѣсяхъ ясно обнаруживается дѣломъ, послѣ грозы: ибо тогда свѣжія колбасы начинаютъ порпиться, а полуиспорченныя дѣлаются совершенно испорченными *). Самое даже свѣжее и здоровое мясо, висѣщее въ мясныхъ рядахъ, дѣлается предъ наступленіемъ грозы, какъ увѣряють мясники, весьма мягкимъ и испочаелтъ изъ себя кровь по каплямъ **).

Если животныя жирныя часши, примѣрно говоря, сосисавы для кровяныхъ и почечныхъ колбасъ (кровь, жиръ, мозгъ, печень, жирная мясная похлебка, пряноспи, именно, черный перецъ и соль) заключающія въ жирныя полсныя кишки, по чрезъ взаимное дѣйствіе свое, особливо при вліяніи теплоты и при копченіи оныхъ въ дыму, не переходятъ онѣ въ дѣйспвипельную гнилость такъ скоро, какъ открытое, вліянію воздуха, а не дыма, подверженное мясо; но за то подвергаются нѣкопорому броженію, которое, развивая амміакъ, образуетъ вмѣстѣ животную кислоту, соединенную, болѣе или менѣе, съ удушливымъ веществомъ (azot), такъ что

*) Kerper. Прив. Соч. стр. 6,

**) Тамъ же,

въ дѣйствительную гнилость переходить только внѣшняя часть кишки, подверженная вліянію воздуха, но непокрываемая дымомъ. Образующаяся при копченіи колбасъ древесная кислота не допускаетъ настоящаго гніенія, при коемъ жирная кислота исчезаетъ *). Развитіе и совершенное образованіе жирной кислоты ограничено конечно извѣстнымъ временемъ, и при усилившейся гнилости жи-
вопныхъ веществъ или смѣсей, гдѣ уже образуется сѣроводородный газъ, кислота сія, по видимому, теряетъ всѣ свои свой-
ства, подобно тому, какъ сродная съ оною кислота мочевыхъ камней иногда пропа-
даетъ, какъ скоро сія послѣдняя перешла уже въ совершенную гнилость. И такъ сколь-
ни часто встрѣчается оправленіе испорчен-
ными колбасами, не лзя еще почесть оное
весьма частымъ, потому что время упо-
требленія сихъ колбасъ въ пищу, къ счастью,
не всегда соотвѣтствуетъ самому большому
развитію жирной кислоты въ оныхъ. Одна-
кожь какъ замерзаніе и таяніе, при коихъ
также развивается электричество, способ-
ствуютъ разрѣшенію живопныхъ составовъ

*) Kerner. стр. 5. Nota.

и образованію кислопы: що въ мѣсяцы замерзанія и шаянія, говоришь *Кернеръ* *), оправленіе сіе наичаще вспрѣчается, шѣмъ болѣе, что именно въ сіи мѣсяцы все прежде заколошое съѣдается. Примѣсь соли и пряноспей къ колбасамъ и вообще къ солонинѣ не удерживаетъ образованія сей кислопы: ибо соль при броженіи живоппныхъ веществъ разлагаешся, а пряноспи, хощя дубильнымъ своимъ началомъ удерживаютъ нѣсколько гнилость, но шѣмъ же самымъ благопріятшсшвуиють развицію жирной кислопы. Особливо сіе разумѣетъся о перцѣ. По наблюденіямъ *Кернера* *), жирная кислопа, соединенная съ перцомъ, ядовитѣе дѣйспвуешъ. Безъ сомнѣнія, много присемъ зависить и опъ особеннаго качесшва каждаго желудка, его кислопы и образовавшихся въ ономъ гасовъ: ибо здоровый желудокъ можетъ легко неупрализиловать кислый сей ядъ; напрошивъ шого слабый и больный желудокъ не можетъ даже воспрепятшсшвовать и шому, чшобы ядъ сей, поглощенный въ незрѣломъ еще, шакъ сказашъ, сосшояніи своемъ, не досшигъ здѣсь вы-

*) Сшр. 8 и 9.

*) Сшр. 10 и 11.

сочайшей зрѣлости. Первоначально замѣчено оправданіе испорченными колбасами въ Виршембергскомъ Королевствѣ, гдѣ пригошворяютъ нѣкопорый родъ весьма жирныхъ кровяныхъ колбасъ, которыя сперва варятся, а попомъ вѣщающіяся на короткое время въ дыму и пакъ употребляются въ пищу.

Предотвращеніе порчи и подмѣсей мяса.
Цѣль сія доспигается вообще удаленіемъ причинъ, выше изложенныхъ.

И пакъ касательно порчи перваго рода:

а) Вредъ, причиняемый людямъ чрезъ употребленіе въ пищу мяса больныхъ живошныхъ, отвращается прежде всего спогимъ осмопромъ живошныхъ, назначенныхъ на убой. Осмотръ сей должны производить люди, имѣющіе основательное свѣденіе въ Веперинарной Наукѣ; слѣдовательно опытные Веперинарные и Полицейскіе Врачи наилучше могутъ удовлетворить шаковому требованію. Посему между Смотришелями пригоннаго скопа Врачъ есть главное лице; посему во всѣхъ благоустроенныхъ государспвахъ назначенныя на убой живошныя закалающіяся не-

наче и не прежде того, какъ опредѣленный Медицинскій Чиновникъ осмопритъ каждую порознь скопину и засвидѣльствуетъ ея здоровость. Въ Положеніи о прогонѣ скопа въ сполицы между прочимъ сказано *): „Смопрителъ въ губерніи ближайшей повѣряетъ гурты по свидѣльству, къ нему представленному, вмѣстѣ съ Уѣзднымъ Лѣкаремъ, и если находишь нѣсколько скопинъ захилѣвшихъ, но незачумленныхъ, приказываетъ оспавлять ихъ въ удобномъ мѣстѣ для поправленія, беретъ съ промышленника или повѣреннаго его подписку и пропускаетъ оспальное спадо безъ задержанія, выдавая свидѣльство по формѣ“ и т. д. Далѣе сказано: „во всѣхъ слѣдующихъ губерніяхъ наблюдаются тѣже самыя правила и порядокъ до самаго мѣста, куда скопъ назначенъ и гдѣ осмопръ Полиціи дѣлается по правиламъ установленнымъ и съ шочнымъ наблюденіемъ, чѣмъ нездороваго скопа въ продажу на убой никакъ допускаемо не было. Касательно обя-

*) Указъ 1804 Іюня 14. Съ показаніемъ о прогонѣ скопа въ сполицы и чѣмъ наблюдать присемъ должны Медицинскіе Чиновники.

„занности Смоприпеля прогоннаго скоша, „возлагается она на Земскую и Градскую „Полицію, съ шѣмъ, чшобы правила, предпи- „санныя въ должностъ Смоприпелямъ, оспа- „вались во всей ихъ силѣ и были соблюдае- „мы Полиціями въ точности.“ Бой скопинъ рогатыхъ зараженныхъ или подозрительныхъ долженъ быть запрещенъ *). Телята и дру- гія молодыя живошныя, рожденныя и корм- ленныя самками нездоровыми, либо и пад- шими отъ болѣзни, не прежде должны быть закалаемы, какъ когда по испеченіи 8 дней, при кормленіи сихъ живошныхъ здоровымъ кормомъ, Смоприпель найдетъ и признаетъ ихъ совершенно здоровыми.

Дичина шребуетъ шакже надзора, какъ и домашній скопъ. Лѣсничіе и ловчіе, гово- риптъ П. Фрѣнкѣ *), должны смопрѣптъ за здоровостію заспрѣленной дичи, и если замѣчена будетъ въ какой либо дичинѣ зна- чительная болѣзненная перемѣна, не прода-

*) Указы 1746 Марта 17, Іюля 21, и 1747 Августа 13. Исторія Медицины въ Россіи, сочин. В. Рихтеромъ. Ч. 3. Москва. 1820. 8. стр. 316 — 317.

***) Прив. соч. § 21, стр. 100.

вапъ оную, а зарывапъ въ землю. Освѣдомляпся должно, не свирѣспвуютъ ли между дичиною повальныя болѣзни, и если что подпверждено будетъ, ограничитъ либо и вовсе запрѣтитъ продажу оной. Касательно ппичъ, нуженъ спрогій присмотръ за продажею мерпвыхъ уже домашнихъ ппичъ, какъ ощипанныхъ, такъ и неощипанныхъ, дабы жипели не покупали больныхъ ппичъ вмѣсто здоровыхъ, палыхъ вмѣсто заколопыхъ. Вообще всякая живность, привозимая въ городъ для продажи, должна поступатъ прямо на рынокъ, дабы мясные Смотриптели могли удобнѣе оную свидѣтельспвовать. Еще бы лучше было, если бы живыя только ппичы домашнія продаваемы были, и припомъ всегда на рынкахъ.

Тоже самое должно наблюдать при продажѣ рыбы. Продавцы рыбы должны имѣть надлежащія свидѣтельства въ томъ, что рыбы такія пойманы живыми, въ чистыхъ водахъ и что никакія болѣзни между ними не свирѣспвуютъ. Въ приморскихъ городахъ надлежитъ имѣть особенный надзоръ за продажею сего рода въ лѣпнее время и запрѣтитъ продажу рыбы, ловимой въ мупной,

споячей, гнилой водѣ и въ такихъ прудахъ, которые отъ великой засухи совершенно почти изсякли. Продажа однихъ только живыхъ раковъ должна быть позволяема.

б) Дабы мясо совершенно здоровыхъ животныхъ не дѣлалось вреднымъ чрезъ содержаніе животныхъ, чрезъ ихъ кормъ и другія подобныя, вышеизложенныя (смр. 188-189) причины, то нужно назначать на убой животныхъ, пребывающихъ болѣею частію на свободномъ воздухѣ, избирающихъ себѣ погъ или другой родъ корму, непощихъ чрезмѣрно и также перекормленныхъ. Особенно бой свиней въ дѣшнее время надлежитъ весьма ограничить, либо и совершенно запретить, какъ то предлагаетъ П. Франкъ *). Иудейскій народъ имѣлъ 28 узаконеній касательно заповѣдныхъ яствъ; изъ сего числа 9 узаконеній относились къ мясной пищѣ; особенно же запрещалось сему народу употребленіе свиного мяса. Египтянамъ не позволено было употреблять въ пищу около 30-ти родовъ животныхъ и вмѣстѣ съ симъ повелѣно воздерживаться отъ свиного мяса.

*) Mediz. Poliz. Dritter Band.. 3-te Aufl. Wien. 1787. § 16. смр. 70.

Кормленіе живошныхъ , назначенныхъ на убой, испорченными или по себѣ вредными припасами, кормленіе свиней мясомъ палой скопины никогда не должно позволять, равно не держать свиней и другихъ живошныхъ при бойнѣ. Въ Высочайшемъ Указѣ, по сему поводу изданномъ, изображено *): „По случаю опкрывшагося Владимірской губернии Муромскаго уѣзда въ сельцѣ Черновскомъ скопскаго падежа опъ шого, что кормили свиней и прочій скопъ мясомъ палой скопины, повелѣваемъ о вредномъ употребленіи, для опвращенія другихъ опъ подобныхъ дѣланій, публиковать и подтвердитъ“
и п. д.

Смоприптели прогоннаго скопа должны наблюдать, дабы не были закалаемы живошныя слишкомъ молодыя и шакже спарыя. Посему шеленокъ моложе 4-5-ши недѣль и вѣсомъ меньше 40-50-ши фуншовъ, ягненокъ моложе 6-ши

*) Указъ 1801 Декабря 3. Опубликованъ поступокъ по случаю опкрывшагося падежа скопа опъ шого, что кормили свиней мясомъ палой скопины. Указъ 1808 Марша 21. О преступленіяхъ кормленія свиней мясомъ палой скопины (Хавскаго—кн. 16).

недѣль, козленокъ моложе 4-хъ недѣль, поросенокъ моложе 3-хъ недѣль, не должны назначаться на убой *).

Не должно также закалать живошныхъ во время ихъ пещи. Тоже разумѣется о рыбахъ, когда онѣ мечутъ икру. Посему ловля усприць съ Маія до Септября мѣсяца должна быть запрещена.

Спирого надлежитъ запрешишь правлю собаками бойнаго скопа и бїеніе онаго. Закаланіе шакого скопа тогда только позволено, когда, по совершенномъ успокоеніи скопины, будетъ она найдена совершенно здоровою. Въ нѣкоторыхъ спранахъ запрещается закаланіе живошныхъ, укушенныхъ и здоровою собакою. Іудеи и Египтяне, древніе, были въ семъ случаѣ весьма разборчивы. Магомешанамъ запрещается употреблять въ пищу мясо живошныхъ, пожирающихъ человѣческое мясо, задавленныхъ другими живошными, дичину, копорую ѣла собака, ппиць, шупыми орудіями убитыхъ, живошныхъ, укушенныхъ до крови и ш. д.

*) Продажныхъ щелять и другихъ молодыхъ живошныхъ надлежитъ привошишь, а не гнать.

Надлежитъ смотрѣть, чтобы не были продаваемы ядовитыя по естеству своему рыбы, равно какъ отравленные оглушающими веществами и пойманныя въ водѣ, подмывающей мепаллическія руды. Запретить должно моченіе въ водѣ, въ которой водится рыба, льну и пеньки, также проведеніе въ оную нечистоты изъ нужныхъ мѣспъ, свиныхъ клѣвовъ, фабрикъ и не позволять продажи рыбы, пойманной въ такой водѣ. Касательно рыбъ у древнихъ Римлянъ находится слѣдующее узаконеніе Нумы Помпилія: *Pisceis. quei. squamosi non sient. nei poluceto. squamosos. omneis. preter scuro. poluceto* *). Египтянамъ запрещалась бóльшая часть рыбъ, а духовнымъ всѣ вообще рыбы. Иудеи не употребляли безчешуйныхъ рыбъ. Магомешанамъ дозволяется употреблять въ пищу живыхъ только рыбъ, пойманныхъ съпью или рукою.

Порта мяса второго рода, или небрежное закаланіе живошныхъ и неблаговременное употребленіе мяса ихъ въ пищу, пребудетъ прежде всего, чтобы самое закаланіе произ-

*) Frank Mediz. Poliz. B. 3. 3. Aufl. S. 156.
(§ 1).—Fulvius Ursinus in Notis ad Festum.

водимо было вѣрно и скоро, безъ причиненія живописному жеспокихъ болей и безъ привеченія его въ яроспъ. Выпущеніе надлежащаго количества крови изъ закалаемаго живописнаго еспъ весьма важное обспоятельство, пребующее особеннаго, долговременнымъ опыномъ приобрѣпаемаго навыка и даже искуспва, копорое, по наблюденіямъ моимъ, учиненнымъ во время путешествія моего въ чужихъ краяхъ, преимущественно въ Англійскихъ бойняхъ доведено до высочайшей степени совершенспва. Закаланіе живописныхъ чрезъ раздѣленіе хребетнаго мозга повыше нервовъ грудобрюшной преграды упопреляется въ Варварійскихъ областяхъ, Испаніи, Португаліи, на Ямаикѣ и въ нѣкопорыхъ мѣстахъ Англіи. Молодыхъ быковъ совѣпуютъ убивать, вонзая имъ оспрое орудіе въ хребетный мозгъ, и какъ присемъ живописное въ мигъ падаетъ на землю, то нужно поспчасъ опкрыть ему сердечныя артеріи. Однакожъ изъ паковыхъ неудобно вытекаеть кровь, пошому что дѣйспвіе сердца прекращается прежде, нежели перерѣжуются шейные сосу-ды. Посему лучшій способъ закаланія состоитъ въ перерѣзываніи горла и выпущеніи кро-

ви до смерти, какъ по дѣлають съ шелянами, свиньями, баранами и ягнятами *), Изъ сказаннаго явствуетъ, что и при закалани животныхъ должны присутствовать свѣдущіе Смотрители, наблюдающіе за надлежащимъ способомъ самого закалани и также между прочимъ за тѣмъ, чтобы находимыя иногда въ желудкѣ закалаемыхъ пищи ядовитыя сѣмена тщательнo были выбрасываемы. По сей же причинѣ закалани животныхъ въ собственныхъ домахъ жителей надлежитъ ограничить, или же, по возможности и запретить. Кромѣ сего нужно, чтобы кровь изъ закалаемаго животного не вытекала на полъ, а была собираема въ различные сосуды, также чтобы въ бойняхъ соблюдаема была во всѣхъ отношеніяхъ опрятность и чистота. Для удобнѣйшаго достиженія сей цѣли и для отвращенія вреда отъ бойней здоровью жителей нужно оныя помѣщать въ совершенномъ удаленіи отъ жи-

*) О питательныхъ веществахъ и ихъ сбереженіи (Изъ Dictionnaire portatif de Chimie etc, Paris. 1824) Перевелъ С. Усовъ.—Сынъ опечиства. 1828. N. 21 и 22-й. Сентябрь и Октябрь. стр. 104—106.

дыхъ мѣспѣ, за городомъ или деревнею, — всего лучше на берегу рѣки, выпекающей изъ города или деревни, дабы такимъ образомъ опиврапитъ порчу воды, употребляемой жипелями. Въ Россіи изданъ по сему предмету Высочайшій Указъ *). Послѣ cadaго закланія живошныхъ въ бойнѣ надлежитъ вымытъ кровь, очистишь полъ, споль, спѣсны и самыя орудія, служившія для закаланія, удалишь также въ опредѣленное мѣспю непопробимыя оспашки: шкуру, рога, копыта, кишки и проч. При бойняхъ должны бытъ ледники для сбереженія мяса въ жаркіе лѣшніе дни; впрочемъ въ семъ опношеніи весьма важно шо, чшобы всякой день не закалать живошныхъ болѣе, нежели сколько нужно на одни супки. Въ бойняхъ мясо непременно должно висѣтъ, дабы оно со всѣхъ споронъ проникнуто было воздухомъ; сверхъ сего лѣпомъ должно покрывать мясо сіе чистымъ холспомъ для удаленія нечистоты, причиняемой мухами и проч. Для сего долженъ бытъ всегда въ гошовности чистый и сухой холспъ. Всякая бойня дол-

*) Указъ 1740 Августа 2. Объ опводѣ для выспройки скопобойни пристойнаго мѣспа. В. Рихтера Исп. Мед. въ Россіи. ч. 3. стр. 234,

жна бытъ защищена отъ снѣгу и дождя, но имѣть припомъ опверспія, нужныя для непрерывнаго прохожденія воздуха, снабженныя рѣшетками, недопускающими въ бойню кошекъ, птицъ и проч.

Въ бойняхъ не должна совершаться продажа мяса, а напропивъ того всякое свѣже-заколотое живошное должно прежде поступленія въ продажу оспаваться нѣкоторое время въ особенномъ и для доспуа атмосфернаго воздуха опкрытомъ мѣспѣ, при соблюденіи всевозможной чистоты, дабы провѣпрившееся такимъ образомъ мясо сдѣлалось способнымъ къ безвредному пригопвлению изъ онаго мясной пищи *),

*) Дабы мясо при вареніи сдѣлалось мягкимъ, сочнымъ и пипательнымъ, по нужно наливать оное кипячею водою; если же желательнo имѣть крѣпкую похлебку мясную, то должно наливать мясо холодною водою и поспепенно варить. Причина сему естъ та, что въ первомъ случаѣ бѣлковатое вещество опвердѣваетъ на поверхности мяса и преляпспвуетъ переходу пипательныхъ частицъ изъ мяса въ воду; въ послѣднемъ же случаѣ бѣлковатое вещество и спудень распворяются въ водѣ и дѣлаютъ ее пипа-

Всего лучше, если живошное закалается, особливо въ лѣпнее время, вечеромъ, дабы мясо въ продолженіи ночи остыло и въ слѣдующее упрод продавалось. Вмѣстѣ съ симъ смолрѣть нужно, чшобы мясники не надували мяса и не погружали больныхъ членовъ въ свѣже-опкрышыя полосши заколошаго живошнаго (см. спр. 195).

Продажа мяса должна происходить въ однихъ только мясныхъ рядахъ, состоящихъ подъ спрогимъ надзоромъ. Мясные ряды должны быть устроены на опкрышыхъ площадяхъ городскихъ и защищены отъ солнечнаго жара. Мясо въ рядахъ мясныхъ должно висѣть свободно на крючкахъ, а не лежать долго на скамьяхъ, дабы мясной сокъ, всасывающийся

пельною похлебкою. Поелику же доброта мясной похлебки зависитъ отъ надлежащаго количества мяса, варимаго съ соразмѣрнымъ количествомъ воды: по мясная похлебка (говорить *Исфордникъ* (прив. соч. ч. I. спр. 427-8. § 222), варимая для значительнаго числа солдатъ въ одномъ большомъ котлѣ, всегда выйдетъ щипательнѣе шой, которая готовится изъ 2 - 3 фунтовъ мяса и наливается количествомъ воды, нужнымъ для насыщенья 8 - 10 солдатъ.

въ дерево, не причинилъ отвратительнаго запаха. Лавки или доски, для разсѣченія мяса служащія, должно часто обмывать и т. д. Лѣпомъ, всякой разъ послѣ грозы, должно осмопрѣть мясные ряды *).

Дабы оставшееся отъ продажи лежалое, испорченное мясо не было намазываемо кровью и продаваемо подъ видомъ свѣжаго мяса, дабы также отвратить соленье и копчение гнилаго мяса, по долгъ Сморщителей есть удалять такіе повары изъ мясныхъ рядовъ. Строго также нужно наблюдать, чѣмъ мясо больныхъ животныхъ, которое и въ свѣжемъ своемъ состояніи не оказалось здоровымъ, не было подвергаемо соленью и копчению и чѣмъ вообще соленье мяса и хранение онаго производилось въ приличной деревянной посудѣ. Посему, какъ скоро въ какомъ либо округѣ окажется падежъ между животными, то изъ такого мѣста вывозъ и продажу соленого и копченнаго мяса должно совершенно прекратить; на самомъ же мѣстѣ падежа имѣть неусыпный надзоръ за пѣмъ, чѣмъ палыя отъ болѣзни, замерзшія и вообще мертвыя животныя зарываемы

*) Frank. Прив. соч. 3. В. § 23. S. 124.

были довольно глубоко въ землю. Римляне испорченное и больное мясо бросали въ Тибръ. Въ Медицинскихъ наставленіяхъ, приложенныхъ къ Высочайшему Указу касательно больного скопа, сказано *): „Безбожные люди „иногда во время скопскаго падежа мясо опъ „зараженной скопины шайно дешевою цѣною „продаютъ, опъ чего весьма прудныя горячки „и другія опасныя болѣзни родиться могутъ. „Въ такихъ случаяхъ надлежитъ съ крайнею „оспорожностію смотрѣть, чпобы нигдѣ, „кромѣ публичныхъ бойницъ, скопины не били, „и шо при присущствіи нарочно опредѣлен- „ныхъ къ тому присяжныхъ людей.“ Далѣе говорится: „мясо само собою показывается „опасность, если оное употреблять въ „пищу, равно какъ и жиръ, и надлежитъ оное „для предоспорожности безъ всякаго замед- „ленія закапывать глубоко въ землю и проч.“

Въ приморскихъ городахъ должно смотрѣть, чпобы издохшія, полусогнившія, зимою въ водѣ замерзшія и попому пойманныя въ мерп-

*) Указъ 1764 Генваря 31. О правилахъ лѣченія больного скопа и о Полицейскихъ мѣрахъ при семъ случаѣ; причемъ приложены Медицинскія наставленія для лѣченія.

вомъ состояніи, равно послѣ грозы изловленные мерпвыя рыбы, не продавались, не сушились и не солились, чѣобы не употреблять вредныхъ жидкостей для соленія рыбъ и чѣобъ наконецъ испорченный поваръ сей не былъ подмѣшиваемъ извѣстью и другими подобными веществами. Сельди, осетры, щуки, форели и другія рыбы соленыя, привозимыя въ бочкахъ, должно всякой разъ надлежащимъ образомъ освидѣтельствовать прежде, нежели оныя поступить въ продажу. Поелику рыбы такія къ насупленію всякаго слѣдующаго года дѣлающія уже спарыми и лежащими, по предъ началомъ каждаго лѣта должно испорченный поваръ сей выбрасывать.

Привозныя колбасы безъ предварительнаго осмотра не должны поступать въ продажу. Кровяныя колбасы, копченыя и свѣжія, должны быть туго начинены и величину имѣть весьма умѣренную. Для начинки колбасъ не должно употреблять старой или несвѣжей крови, стараго жира, лежалаго мяса и также испорченныхъ приносей. Посему колбасники должны покупать цѣльные пряные коренья, а не полченые или приведенные въ порошокъ, который часто бываетъ

смѣшанъ съ вредными веществами (Menispermum sossulus. L. etc). Въ лѣтнее время должно весьма ограничивать продажу кровяныхъ колбасъ *), а зимою позволять продажу только пѣхъ, которыя не болѣе, какъ за четыре или пять дней приготовлены. Во времена Императора Льва спрого были запрещены колбасы сіи **). У древнихъ Іудеевъ съ величайшимъ тщаніемъ соблюдаемо было запрещеніе касательно употребленія крови въ пищу; у Магомеланъ и теперь еще имѣетъ оно всю свою силу.

Наконецъ изъ сказаннаго очевидно слѣдуетъ необходимость неожиданнаго, по временамъ, осмотра пракшировъ и даже самаго приготовленія яспвъ въ оныхъ.

Неспособность свѣжаго мяса оспаваться на долгое время безъ порчи и невозможность имѣть всегда и во всѣхъ случаяхъ свѣжее мясо родили значительное число искусственныхъ средствъ къ предотвращенію порчи мяса. Поелику же оба сіи обстоятельство наиболѣе и наичаще встрѣчаются въ морскихъ

*) P. Frank. Прив. соч. § 17. стр. 79.

**) Zückert, von den Speisen aus dem Thierreiche. стр. 14.

путешествіяхъ и въ крѣпостяхъ, осажденныхъ непріятелемъ: по, кажется, опть сего именно испочника получили свое начало различные способы сбереженія мяса. Способы сіи вообще основываются, часпію на удаленіи опть мяса причинъ, ускоряющихъ порчу и гніеніе онаго, каковы суть: теплота, воздухъ и жидкость, въ самомъ мясѣ содержащаяся, часпію же на употребленіи проптивугнилостныхъ средствъ. Все сіе пребуешь тщательнаго надзора касательно свѣжести и здоровости самага мяса, пакже касательно чистоты и прочности посуды. „И шѣ „бочки, въ копорыхъ мясо и масло содержатся, но будешъ, надавя дно шурупомъ и провер- „шя оное, спавишь прубку и, наливъ воды, „душъ, и гдѣ покажутся пузыри, шупъ ко- „нопашишь и пакъ со всякою бочкою пере- „ворачивая чинишь *).“ Простѣйшій способъ оптвращенія порчи мяса, на нѣкоторое по крайней мѣрѣ время, состоишь въ томъ, чшобы содержать мясо въ довольно холод-

*) Провіантскіе Регулы. Гл. VI. 2. Что при по-
кладѣ провіанта наблюдашь, когда въ одномъ
анбарѣ разныхъ магазиновъ - вахперовъ приѣмъ
будешъ. Стр. 166.

номъ мѣспѣ,—въ ледникѣ, въ холодной водѣ; для сего погружаютъ иногда мясо въ рѣку, ручей; либо же для опвращенія вліянія воздуха обливаютъ мясо масломъ или распопленнымъ жиромъ, спуденью, особливо при пересылкѣ дичины въ дальнія мѣспа; либо покрываютъ мясо пѣспомъ, соспавленнымъ изъ полченныхъ угольевъ и сперпой моркови. Уже выше сказано, что для сего пребывается, кромѣ чистопы сихъ вещеспвѣ, холодное мѣспо и время года. Что же касаетсѣ до погруженія мяса въ пекучую холодную воду, то оное, во первыхъ, не должно слишкомъ долго оспаваться въ водѣ, а во впо-рыхъ, замерзшее въ сихъ и другихъ случаяхъ мясо не должно вдругъ переносить въ тепное мѣспо, но приводитъ оное къ распаянію постепеннымъ увеличеніемъ умѣренной теплоты, чрезъ погруженіе въ холодную воду со льдомъ, и распаявшее мясо полчасъ варить или жарить, безъ всякаго замедленія. Само собою явспвуетъ изъ сего, что поргвцы, привозящіе зимою въ города мерзлое мясо, должны предъавлять надлежащее свидѣтельство, данное Смпришелями на мѣспѣ за-каланія живошныхъ и что дозволеніе въ го-

родахъ продажи шакого, равно какъ и всякаго привознаго мяса, должно зависѣть отъ Полицейскаго распоряженія, какъ то обыкновенно и дѣлается. Въ Сенапскомъ Указѣ *) сказано: „Что касается до привозимыхъ въ здѣшнемъ городѣ зимнимъ пушемъ съѣстныхъ припасовъ, состоящихъ въ разныхъ мясахъ, въ рыбѣ и иныхъ къ пропитанію нужныхъ вещахъ, то хощя нѣтъ въ томъ сомнѣнія, чѣмъ оныя не были изъ здоровыхъ и никакой опасности неподверженыхъ мѣстъ, потому что въ сходствительности прежнихъ уже законовъ всякое сообщеніе съ зараженнымъ мѣстомъ поочасъ пресѣкается; однакожъ для вѣдѣній предосторожности всѣмъ прїѣзжающимъ сюда по Тихвинской и С. Пелербургской дорогѣ обозамъ съ съѣстными припасами во первыхъ брашь отъ городскихъ Начальниковъ билеты, что они ѣдутъ изъ здоровыхъ мѣстъ, а во вторыхъ выдерживашь карантинъ до здѣшняго мѣста на каждой дорогѣ пять дней“ и т. д. Другой способъ

*) О разныхъ распоряженіяхъ по части торговли, къ предосторожности отъ моровой язвы. 1771 Октября 14.

сбереженія мяса есть сушеніе онаго, о чемъ въ Провіантскихъ Регулахъ сказано *): „Оцый „походный наполнятъ изъ ближнихъ къ опре- „дѣленному рандеу неподвижныхъ магазейновъ „мукою, крупюю, сухарями, солью, а иногда „и нѣкошорою часпью провизіи, въ числѣ ко- „торой особливо сушеное мясо за наиспо- „собнѣйшее къ возкѣ и къ долговременному „содержанію почитається.“ Мясо, назначен- ное для сушенія, изрѣзывается въ тонкія пластинки, обсушивается полопенцомъ, на- дѣвается на нитки или кладется на пле- шени и спавится въ испoпленную печь, имѣющую равномерную степень теплоты. Однакожъ присемъ нужно наблюдать, дабы слишкомъ усиленная теплота не образовала скоро на поверхности мяса пвердой корки, препятствующей испаренію внутреннихъ жид- костей, отъ чего въ послѣдствіи ускоряет- ся гнилость высушеннаго мяса.

Для копченія мяса подвергается оно е ды- му, производимому сжиганіемъ смолистаго

*) Провіантскіе Регулы. Глава X. 9. О имѣніи провіанта въ двойныхъ куляхъ или мѣш- кахъ и о покрышкѣ онаго рогожами. Спр. 281.

дерева, древесныхъ корокъ или листьевъ. Для сего нужно мясо предварительно посолить, не брать для копченія большихъ кусковъ и касательно степени теплоты наблюдать поже, что сказано о сушеніи мяса; для произведенія же дыму не должно употреблять земляныхъ смолъ и каменныхъ углей, содержащихъ въ себѣ сѣру, потому что она благопріиспівуетъ гнилости; наконецъ не должно допускать вдругъ горячій дымъ къ мясу.

Соленіе мяса бываетъ или простое, производимое чистою и сухою поваренною солью, или же прибавляюпся еще селифра и пряности (маіоранные, розмаринные, лавровые листья, коріандръ, можжевеловыя ягоды, имбирь, перецъ и проч.). Для сего нужно брать надлежащее количество чистой, сухой поваренной соли и неиспорченныхъ пряностей, а мясо, имѣющее много костей, неупотреблять для соленія; причемъ должно смотрѣть, чтобы поверхность мяса толстымъ сольнымъ слоемъ защищалась всегда отъ вліянія воздуха и чтобы такое мясо содержалось въ холодномъ мѣстѣ.

Таже самая осторожность, касательно вліянія воздуха и щеплоты, нужна въ то время, когда мясо защищается отъ порчи чрезъ обливаніе онаго безвредными кислыми, спиртными и спягивающими жидкостями (уксусомъ, виномъ, квишовымъ сокомъ и проч.).

По предложенію *Галиса* (Hales) испытано впрыскиваніе сольной воды въ сосуды животнога, свѣже-убишаго чрезъ одно полько выпущеніе крови. Средство сіе, сперва испытанное въ Мадагаскарѣ, *Франкѣ* *) почишають самымъ способнымъ для сбереженія мяса. Въ новѣйшія времена *Г. Манже* предложилъ, древесную кислоту, какъ лучшее средство для сбереженія мяса **).

В. Янсонъ ***) предлагають чрезъ соленіе, приправленіе пряностями мяса и попомъ

*) Mediz. Poliz. 3. B. § 25. S. 120. Nota. u. Krü- nitz Oekon. Encyklopädie. VI. B. S. 73-76.

**) Erfahrungen über die Ursachen der anstecken- den Krankheiten belagerter Festungen. Eine Preisschrift von D. E. T. Wittmann. Mainz. 1819. 8. S. 62.

***) Wolfgang Janson's Anweisung zu einer neuen Schnellräucherungs-Methode, jede Gattung Fleis- ches, ohne Feuer u. Rauch, in wenigen Stun- den auf nassem Wege äusserst wohlfeil zu räuchern etc. München. 1824.

обливаніе онаго растворомъ щелока изъ сажи, съ примѣсью поваренной соли, дѣлать мясо въ кратчайшее время не только способнымъ для долгаго лежанія, но и весьма вкуснымъ. Посему способъ сей предпочтенъ копченію мяса и употребленъ былъ съ наилучшимъ успѣхомъ въ Минхенѣ.

Соленіе мяса въ Австрійской арміи дѣлается съ 1822 года по способу Капишана *Кораси* *), одобренному во многихъ случаяхъ. Сущность присемъ состоитъ въ хорошемъ выборѣ мяса, въ напираниіи онаго солью, къ коей примѣшана принадлежала часть селистры, въ смѣшеніи онаго съ можжевеловыми ягодами, коріандромъ, или же, если сіе дорого, съ калгановымъ корнемъ, наконецъ въ помѣщеніи онаго въ хорошо выдѣланныя бочки. Таковое соленіе совершается обыкновенно въ присутствіи опредѣленной для сего Коммисіи.

Риттеръ **) предлагаетъ способъ соленія мяса, совершенно отличный отъ Австрій-

*) Jsfordink. Прив. соч. I. В. § 227. S. 440.

**) Abhandl ung über die Ursachen ansteckender Krankheiten in belagerten Plätzen, v. G. H. Ritter. Leipzig. 1819. S. 32.

скаго, п. е., вся поверхность мяса напирается продолжительно солью, потомъ посыпаясь ею мясо довольно плотно и кладутъ оное на 6 дней въ бочки; вынутое изъ бочекъ мясо погружаютъ на полчаса въ непрерывно кипящую воду и раскидываютъ на сподахъ на 24 часа, дабы вышелъ весь паръ изъ мяса. Между тѣмъ приготавливается свѣжій, крѣпкій соляной рассолъ, мясо кладется опять въ бочки и обливается симъ рассоломъ; бочки потомъ закрываются, капаются во всѣ стороны и покрываются снаружи двумя часпями смолы и колофони. При самомъ вкладываніи мяса въ бочки должно оное спавить прямо вверхъ и почаще обораживать, дабы соляной рассолъ проникалъ чрезъ все мясо. Офиціальныя опыты показали, что мясо такое остается четыре года съ четвертью свѣжимъ, удерживаетъ хорошій цвѣтъ, пріятный запахъ, безъ малѣйшихъ слѣдовъ гнилости. Обыкновенное при солении мяса примѣшаніе селитры *Ritterb* отвергается, потому что отъ сего мясо дѣлается безсочнымъ и получаетъ непріятныя качества.

Решъ *) предлагаетъ слѣдующій мясной порошокъ, въ копоромъ, по опытамъ *Бухгольца*, мясо нимало не шеряеть живою спудени и клейкаго вещества. Мясо должно въ водяномъ парѣ выварить до двухъ претей, потомъ на особенной, къ сему служащей, перкѣ спереть, высушить на воздухѣ и класть въ жестяные сосуды или бочки. При употребленіи порошокъ сей кладется въ холщину и съ оною вѣшается въ кипящую воду, назначенную для сваренія мясной похлебки. Кромѣ того, что такимъ образомъ получается, говоритъ *Решъ*, хорошая мясная похлебка, порошокъ сей послѣ варенія можно кушать какъ мясо. Симвъ составомъ замѣнялся пошъ мясной порошокъ, копорый употребляемъ былъ Прусскою арміею во время семилѣтней войны.

Обнародованный за нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ Парижѣ мясной порошокъ *Г-на Тенара*, извѣстный подъ именемъ *Osmazome*,

*) Versuch einer Beantwortung der Frage: Wie kann dem Fleischmangel bei grossen Armeen abgeholfen, und dieses Nahrungsbedürfniss in fleischarmen Gegenden am leichtesten herbeigeschaft werden. v. Fr. A. v. Resch. Erfurt. 1807.

имѣеть сходство съ порошкомъ *Реша* *). Впрочемъ дальнѣйшіе опыты въ большомъ видѣ должны рѣшиться, можетъ ли способъ, предложенный *Г-мъ Тенаромъ*, быть употребленъ въ крѣпостяхъ и на корабляхъ.

Вообще всѣ сіи мясные составы, сколь ни хороши для частныхъ случаевъ, не всегда могутъ быть употреблены въ большихъ арміяхъ и на флотахъ, именно по причинѣ сложности и дороговизны оныхъ. Посему предложеніями сего рода должно пользоваться въ самой только крайности.

Слѣдующія однако два предложенія достойны, по всей справедливости, особеннаго вниманія. Первое состоятъ въ томъ, что *Д. Вурцеръ* предложилъ уже въ 1794 году сухую спудень изъ костей для армій *). Сіе предложеніе послѣ возобновилъ *Гермштедтъ* въ Берлинѣ, а *Каде де Во* ввелъ оное во всеобщее употребленіе. Профессоръ *Гаусманъ* ***) тоже весьма рекомендовалъ въ

*) Jsfordink. Прив. соч. I. В. § 227. S 442.

**) Тамъ же.

***) Einfaches Mittel, die Beköstigung der vor dem Feinde stehenden Heere und die Stärkung verwundeter und erkrankter Krieger zu erleichtern. Wien. 1815. 8.

1815 году сухую спудень изъ костей. *Дарсетъ* въ новѣйшія времена совѣшовалъ приготавливать сію спудень посредствомъ разведенной соляной кислоты, безъ вывариванія и сгущенія. Приготовление сей спудени дѣлалось въ Австрійской арміи *) въ 1804 и 1805 годахъ съ большою дѣятельностію и съ малыми издержками **).

Второе предложеніе состоитъ въ томъ, что говядина, шеляпина, баранина, птицы, — даже супы, бульоны, распѣнія, сливки и пи-

*) Isfordink. Прив. соч. S. 443.

**) Сполъ же важно и сообразно съ экономическою цѣлью приготовленіе Румфордовыхъ суповъ. Между различными видами оныхъ, извѣстными подъ именемъ Парижскихъ, Лейпцигскихъ, Минхенскихъ, Дрезденскихъ, Лондонскихъ суповъ, упомянемъ только о Парижскомъ, какъ простѣйшемъ. Одна порція сего супа (составляющая одинъ фунтъ и 13 лошовъ) готовится изъ 1 фунта и 8 лошовъ воды, 10 лошовъ карпозеля, 1 лопа ячменной крупы и сполько же Турецкихъ бобовъ и чечевицы, $\frac{1}{8}$ лопа говяжяго жиру, $\frac{1}{2}$ лопа соли и 2 лошовъ бѣлаго хлѣба. Изъ зелени прибавляется къ сему, на 15 порцій, 1 фунтъ пепрушки, или луку, чесноку, селлеры и проч.

рожное, — все сіе можешъ быть сбережено весьма удобно по способу, употребляемому Г-мъ *Апперолъ* *). Сущность присемъ состоишь въ томъ, чтобы положишь сберегаемое вещество въ бушыку, закупорить оную съ величайшимъ спараніемъ герметически и подвергнувъ дѣйствию кипячей воды въ марійной ваннѣ въ продолженіи нѣкопорого времени, смотря по роду вещества, попомъ вынувъ бушыку изъ ванны и хранишь. Удобство сего способа очевидно; нужно только, кажешся, производить сіе всегда въ стекляныхъ сосудахъ, а не въ оловяныхъ цилиндрахъ, кои по наполненіи запаиваются.

Распознаваніе порчи и подлѣсей мяса. Какъ предопвращеніе, такъ и распознаваніе порчи

*) *L'art de conserver, par plusieurs années, toutes les substances animales et végétales.* Paris. 1812. (Сочинитель получилъ въ награжденіе 12,000 франковъ). *Erfahrungen über die Ursachen der ansteckenden Krankheiten, von Wittmann.* S. 62 u. ff. Сынъ Отечества. 1828. N. 21 и 22-й. Сентябрь и Октябрь. О пипательныхъ веществахъ и ихъ сбереженіи (изъ *Dictionnaire, portatif de Chimie.* Paris. 1824). Перевелъ С. Усовъ. Стр. 123 - 124.

и подмѣсей мяса бываетъ весьма различно, по качеству самыхъ причинъ порчи мяса, находящихся или въ живыхъ еще бойныхъ животныхъ, или при закланіи оныхъ, или же послѣ закланія. Во всѣхъ сихъ случаяхъ преобуется основательное знаніе здороваго и болѣзненнаго состоянія, естественныхъ и искусственныхъ, поддѣланныхъ качествъ. Посему распознаваніе сіе состоитъ:

Во первыхъ, въ показаніи недостатка естественныхъ качествъ.

Естественныя качества здоровыхъ бойныхъ животныхъ суть:

1) Предъ закланіемъ,

а) Живошное имѣетъ бодрый и свѣжій взглядъ и хорошо ходитъ, надлежащимъ образомъ испражняетъ калъ и мочу, оказываетъ должный позывъ на ѣду. Рогатый скотъ продолжаетъ естественнымъ порядкомъ жевать жвачку.

б) Ротъ, носъ, глаза, уши сохраняютъ свойственную плѣнь или другимъ естественную влажностъ или сухостъ и температуру, каковая примѣчается также на рогахъ (у рогатыхъ), хвостѣ и у самокъ на вымѣ.

в) Шерсть, кожа, перья у птицъ, словомъ, вся поверхность тѣла, имѣющъ свойственный каждой породѣ животныхъ видъ, естественный цвѣтъ и надлежащую животную теплоту.

2) При закланіи.

а) Надлежащее качество крови, вытекающей изъ разрѣзаннаго мѣста. У рогапаго скота кровь сія имѣетъ свѣтлоокрасный цвѣтъ, надлежащую жидкость, въ сосудѣ пѣнилась и при ссѣданіи своемъ образуетъ мало пасоки. У свиней цвѣтъ крови свѣтлѣе, нежели у рогапаго скота *).

б) Внутренняя поверхность кожи, снятой съ животного и вся поверхность тѣла, обнаженная опъ кожи, имѣющъ естественный цвѣтъ и такое же строение; поже самое примѣчается въ клѣпчатой плевѣ и мышечныхъ частяхъ.

*) Anleitung, nach welcher der Gesundheitszustand bei den schlachtbaren Hausthieren, sowohl im lebenden als geschlachteten Zustande zu erkennen etc. von T. W. A. Grüll. Breslau. 1826. 8. S. 6 и 10. (§§ 1 и 3).

в) Вскрышыя полоспи имѣють надлежащее пространство и отношеніе къ содержимымъ въ оныхъ внутренностямъ, при естественномъ количествѣ и качествѣ жидкихъ частей животныхъ; самыя внутренности, содержаемыя въ сихъ полоскахъ (мозгъ, легкія, сердце, желудокъ, кишки, печень, селезенка, желчный пузырь и проч.), представляють естественный цвѣтъ, видъ и величину, такое же положеніе и соединеніе съ окололежащими частями, надлежащую упругость и мягкость, словомъ, правильное строеніе. У рогагого коза и свиней легкія на ощупь губчатые, блѣдно-краснаго цвѣта; околосердечіе представляется въ видѣ перепонки, блѣдой, крѣпкой, нѣсколько жиромъ покрытой; въ разрѣзанномъ околосердечіи находится весьма малое количество жидкости, чистой воды, безъ запаха и вкуса.

3) *Послѣ закланія.*

а) Мясо имѣетъ цвѣтъ чистый, свѣтло-красный, розовый, блѣловатый, смотря по различію животныхъ; запахъ его животный, непротивный.

б) Мясныя волокны довольно тонки, имѣютъ умеренную крѣпость, при сообразномъ количествѣ и качествѣ клѣпчатой плевы и жира. Въ мясѣ большого рогатого скота жиръ имѣетъ желтый цвѣтъ, у свиней и овецъ бѣлый.

в) Самая плотность мяса средняя между весьма мягкимъ и весьма твердымъ состояніемъ.

г) Сѣменный каналъ, особливо у барановъ, имѣетъ умеренную толщину.

д) Хорошія сельди и анчоусы или сардели (*Clupea harengus* et *Clupea alota* L.) имѣютъ внѣшній цвѣтъ бѣлосеребристый, нѣжное бѣлое мясо, не весьма соленого и жирнаго вкуса; на ощупь сочны и жирны. Самцы между сельдями почищаются лучшими.

е) Хорошія свѣжія устрицы имѣютъ скорлупу гладкую, тонкую, крѣпко закрытую. При вскрываніи скорлупы находится свойственная устрицамъ морская вода (знакъ свѣжести и жизни устрицы). Устрица выполняетъ, почти совершенно, скорлупу свою и имѣетъ малую бородку или связку свѣшлагобураго цвѣта. Устрица должна прира-

спать къ нижней или углубленной своей скорлупѣ и, бывъ надрѣзана и разжевана, должна имѣть пріятный соленоватый вкусъ и между зубами нѣсколько прещать. Цвѣтъ усприцы блѣдно-голубовато-бѣлый.

ж) Хорошія колбасы имѣютъ начинку довольно твердую, негрозную, безъ особеннаго запаха и вкуса.

Во вторыхъ, трезъ показаніе постороннихъ качествъ.

Качества больныхъ бойныхъ живошныхъ сущь:

1) *Предъ закланіемъ.*

а) Унылый или дикій, болѣзненный взглядъ, безпорядокъ въ позывѣ на ѣду, въ жеваніи жвачки (у рогапаго скопа) и испражненіяхъ.

б) Теченіе изо рта слюны, или испеченіе слизисшой, гнойной, кровяной влаги изъ носа, глазъ, ушей.

в) Рога (у рогапыхъ), уши, ропъ, носъ, хвоспъ, у самокъ вымя, чрезмѣрно холодны или весьма жарки.

г) На кожѣ замѣчается нѣчто, похожее на чешую, муку, золу, опруби.

д) Оспины, изъязвленія, струпы, особенно на головѣ, ушахъ, нижней челюсти, на шеѣ, во рту и даже на языкѣ.

е) Опухоли или желваки на шеѣ, за ушами, подъ мышками, на ляшкахъ; у самокъ вымя опухлое, изъязвленное.

2) При закланіи.

а) Кромѣ измѣненнаго иногда качества крови, испекающей при самомъ закланіи, усматриваются по снятіи кожи оспины, желваки или наросты на наружной поверхности пѣла и между мясистыми частями; причемъ мясо лишено естественнаго цвѣта.

б) Легкія бываютъ приросшія къ подреберной плевѣ, покрытыя темнокрасными, синими, желтыми пятнами, желваками, язвами, гнойною влагою и проч. Внутри шеи и въ легкихъ попадаются пузыри, наполненные водянистою или гасообразною жидкостью и издающіе при разрывѣ вонючій запахъ (знакъ заразительной болѣзни).

в) Окрѣпость печени, чрезмѣрная величина ея, чрезмѣрная мягкость, губчатость и раздупіе селезенки, раздупіе желчнаго пузыря, желудковъ и кишекъ, вообще измѣнен-

ный видъ и цвѣтъ всѣхъ сихъ внутренностей.

г) Хрящеватая твердость желудочныхъ и кишечныхъ перепонокъ, съ синими и черными пятнами на внутренней ихъ поверхности.

Замѣлить однако должно, что малыя, круглыя, твердыя, нѣсколько жирныя опухоли, находимыя во внутренностяхъ грудныхъ и брюшныхъ, доказываютъ худое качество мяса въ такомъ только случаѣ, когда при этомъ находятся опроверженія, язвы и другія болезненныя явленія, соответствующія онымъ и обозначенныя въ обзорѣнн болѣзней животныхъ, дѣлающихъ мясо ихъ совершенно вреднымъ.

3. *Послѣ закланія.*

а) Мясо, смотря по степени порчи, имѣетъ запахъ, болѣе или менѣе отвратительный, а цвѣтъ темнобурый, синій, черноватый.

б) Дряблость и вялость мясныхъ волоконъ, водянистость, или же напротивъ кожеобразный, хрящеватый видъ мяса.

в) Надутое мясо имѣетъ грязный видъ,

при давленіи перстами издають прескъ и оказывають необыкновенную упругость. Если часть мяса болѣе упругую проколошь острымъ орудіемъ, потомъ подавишь рукою и наклонишься лицомъ къ мясу, то выходженіе воздуха изъ мяса будетъ довольно ощутительно. Сверхъ того, если надутое мясо давится и обмывается въ водѣ, то клѣпчатая его плева морщится, получаетъ неприятную вялость и мягкость и опдѣляется весьма легко отъ мяса, потому что вдутымъ воздухомъ она уже опдѣлилась отъ мяса.

г) Говорятъ, что вообще подозрительна рыба, имѣющая величину, не совсѣмъ обыкновенную, зубы черные, желтые, лишенная рыбьяго запаха; если припомъ серебро, съ нею варенное, почернѣетъ. Впрочемъ знаки сіи недостоверны **).

д) Намазываніе лежалаго мяса кровью узнается чрезъ вымываніе въ водѣ.

е) Рыбы, издохшія во время перевозки, оплывающія шѣть, что имѣютъ красныя плавапельныя перья и твердое мясо; рыбы,

*) Der freymüthige Heilkünstler v. Ed. Loebel. 2-er Theil. Berlin. 1806. S. 110.

**) Вышеприв. ч. Сына Опеч. стр. 110.

давно уже издохшія, имѣютъ позади плавательныхъ перьевъ блѣдный цвѣтъ и мягкое мясо *).

ж) Рыбы, подверженныя проказѣ (лососи, форели и проч.), имѣютъ болѣе обыкновеннаго пиямень и во внутренностяхъ своихъ, какъ уже упомянуто (спр. 188), содержатъ червей. Мясо сихъ рыбъ чешуегато, блѣдно, а кровь сплошь густа, что вовсе не внешнекается.

з) Худыя сельди и сардели или анчоусы имѣютъ какъ бы сморщенный видъ, мясо вязкое, красное, весьма соленого и салнаго вкуса; на ощупь бываютъ сухи или вязки.

и) Худыя усприцы имѣютъ скорлупу жесткую, узловатую и шолстую, некрѣпко смыкающуюся; по вскрытіи скорлупы не находится свойственной усприцамъ морской воды. Усприцы такія занимаютъ мало мѣста въ скорлупѣ, имѣютъ много бородокъ или связокъ, цвѣта темнобураго и даже зеленого. Цвѣтъ самыхъ усприць сливочный, а вкусъ молочный или припороно-сладкій; онѣ во рту распускаются какъ каша. Больныя усприцы имѣютъ раздутую скорлупу, въ ко-

*) Bernt l. c. S. 273. § 684.

ей попадаются иногда малыя жемчужины, подобныя часпю настоящему жемчугу. У гнилыхъ усприць растворенныя скорлупы не смыкаются опяшь и не содержатъ въ себѣ воды; самая усприца имѣетъ цвѣтъ зеленоватый или сѣробурый, видъ сморщенный, вкусъ гнилой, а запахъ вонючій. Усприцы, поддѣланныя мѣдью, открываются чрезъ то, когда естественная ихъ вода разведена будетъ перегнанною водою и потомъ прибавится ѣдкій нашатырный спиртъ; появленіе присемъ голубаго цвѣта осадка есть знакъ присущства мѣди.

i) Испорченныя колбасы узнаются изъ того, что начинка ихъ дѣлается мягче и жиже; будучи разрѣзаны, издають онѣ, особливо въ срединѣ своей, не столько гнилой, а болѣе сладковато-кислый, гною или сыру правяному свойственный запахъ и имѣють горькій вкусъ. Если надъ ними держать крѣпкую уксусную кислоту, то онѣ опдѣляютъ болѣе или менѣе паровъ и шѣмъ доказываютъ присущствіе въ нихъ амміака; онѣ также окрашиваютъ лакмусовую бумагу краснымъ цвѣтомъ и шѣмъ доказываютъ присутствіе въ нихъ кислоты. Чрезъ выщелачива-

іе посредствомъ перегнанной воды куска испорченной колбасы получается вышеупомянутая (спр. 201-202) жирная кислота, разведенная и не весьма чистая. Посему нужно оную насытить чистымъ ками, выпарить слегка до сухости и въ тубулатной ретортѣ подвергнуть съ крѣпкою сѣрною кислотою перегонкѣ. Черезъ сіе сѣрная кислота соединится съ ками (*sulphas potassæ*), а чистая жирная кислота перейдетъ въ приемникъ и представитъ жидкость соломенно-желтоватаго цвѣта, особеннаго запаха, непропивнаго, нѣсколько оспраго, кислаго, сходнаго съ запахомъ правянаго сыра. Жидкость сія окрашиваетъ лакмусовую бумагу въ весьма красный цвѣтъ и вскипаетъ съ углекислыми щелочами. Съ растворомъ селитро-кислаго серебра образуетъ она бѣлосѣрый осадокъ охлопкватый. Также происходитъ съ растворомъ сулемы. Съ нѣдвѣднѣмъ амміакомъ образуетъ она голубовато-бѣлый, опливающий зеленымъ цвѣтомъ, осадокъ. Черезъ одно только выщелачиваніе гнилыхъ колбасъ полученная жирная кислота слабая производитъ всѣ почти тѣже переѣны съ сказанными веществами.

(Продолженіе въ слѣдующемъ N.)

II.

ЗАМѢЧАНІЯ О ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ЛИХОРАДКѢ, ЭНДЕМИЧЕСКИ ГОС- ПОДСТВУЮЩЕЙ ВЪ МОЛДАВІИ И ЕЯ ОКРЕСТНОСТЯХЪ.

Доктора Медицины и Хирургіи Я. Чаруковскаго.

Находясь по долгу службы въ спранѣ почти непрерывнаго царствованія перемежающейся лихорадки, я имѣлъ случай наблюдать ея теченіе и замѣчать ходъ оной въ много-различныхъ измѣненіяхъ, начиная отъ легкаго озноба либо жара до сложнаго гемиприпея, и грознаго ея появленія въ образѣ спячки, нѣмошны, поспрѣла, высочайшаго безсилія и проч. Не имѣя времени описывать сію болѣзнь обстоятельно, я, сообразно цѣли сего Журнала, представляю объ ней только краткія практическія замѣчанія.

По мѣрѣ приближенія войскъ къ Южной странѣ Россіи и наступленія весны, перемежающаяся лихорадка, почти вовсе незамѣчаемая на Сѣверѣ, начала оказываться чаще, и въ сильнѣйшемъ видѣ. Во время прохода войскъ чрезъ Польшу, а особливо въ Волынской и Каменецъ-Подольской губерніяхъ, лихорадочные больные уже не выводились въ полковомъ лазаретѣ. Въ сихъ губерніяхъ на каждой станціи во множествѣ Поляки и Евреи приходили ко мнѣ просить помощи въ своей болѣзни, которая у большей части изъ нихъ была перемежающаяся лихорадка. Обыкновенно она оказывалась у нихъ, равно какъ и у солдатъ, въ наспоющемъ своемъ видѣ: ознобомъ, жаромъ и попомъ.

Съ приближеніемъ войска къ Днѣпру и во время прохода его по Бессарабіи лихорадки начали показываться чаще и въ измѣненномъ видѣ (такъ называемая *dialeiruga incompleta*); за то болѣзни гасприческія (выключая поноса) и воспалительныя прекратились почти вовсе. Здѣсь перемежающаяся лихорадка оказывалась въ видѣ повторяющагося озноба, замѣняемаго иногда жаромъ безъ поппа, или же въ видѣ легкаго жара, оканчивающагося попомъ

и была большею частію каждодневная... Съ переходомъ войскъ чрезъ Дунай въ Болгарію и съ наспупленіемъ жаркихъ лѣпныхъ дней лихорадка начала показываться еще болѣе въ измѣненномъ видѣ. Главнѣйшіе изъ видовъ были слѣдующіе *).

*) Такимъ образомъ почти каждой переходъ полка, на распояніи 20-25 верспъ, былъ ознаменованъ измѣненіемъ свойства болѣзни, поражающей воина, и вѣрныя наблюденія надъ дѣйствіемъ климатовъ на здоровье людей во всей почности могутъ сдѣлать одни внимательные Военные Врачи: ибо, зная свойство обыкновенныхъ болѣзней, поражающихъ ввѣренныхъ имъ солдатъ, они съ болѣею почностію могутъ видѣть разность недуговъ, одерживающихъ войско при движеніи его въ разныхъ частяхъ земли, кромѣ того, что медленность движенія войскъ, единообразіе ихъ пищи и одежды дѣлають для Военнаго Врача возможнымъ оплечать въ наблюдаемой имъ болѣзни климатныя произведенія опъ случайныхъ явленій оной. Говоря съ почностію, я почти на каждыя 100 верстахъ видѣлъ разность въ степени и свойствахъ однихъ и тѣхъ же болѣзней; для меня было весьма поучительно замѣчать, какъ съ одной стороны жестокія Сѣверныя воспаленія легкихъ, требо-

1-е. Послѣ предшедшаго легкаго озноба или лешучаго жара, либо и безъ оныхъ, появлялась рвоша, нерѣдко чистую желчью, съ сильною болью головы; послѣ сего слѣдовалъ жестокій ознобъ, замѣняемый таковымъ же жаромъ, оканчивавшимся проливнымъ попомъ. Смотря по степени сихъ припадковъ и по сложенію тѣла, больные послѣ того чувствовали себя хорошо или весьма слабыми; впрочемъ замѣтны были нѣкоторыя другіе припадки гастрицизма, нечистота языка и при допрогиваніи легкая боль въ правомъ и лѣвомъ подреберьѣ. Иногда болѣзнь походила на послабляющую желудочно - воспалительную лихорадку (*Febris remitt. gastrico-inflammatoria*) и ненаучившимся различать насущное ея свойство подавала поводъ къ упо-

вавшихъ обильныхъ кровопусканій, по приближеніи полка къ Югу Россіи, уступали селипрѣ, переходили въ легкія колотья и наконецъ со всѣмъ прекращались; а съ другой какъ заступили ихъ мѣсто капарральныя лихорадки, воспаленія мозга, нервныя горячки, и какъ появились новыя болѣзни: перемежающаяся лихорадка и кровавый поносъ, выпѣснившія наконецъ совершенно изъ лазарета Сѣверныя недуги.

проблению пропннвугаспрнческнхъ средствъ; но при таковомъ лѣченіи, либо и безъ онаго, рвоиа возвращалась періодически, слабость усиливалась, присоединялись припадкн сочувственнаго пораженія мозга, и больной умиралъ въ безчувствіи (*diapleura biliosa* *).

2-е. Иногда пароксизмъ начинался неизъяснимою тошкою, быспрымъ измѣненіемъ цвѣта лица, головокруженіемъ, мучительными позывами на рвоту, помраченіемъ чувствъ, пререпаніемъ сердца и наконецъ обморокомъ. Горестно было смотрѣть на таковаго спрдальца. Послѣ спрашнаго, обмиранію подобнаго пароксизма, продолжавшагося иногда часовъ двенадцать и болѣе, больной съ ужасомъ приходилъ въ чувство, не помнилъ ничего съ нимъ случившагося, жаловался только на чрезвычайную слабость, неизъяснимую тошкуну; движеніе его кровяной системы въ пароксизмъ неускоренное, но даже медленное и слабое; жаръ самый слабый, безъ поща. Ежели послѣ перваго пароксизма не будетъ дана хинная соль въ больникъ пріе-

*) Эпнотъ видъ естѣ обыкновеннѣйшій, и попомутно Врачи такъ много похваляютъ рвоиный въ лихорадкахъ.

нахъ, что больной не выдержитъ впорога приступа, а при прѣшемъ умереть непременно. Въ шрупъ его не примѣшно ничего особеннаго, кромѣ какого-то сжатія легкихъ (невѣрнаго и непостояннаго) и наполненія сердца кровью больше обыкновеннаго. Я замѣнилъ сію лихорадку чаще у людей крѣпкихъ; она иногда походитъ на обморокъ въ высшей степени и особенно поражаетъ сердце (*dialeirya cardiaca, syncoralis, asphyctica*); къ счастью, она рѣдко встрѣчается.

3-е. Наконецъ сія лихорадка иногда оказывается въ видѣ поспрѣла, спячки, нѣмолпы, съ судорогами лица, конечностей и проч. Въ семъ случаѣ больной либо ощущаетъ окружающіе его предметы, но не отвѣчаетъ на вопросы, либо находится въ совершенномъ безчувствіи, изъ коего будучи выведенъ, сморщитъ дико, ничего не говоритъ и скоро опять впадаетъ въ безчувствіе, въ которомъ походитъ на мягкій шрупъ (особливо на походъ въ лазаретной каретѣ, гдѣ отъ тряски онъ всегда спускается внизъ по наклонности мѣста). Нѣкоторыя въ пароксизмѣ храпятъ сильно, а другіе спятъ тихо. Приступъ иногда продолжается сушки и долѣе—до смерти; но и

по окончаніи пароксизма больные находятся въ забытій. Въ пароксизмѣ пульсъ бываетъ слабой, ускоренный, угнетенный, жаръ невеликъ, нерѣдко показывающія жестокія судороги въ полуоткрытыхъ глазахъ, лицѣ и проч.; больные бросаются съ поспѣли, шиплютъ вокругъ себя, подобно нервно-горячечнымъ. Нѣкоторые во время пароксизма онѣмѣваютъ; по всему видно, что они имѣютъ самовѣденіе, смотрятъ на Врача, понимаютъ его движенія, но не могутъ отвѣчать до окончанія пароксизма; другіе, сохраняя самовѣденіе, показываютъ какое-то равнодушіе и безболѣзненность; все у нихъ въ порядкѣ и ничего не болѣтъ—обыкновенный ихъ опивѣтъ. Словомъ, сей видъ лихорадки въ своихъ припадкахъ выражаетъ какое-то угнетеніе мозга и всей нервной системы (*dialeptura somatica, cataleptica, apoplectica etc*). Въ шрупахъ сихъ несчастныхъ находился болѣею частію сильное накопленіе крови въ сосудахъ мозга, а въ желудочкахъ его значительное количество пасоки, но не всегда и не въ обоихъ, паупинная оболочка темно-синяго цвѣта и весьма кровяниста. Не смотря на всѣ сіи живыя и мертвыя явленія,

кровопусканія не облегчаютъ припадковъ, которые большой приѣмъ хинной соли прогоняетъ какъ бы очарованнымъ жезломъ.

Всѣ сии виды лихорадки, не смотря на свое разнообразіе и измѣненность, имѣютъ что-то общее и, хотя съ трудомъ, но узнаваемы бытъ могутъ; впрочемъ есть особенный видъ перемежающейся лихорадки, который только по опытности, а болѣе по успѣху лѣченія распознать можно. Я слышалъ непрерывныя жалобы солдатъ на ревматизмъ рукъ, ногъ, поясицы; но судя по тогдашнему прекрасному времени, я считалъ жалобы ихъ средствомъ къ уклоненію отъ ранца и къ отсылкѣ въ лазаретъ; многіе изъ нихъ въ послѣдствіи заболѣвали перемежающеюся лихорадкою, которую однако я не считалъ состоящею въ причинномъ отношеніи съ ревматизмомъ. Штабъ-Докторъ Гвардейскаго Корпуса Г. Дѣйствительный Спавскій Совѣтникъ *Бутковъ* (которому за спасительные совѣты я всегда буду благодаренъ) первый обратилъ мое вниманіе на сии боли, какъ признакъ будущей перемежающейся лихорадки. Признаюсь, что такое замѣчаніе сначала меня удивило и привело даже въ сомнѣніе, которое однако

въ скоромъ времени собственный опытъ разрушилъ совершенно.

Съ 10-го Августа, подъ Кавариною, послѣ проливнаго дождя съ сильною грозою, почувствовалъ я легкую боль въ поясницѣ, возвращавшуюся въ 2 часа по полудни и продолжавшуюся до 6 часовъ вечера. Въ скоромъ времени въ означенные часы началъ я чувствовать легкую дрожь, чередовавшуюся съ легкимъ жаромъ, чувствительнѣе оказывавшимся въ глазахъ. Я вспомнилъ замѣчаніе почтеннаго Начальника, принялъ хинную соль и, къ удивленію моему, назавтра не было уже ни боли поясницы, ни лепучаго жара. Наученный собственнымъ опытомъ, въ послѣдшіи времени обращалъ я особенное вниманіе на ревматизмъ конечностей и преимущественно икорь (*zinga*) и два раза съ помощію сего предвѣспника имѣлъ счастье предошварить грозный видъ лихорадки.

Больные, выздоравливавшіе отъ лихорадки послѣ 1-5-8-го приспуа, поправлялись скоро въ своихъ силахъ; но спрдавшіе 4 - 8 недѣль и болѣе медленно вознаграждаютъ утраченное здоровье, легко получаютъ возвратъ лихорадки весьма упорный, и особенно на-

клонны къ худосочию, которое такъ явствен-
но выражается въ цвѣтѣ лица, что однимъ
взглядомъ можно уже опличить одержимаго
лихорадкою. *Dialeiruga asphictica*, зорогоза
однимъ приступомъ производятъ такое раз-
стройство въ питаніи организма, что для
возстановленія его силъ иногда поребно нѣ-
сколько недѣль. Водянистыя накопленія въ
полостяхъ пѣла, а чаще въ клѣпчатой пле-
вѣ, суть обыкновенныя слѣдствія ослаблен-
наго питанія упорною лихорадкою. Нѣкто-
рые, еще будучи здоровы, мучатся предчув-
ствіемъ смерти, и сіе предчувствіе нерѣд-
ко сбывается.

О причинахъ сихъ лихорадокъ подробно го-
ворить почтиаю излишнимъ. Онѣ заключаю-
тся въ мѣспномъ свойствѣ воздуха и извѣст-
ныхъ случайныхъ вліяніяхъ. Самыя опасныя
лихорадки случались въ Августѣ мѣсяцѣ, ко-
гда за сильнымъ дневнымъ зноемъ слѣдовали
холодныя ночи и обстоятельство заспавля-
ли насъ съ лазарешомъ дѣлать переходы въ
ночное время; причемъ и больные должны
были опдыхать подъ открытымъ небомъ.
Злокачественныя лихорадки (*d. comatosa, car-*
diaca, apoplectica etc.) поражали преимуще-

существенно людей здоровыхъ, нервно-сангвиническаго темперамента.

Вразсужденіи лѣченія лихорадокъ вообще можно сказать, что оно очень неопредѣленно; иногда онѣ излѣчиваются весьма легко, а иногда всѣ употребленныя средства оказываются недействительными. Но лихорадки, свирѣпствующія въ Молдавіи, особенно претбуютъ сопротивляющаго себѣ способа лѣченія, и Врачъ, прославившійся лѣченіемъ сего рода болѣзней въ умѣренномъ климатѣ, потеряетъ свою славу, если будетъ лѣчить ихъ здѣсь нѣмъ же способомъ. Не имѣя возможности и не видя надобности употреблять другія безчисленныя пропивулихорадочныя средства, я довольствовался порошкомъ изъ хинѣя, каскарилли и ира, составленнымъ по предложенію Его Превосходительства Г-на Главнаго по арміи Медицинскаго Инспектора, хинною съ напашыремъ, чистую хинною, и наконецъ хинною солью.

Rp. Pulv. humuli lupuli gr. j.

— cort. cascarillæ

— rad. acor. calami ꝛ ѳβ.

M. f. pulv. omni 2-3 horis sumendus.

Приемъ хинна увеличивается полграномъ до появленія головной боли или прекращенія пароксизма. Ежели въ продолженіи шестидневнаго лѣченія симъ средствомъ лихорадка не ослабляла больного, то, смотря по состоянію первыхъ путей, я давалъ хину съ нашатыремъ (*Cort. cinchonæ off. 3iβ - 3jj, sugiat. ammon. gr. x—xij*), также шесть разъ въ сутки, или чистую хину по 3ij на приемъ, тоже по шести порошковъ. Ежели лихорадка не уступала и сему лѣченію, то я назначалъ хинную соль (*Sulphas chinini*). Заспавшая лихорадка, продолжавшаяся 5-6 мѣсяцовъ (*hemitritaeus*, о которыхъ я выше не упомянулъ поному, что онѣ не суть существенное измѣненіе болѣзни), не могли больше двухъ пароксизмовъ противостоятъ лѣченію послѣднимъ средствомъ (чему я и теперь имѣю предъ глазами примѣры). Я давалъ хинную соль, по совѣту моего почтеннаго Начальника Штабъ-Доктора Гвардейскаго Корпуса, въ самыхъ большихъ приемахъ обыкновенно такъ:

Rp. Sulphat. Chinin. gr. ii-iv.

Sach. albi ʒβ. Disp. tales. dos. N iv-vi.

D. S. omn. 3 - 4 horio pulv. i.

Рѣдко я принужденъ былъ увеличивать пріемъ и умножать число порошковъ.

Лучше всего расположивъ дачу порошковъ такъ, чтобы послѣдній былъ принятъ за часъ до появленія пароксизма, который чрезъ то замѣтно обезсиливается. Больные, съ пользою принявшіе означенное количество хинной соли, за 5-10 часовъ чувствуютъ по своимъ силамъ, что слѣдующій пароксизмъ не появился. Нѣкоторые больные по пріемѣ перваго порошка хинной соли ощущаютъ пріятную теплоту, разливающуюся по желудку, и легкой жаръ по всей кожѣ, которая дѣлается влажною и легко испаряется (прекрасный знакъ благопріятнаго дѣйствія хинной соли). Лучше всего давать хинную соль въ хорошей мадерѣ.

При недоспалкѣ хинной соли, что въ походѣ легко можетъ случиться, лучше всего употреблять хину въ порошокъ, смѣшавъ оную съ медомъ въ видѣ капли. Дѣйствительности разныхъ препаратовъ хины я не довѣряю: ибо каждый изъ нихъ, судя по способу приготовленія, не содержитъ въ себѣ столько существенной части хины.

*

Лѣченіе желчной перемежающейся лихорадки въ сущности не разнится отъ изложеннаго общаго лѣченія. Главное стараніе Врача должно состоять въ унятіи рвоты и въ предупрежденіи будущаго пароксизма. Перваго можно достигнуть употребленіемъ рвотнаго, если есть причина предполагать, что скопившаяся въ желудкѣ желчь еще не испражнена; кишечные же позывы на рвоту, зависящіе отъ одной раздражительности желудка, успокаиваются *Haustu carbonico Ph. Cast.*, *pulvere aëroforo Vogler*, преніемъ сердца *Linim. ammoniato cum ol. origani* и ш. д.; а послѣдняя цѣль достигается смѣлымъ употребленіемъ хинной соли, отъ котораго зависитъ успѣхъ лѣченія. По прекращеніи пароксизма, съ хинною солью, употребляемую теперь рѣже и въ меньшемъ количествѣ, можно попеременно давать разрѣшающія и легко слабятія лѣкарства.

При лѣченіи перемежающейся лихорадки, развившейся сердце, по возможности нужно стараться о сокращеніи пароксизма благотворнымъ употребленіемъ средствъ, оживляющихъ движеніе крови и омылающихъ ее къ поверхности гѣла. По приведеніи въ чувство

больного, выражающего теперь во всѣхъ своихъ движеніяхъ чрезвычайную слабость, безъ малѣйшаго замедленія нужно давать хинную соль, по 5 - 6 - 8 гранъ на пріемъ, такъ чтобы больной въ сушки принялъ оной до 30-ти гранъ и болѣе, уменьшая количество соли послѣ 3-4-го пріема и увеличивая оное за часъ до появленія пароксизма, опъ опроверженія коего зависить спасеніе больного.

Такимъ образомъ удалось мнѣ спасти двухъ больныхъ, находившихся въ семъ опасномъ положеніи и копорыхъ пошому почтиаю исхищенными изъ челюстей смерти.

Въ лѣченіи перемежающейся лихорадки мозга, кромѣ хинной соли, важное пособіе доставляютъ опводящіа средства: мушки и горчишники, при помощи коихъ иногда удаешся привести больного въ чувство, въ какомъ случаѣ, не теряя ни минуты, должно давать соль по 8 — 10 гранъ на пріемъ, чрезъ часъ или два, наблюдая припомъ, чтобы первый порошокъ былъ самый большой и уменьшая его по мѣрѣ прихода больного въ самовѣденіе. Повторяю, что опводящіа средства и хинную соль, если они

должны оказати желаемое дѣйствіе, нужно употребляти со всею дѣятельностію; горчишники должны покрывати всѣ ноги больного, а руки и запялокъ и остальную поверхность тѣла напирати нашатырнымъ спиртомъ съ настойкою шпанскихъ мухъ.

Не смотря на явное участіе крови въ послѣднихъ двухъ видахъ перемежающейся лихорадки, кровопусканіе не приноситъ никакой пользы: ибо раздраженіе сердца и мозга, не будучи воспалительнаго свойства, не умѣряется испражненіемъ крови, а можетъ успушить только специфическому своему пропитуядію и опиводящимъ его въ другое мѣсто средствамъ.

Какъ должны быти осторожны въ родѣ жизни и пищи выздоравливающіе послѣ перемежающейся лихорадки, которая легко возвращается и труднѣе излѣчивается въ послѣдствіи, всякому Врачу извѣстно.

Мое лѣченіе водянистыхъ накопленій послѣ перемежающейся лихорадки было довольно простое. Обыкновеннѣйшія изъ нихъ были: опёкъ ногъ, подкожная водяная и брюшная водяная болѣзни. Всѣ сіи виды, при внупреннемъ употребленіи мочетонныхъ (особенно

Digitalis purpur. с. supertartrate potassae въ большихъ приемахъ) и при наружномъ преніи частіей средствами, возвышающими дѣятельность всасывающихъ сосудовъ, иногда скорѣе, иногда медленнѣе проходили. Въ одномъ только случаѣ водяная брюшная болѣзнь непомѣрно и быспро увеличилась, не смотря на дѣятельнѣйшее лѣченіе, и больного я принужденъ былъ оставить во временномъ Бабадахскомъ госпиталѣ; исходъ его болѣзни мнѣ неизвѣстенъ.

Въ ошѣкъ ногъ превосходно дѣйствовало методическое увиваніе опухшихъ членовъ.

Въ заключеніе сей главы скажу нѣсколько словъ о многочисленности лихорадочныхъ больныхъ въ Южныхъ краяхъ Россіи и за Дунаемъ въ Болгаріи. Во время прохожденія полка чрезъ Польшу въ каждомъ селѣ находилъ я лихорадочныхъ больныхъ, копорые въ полковомъ лазаретѣ составляли, претью часть всего числа болящихъ; съ переходомъ полка въ Бессарабію и наконецъ за Дунай число оныхъ еще увеличилось. Во время споянія войскъ подъ Варною въ лазаретѣ находились больные только двухъ родовъ: съ кровавымъ поносомъ и перемежающеюся лихорад-

ною, и послѣдніе содержались къ первымъ какъ 3: 2 *). По приходѣ полка на зимнія квартиры въ Подольскую губернію, въ мѣстечко Соврани, я нашелъ множеству больныхъ съ застарѣлою перемежающеюся лихорадкою, кошурою, по словамъ жителей, дѣлalomъ спрадала почти половина обывателей. Такимъ образомъ наконецъ я повѣрилъ словамъ Г-на Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника *Вуткова*, что изъ 100 человекъ заболѣвающихъ въ Молдавіи и ея окрестностяхъ навѣрно 90 одержимы бывающею перемежающеюся лихорадкою.

*) Сіе содержаніе однако часто, смотря по погодѣ и времени года, измѣнялось и дѣлалось обратнымъ.

III.

НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ НАТУЖНЫМЪ (КРОВАВЫМЪ) ПОНОСОМЪ (Dysenterya).

Его же Я. Чаруковскаго.

До перехода войскъ черезъ Днѣспрь солдаты занемогали проспымъ поносомъ, и по весьма рѣдко. Въ прохожденіи полка по Бессарабіи началъ открываться натужный поносъ (опть копораго здѣсь, во все время похода, пошерялъ я перваго больнаго); по переходѣ войскъ черезъ Дунай кровавый поносъ началъ оказываться споль же часпо, какъ и перемежающаяся лихорадка. Двѣ сѣи болѣзни сполько и были видны въ полковыхъ лазаретахъ. Обыкновенные припадки натужнаго поноса были слѣдующіе:

Послѣ предварительнаго легкаго расспройсва пищеваренія, оказывавшагося уменьшеннымъ позывомъ на пищу, по временамъ горечью

во рту, легкою бѣлизною языка, лепучими болями въ брюхѣ, и особенно въ поясницѣ, испражненіе низомъ натуральное слѣдовало не въ опредѣленное время и обыкновенно раньше привычнаго (это особенно замѣтно было у людей, по привычкѣ испражняющихся упромъ). Припадокъ сей, будучи самъ по себѣ весьма незначителенъ, по большей части больнымъ не замѣчается, а Врачемъ легко приписывается неумѣренному употребленію фруктовъ, и особенно винограда. Испражненіе низомъ, кромѣ уклоненія отъ времени, дѣлается и чаще, но безъ всякой боли; испражняемая масса бываетъ немного жиже обыкновеннаго и изрѣдка блѣдно-вишневаго цвѣта, содержишь въ себѣ слизь студенистой густоты. Присемъ уже начинаешь оказываться какая-то тяжесть и полноша въ брюхѣ, съ напряженіемъ въ пахахъ *), позывъ на низъ дѣлается чаще, увеличивается боль въ поясницѣ, ворчаніе въ брюхѣ, испражненіе совершается съ жестокою напругою, испражне-

*) Припадокъ сей, легко впрочемъ объясняемый анапомическимъ раздѣленіемъ нервовъ брюшныхъ въ пахахъ и яичкахъ, проспираясь до сѣменнаго канатика, былъ почитаемъ нѣколыми Врачами за воспаленіе сего канатика.

мая матерія представляеть густую темно-пепельную слизь, подернушую часпо кровавыми полосками, а иногда испражняется чистая кровь въ больномъ количествѣ, къ явственному облегченію больного; позывъ на низъ, увеличиваясь, дѣлается наконецъ безпрерывнымъ, но, не смотря на всѣ усилія больного, ничего не испражняется. Усилившійся такимъ образомъ поносъ переходитъ въ настоящій запоръ. Отъ сильныхъ напряженныхъ болей при испражненіи низомъ происходитъ иногда сочувственная поноптоа и даже рвоша (причемъ положеніе больного бываетъ самое горестное) и оказывается явственная лихорадка; боль въ брюхѣ иногда возрастаетъ отъ напуги до того, что всякое прикосновеніе къ оному дѣлается чувствительнымъ для больного, котораго тягошитъ даже одѣяло. Къ сему иногда присоединяется попка неизъяснимая (признакъ распространенія болѣзни вверхъ по кишечному каналу) съ спазмодическимъ пульсомъ, блѣдностію лица и хладомъ конечностей.

Таковой ходъ напряжнаго поноса часпо бываетъ у людей крѣпкихъ и полнокровныхъ; у послѣднихъ, особенно спраждающихъ опкры-

тымъ потечуемъ, напущный поносъ оказывается въ настоящемъ своемъ видѣ. При мгновенно послѣдовавшемъ позывѣ на низъ испражняешься въ большомъ количествѣ чистая веназная кровь, иногда ссѣвшаяся въ куски; въ семъ случаѣ позывъ ощущается рѣже, безъ особенной боли, и болѣзнь не бываетъ такъ жестока, какъ въ первомъ; за то иногда кровопеченіе бываетъ сильное, даже до обморока, и стремительно подобно фонтану.

При паковомъ спаданіи брюха замѣчается измѣненіе въ ошправленіи кожи и распрорисво испарины часто предшесствуетъ кровавому поносу.

Иногда описываемая нами болѣзнь начинается подѣ видомъ желчной горячки. Послѣ сильной дрожи появляется спрашная рвопась жестокою головною болью и лихорадкою, къ копорой скоро присоединяется частое и жидкое испражненіе низомъ, переходящее наконецъ въ кровавый поносъ, вышѣсняющій въ послѣдствіи и слѣды желчной горячки.

Опасность кроваваго поноса опредѣляется степенью и мѣстомъ болѣзни. Пока раздраженіе ограничивается одною прямою киш-

кою, нѣтъ лихорадки и проч., поносъ неопасенъ. Обильная потеря крови нисколько неопасна, но даже полезна; усилившаяся же боль поясницы съ лихорадкою, чувствительность брюха при легчайшемъ прикосновеніи къ оному и напряженность живота, означающая переходъ раздраженія на тонкія кишки, опасны.

Опасность въ кровавомъ поносѣ возрастаетъ по мѣрѣ наклонности онаго перейти въ воспаление кишокъ.

Въ трупѣхъ кроваво-поносныхъ замѣчается необыкновенная припухлость и ополстѣніе стѣнъ прямой кишки, но гораздо чаще она находится спавшеюся и почернѣлою; помертвѣніе часто простирается и на тонкія кишки.

Существованіе кроваваго поноса въ Молдавіи и Болгаріи легко объясняется качествомъ жаркаго климата сихъ областей.

Извѣстно, что опривлечение кожи, усиленное возвышенною температурою во всякомъ климатѣ, находится въ антагонистическомъ отношеніи съ дѣйствіемъ брюха; при усиленномъ испареніи уменьшается и даже вовсе прекращается испражненіе низомъ и

опдѣленіе мочи, и обратно: умноженное опдѣленіе въ брюхѣ прекращаетъ оппращеніе кожи; появившійся поносъ оспанавливаетъ испарину и кожа дѣлается сухой, а оказавшаяся испарина прекращаетъ поносъ.

При сильномъ дневномъ жарѣ, восходившемъ иногда до 30-ти градусовъ Реом. терм., кожа солдапа, находящагося почти непрерывно на солнцѣ, возвышается въ своемъ дѣйствіи, и разогрѣтая лучами солнца, расслабляется въ своей связи (cohæzio), отъ чего кровь, привлекаемая жаромъ къ поверхности плѣла, накопляется въ кожѣ въ большемъ количествѣ, какъ это доказываетъ необыкновенная краснота оной, и человекъ находится въ непрерывномъ попу. Съ захожденіемъ солнца, а особливо по наступленіи ночи, появляющійся пронзительный сырой холодъ, поддерживаемый частію ниспадающею густою росой, а частію испареніемъ отъ земли, разгоряченной въ продолженіи дня лучами солнца. При таковой скоропоспѣжной перемѣнѣ температуры жара на холодъ оппращеніе кожи по необходимости должно уменьшаться въ своей силѣ; испарина прекращается, кровь, протекавшая днемъ въ излишество въ кожѣ (сжавшейся

теперь отъ сыраго холода), должна успрематься внутрь, и по антагонизму кожи съ кишками накапливается въ брыжеечныхъ и почечуйныхъ сосудахъ, а отъ сего происходитъ легкая дрожь, чувствуемая солдапомъ ночью и какая-то тяжесть въ брюхѣ. Накопленіе крови въ брюшныхъ внутренностяхъ, по ежедневно повторяющейся сказанной перемѣнѣ жара съ холодомъ, усиливается болѣе и болѣе. Организмъ, по своему закону самосохраненія, старается уничтожить полнокрое брюха (*plethora abdominalis*), усиливаетъ отправленіе кишекъ и производитъ поносъ. Первая капля крови, по словамъ Его Превосходительства Главнаго по арміи Медицинскаго Инспектора, вытекшая изъ задняго прохода, есть слѣдствіе благотворнаго стремленія натуры (*vis naturæ medicatricis*) избавиться отъ упомянутаго накопленія крови въ брюхѣ, но безъ помощи искусства она рѣдко достигаетъ своей цѣли.

Прямая кишка, будучи непрерывно раздражаема прилившеюся къ ней въ излишество кровью, распухаетъ и стѣнки ея плотно касаются другъ друга; происшедшее отъ сего чувство полноты и какъ бы присут-

співія кала, производить въ ней безпрестанное побужденіе къ испражненію, при которомъ однако, по удобопонятной причинѣ (опухлости прямой кишки), ничего не испражняется, и такимъ образомъ кровавый поносъ оказывающійся въ видѣ запора, каковымъ его солдаты часто и почипають, прося у Лѣкаря слабительнаго. Отъ непрерывнаго раздраженія прямая кишка приходитъ въ воспаленіе, легко сообщающееся и шонкимъ кишкамъ; присемъ опасность очевидна.

Изъ сказаннаго нами освойспвѣ поноса само по себѣ явспвуетъ лѣченіе онаго. Первое и важнѣйшее условіе въ Терапіи сей болѣзни есть уменьшеніе прилива крови къ кишкамъ, свободное испражненіе низомъ и возстановленіе испарины. Для выполненія перваго показанія главнѣйшее средство есть кровопусканіе, которое иногда мгновенно унимаетъ напугу и нѣжеснѣ брюха, прекращаетъ боли въ ономъ и даже производить испарину, особливо когда оно будетъ поддержано въ своемъ дѣйствіи другими приличными средствами. Кровопусканіе нужно иногда дѣлать нѣсколько разъ даже въ одинъ день, и чѣмъ болѣе испражняется крови низомъ и полнокровнѣе

больный, шѣмъ смѣле можно пускать кровь, даже до обморока. Я часпо имѣлъ удовольствіе слышать, какъ нѣкоторые больные, собственнымъ опытомъ наученные, просили меня пускать имъ кровь; не смотря на сильное изнеможеніе, по видимому, силъ, я пускать имъ кровь, и видѣлъ, какъ они поправлялись послѣ того.

Послѣ кровопусканія нужно дать больному слабительное; для чего приличнѣйшимъ считается *Oleum ricini*, по дороговизнѣ коего и трудности дѣлать на бивуакъ я обыкновенно давалъ своимъ больнымъ слабительное, по совѣту Г-на Главнаго по арміи Медицинскаго Инспектора (смотря его сочиненіе о болѣзняхъ, жаркому климату свойственныхъ); изъ сладкой рпуши съ ялапою; по окончаніи дѣйствія слабительнаго я прописывалъ чрезъ два часа по два грана *Calomel cum vaschago*. Для разрѣшенія и разведенія полнокровія брюшнаго и для отвлеченія крови къ поверхности шѣда и воспановленія испарины назначалъ пощогонныя средства, снаружки и внутрь. При сильной рѣзи въ проходѣ велѣлъ я спавить *cluzma amyli opiatum*, а при жестокихъ боляхъ въ брюхѣ *fomentatio*.

pes aromaticas посредствомъ сукояки, fricti-
ones linim. ammon. cum ol. orig. et camphora, и
больные, соблюдая приличную діету съ сли-
зистымъ пишемъ, выздоравливали довольно
скоро. Дѣйствія шакъ называемыхъ пропи-
санныхъ средствъ я не испытывалъ, но слы-
шалъ, съ какою похвалою описывающіся Врачи
о благошворномъ дѣйствіи въ кровавомъ по-
носе корня Columbo.

Люди, претерпѣвшіе кровавый поносъ во
всей его силѣ и обширности, трезвычайно
скоро полнѣютъ въ плѣхъ. Это особенно за-
мѣнилъ я надъ собою и у людей худощавыхъ.

Наблюденіе.

Фурманъ Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка
долго страдалъ кровавымъ поносомъ въ коман-
дѣ своей, не сказывался больнымъ и исправляя
между плѣхъ свою должностъ; но будучи дове-
денъ до крайности, онъ былъ принесенъ въ гос-
питаль; положеніе его было слѣдующее: ча-
стныя испражненія низомъ темнозеленою ма-
ссерією съ кровью, непрерывная напуга, напря-
женностъ брюха, судороги въ лицѣ при малѣй-
шемъ допрогиваніи къ оному, пошнота и по
временамъ рвога, пульсъ слабый, скорый, ча-

стые обмороки, хладъ конечностей, забывчивость и проч. Несмотря на опчаянное положение больного, я пустилъ ему кровь мѣрою до 3х, велѣлъ поспавить *clysma amyli oriatum*, брюхо припаривашъ и шерешъ мазью, внутрь давалъ *submur. hydrarg.*, и къ слѣдующему дню состояніе его здоровья примѣнно поправилось; въ припадкахъ, довольно еще опасныхъ, была замѣтна гармонія и явственнее прошиводѣйствіе натуры; продолжавшіеся еще признаки полнокровія и воспаления въ брюхѣ были доспапочнымъ показаніемъ къ повторенію кровопусканія, что и было сдѣлано. На слѣдующій день своего прибытія въ лазаретъ больной, довольно уже бодрый, убѣдительно просилъ у меня позволенія пустиши ему еще кровь, увѣряя, что онъ въ такомъ случаѣ будетъ къ завтрешнему дню совершенно здоровъ, въ чемъ однако, по мягкости и безболію живота, равно какъ и по мягкости пульса и по другимъ явственнымъ признакамъ послабленія бодрости, ему было опказано. По прошествіи двухъ недѣль furmanъ выздоровѣлъ, но вознагражденіе потеряннаго силъ послѣдовало медленно.

*

2007年12月10日 星期六

vi.

(Собирает Профессор А. Нелюбин)

BLIND COPY TO THE SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS

[illegible]

-Меланиксы и Дэви определяли съ большою
-точностью содержание ея основныхъ ча-

сией и предложили лучший способ приготовления соевой. До 1823 года употреблялась

они только на фабриках для бѣденія, по-
линья, пряпья и другихъ вещей, коня пѣ-

восторге. Врачи и совдповади уподобляли
ее вильсто Бертолеповой соеи, мнуирь и

спиритики. Въ 1823 году, съ подвѣшеніемъ не-
большаго сочиненія Аптекаря *Мабарака*,

Врачи обратили особое внимание на хлоридную соду и начали употреблять ее

спаружи съ большимъ успѣхомъ. Соль сія
нынѣ въ общемъ употребленіи и во всякомъ

случаѣ имѣють много преимуществъ передъ хлориновымъ кали, но дѣйствіемъ своимъ сходствуютъ съ хлориновою известью.

Приготовление хлориновой соды.

Аппаратъ, употребляемый для составленія хлориновой соды, есть почти же самый, который служишь для приготовления хлориновой извести (см. В. М. Ж. часть VII. N 3. 1826 года).

На сей конецъ надлежишь взять: поваренной соли 4 фунта, марганцоваго окисла 4 1/2 фунта, сѣрной кислоты 4 фунта и 9 унцій, рѣчной воды 3 фунта и 9 унцій. Поваренная соль и марганецъ спираются въ порошокъ, перемѣшиваются между собою и высыпаятся въ баллонъ, который плотно запыкается пробкою. Черезъ пробку проходятъ искривленная лейка и соединительная трубка, коей длинное плечико проводится также черезъ отверстіе пробки въ первый сосудъ, наполненный до половины чистою водою для поглощенія соляной кислоты. Второй сосудъ съ премою горлами наполняется смѣсью (*Liquor subcarbonatis sodae*), состоящею изъ 2 1/2 фунтовъ углекислой соды, соединенной

са 5-ю фунтами воды; послѣдній сосудъ наполняется ою же смѣсью, только меньшимъ количествомъ прошиву втораго. Сія сосуды соединяются помощію трубокъ такъ, чтобы длинное плечико ихъ опускалось въ растворъ соды почти до самаго дна. Смычки сего аппарата обмазываются глиною съ масломъ и по совершенномъ высохнушіи обмазки предпринимаются насыщеніе соды хлориномъ. По приведеніи снаряда въ надлежащій порядокъ, сѣрная кислота, предварительно соединенная съ водою, вливается помощію искривленной лейки въ баллонъ и останавливается до совершеннаго прекращенія кипѣнія въ ономъ. Пошомъ баллонъ слегка подогрѣвается и доводится до 80° Р. ш.; шепдла сія поддерживается до тѣхъ поръ, пока отдѣленіе газа совершенно прекратится. По окончаніи сей операціи растворъ хлоридной соды, находящійся въ 2-хъ послѣднихъ спиклянкахъ, испытывается индиговою жидкостію (составленною изъ одной части индиго, 6-ти частей крѣпкой сѣрной кислоты и 993-хъ частей воды), которая должна лишиться голубаго своего цвѣта. Если растворъ окажется несовершенно насыщеннымъ,

то надлежитъ еще пропускать чрезъ оный хлориновый газъ, сколько будетъ нужно. Для оповращенія разгоряченія сосудовъ спаваятся они въ холодную воду, а для свободнаго отдѣленія углекислаго газа открываея одно отверстіе послѣдней спиклянки во время насыщенія соды газомъ.

При неимѣніи вышеописаннаго аппарата слѣдуетъ брать пубулатную или простую зеленого стекла реторту и шаковый же пріемникъ. Реторта наполняется смѣсью вышеприведенныхъ ингредіенцій, а пріемникъ растворомъ углекислой соды. Реторта соединяется съ длинною стекляною трубкою, проводимою до дна пріемника, содержащаго растворъ соды. Попомъ реторта исподоволь подогревается и отдѣляющійся хлоринъ, проходя чрезъ растворъ соды, насыщаетъ ея. Полученный какъ шѣмъ, такъ и другимъ способомъ растворъ хлориновой соды называется *Solutio chloreti sodae fortior* и служитъ для внушрняго и наружнаго лечебнаго употребленія.

Для приготоовленія хлориновой соды въ кристаллахъ надлежитъ оный растворъ процѣдить, влить въ просиранныя фаянсовыя

чашки и поставивъ въ теплое мѣсто для испаренія излишней воды, а потомъ высушить на холодъ для кристаллизованія соли.

Качества.

Хлориновая сода: 1) кристаллизуется ромбами и 4-хъ споронными таблицами; 2) имѣетъ бѣлый цвѣтъ; 3) кристаллы на воздухѣ мало перемѣняющся; 4) вкусъ имѣетъ охлаждающій, нѣсколько острый; 5) растворяется въ 3-хъ частяхъ холодной и въ нѣсколько мѣньшемъ количествѣ кипячей воды; 6) въ жару плавится и, будучи доведена до каленія, отдѣляетъ чистѣйшій кислородный газъ; 7) съ фосфоромъ, сѣрою и углемъ отъ тренія и удара вспыхиваетъ и загорается; 8) съ крѣпкою сѣрою кислотою производитъ вспышку или выпрыскъ, съ слабою же кислотою въ теплотѣ происходитъ отдѣленіе хлорина; 9) по изслѣдованію *Шеневикса*, 100 частей хлориновой соды въ кристаллахъ состоятъ изъ 29, 6 частей соды, 66, 2 хлорина и 4, 2 воды.

Динамическое дѣйствіе.

Дѣйствіе сей соли зависитъ отъ содержанія хлорина. Она дѣйствуетъ на раздра-

жизтельную систему и уменьшаетъ ея дѣятельность. Болѣе всего оказываетъ она дѣйствіе свое на мочевые пути, кожу, лимфатическую систему и систему желѣзъ. Хлоридная сода перемѣняетъ смѣсь крови и возвышаетъ ея красный цвѣтъ. Она, дѣйствуя на репродуктивную систему, замедляетъ ея растительный процессъ (vegetatio). Кромѣ сего динамическаго дѣйствія, одарена она въ высшей степени дѣйствіемъ химическимъ. Подобно чистому хлорину, вступаетъ она въ химическое соединеніе съ водою и всѣми его безчисленными соединеніями, образующимися во время разложенія (особливо гніенія) органическихъ шѣлъ и составляющими мѣзму. Она окисляетъ безорудныя, равно какъ и органическія шѣла, и совершенно перемѣняетъ ихъ составъ. На семъ химическомъ ея свойствѣ основано уничтоженіе цвѣтловъ въ прозяблемыхъ шѣлахъ, бѣленіе различныхъ матерій и много-различное технологическое употребленіе. Хлоридная сода разрушаетъ совершенно вредныя испаренія, уничтожаетъ смрадныя ихъ запахи и преграждаетъ дальнѣйшее гніеніе органическихъ шѣлъ. Она исключительно раз-

рушаетъ септичскіе яды, на чемъ и основано ея предохранительное употребленіе въ прилипчивыхъ болѣзняхъ, какъ шо: чумѣ, нѣкошорыхъ болѣзняхъ эпизотическихъ, прилипчивыхъ сыпяхъ и многихъ другихъ недуговъ.

Болѣзни.

По сходству дѣйствія сего лѣкарства съ хлоридною извѣстною предписывается оно въ тѣхъ же самыхъ болѣзняхъ, въ коихъ употребляется оная соль. Если Врачъ признаетъ необходимо нужнымъ употребить внутрь хлоридныя соли, шо хлоридная сода признается лучшею въ семъ случаѣ предъ другими.

Цынготная болѣзнь, золошуха, болѣзнь венерическая, сопряженная съ золошухою либо цынгою, супъ тѣ недуги, въ коихъ соль сія оказалась полезнаю (Zima, Fertiar, Cazenave).

Съ нѣкошорымъ вѣроятіемъ должно полагать, что соль сія можетъ принести значительную пользу также въ слѣдующихъ болѣзняхъ: въ дѣтской сухощѣ, водобоязни, узловатой чахощѣ, въ нервныхъ боляхъ (Neuralgia), въ острыхъ прилипчивыхъ сыпяхъ (Erythematosa febrilis), въ прилипчивыхъ

горячкахъ, какъ то: чумѣ, гнилой съ пятнами, лазаретной, желшой Американской и другихъ; въ желчномъ, простомъ и кровавомъ поносѣ и наконецъ въ санѣ лошадей.

Опносительно предохраненія отъ чумы и наконецъ самаго лѣченія сей болѣзни мы имѣемъ весьма благопріятное извѣстіе отъ Г-на *Лессепса* (Lézeurs), Французскаго Консула въ Алеппо, объ опличномъ дѣйствіи хлориновыхъ солей (хлориновой извести и соды), предложенныхъ *Лабаракомъ*. Надлежитъ ожидать дальнѣйшихъ наблюденій и опытовъ Врачей надъ сими средствами и подтвержденія справедливости сообщеннаго Г-мъ *Лессепсомъ* извѣстія.

Наружное употребленіе хлориновой соды.

Врачи болѣе всего замѣтили опличное дѣйствіе сего лѣкарства въ болѣзняхъ наружныхъ, какъ то: въ язвахъ цынготныхъ, венерическихъ, застарѣлыхъ, гнойныхъ, съ слабостію частей сопряженныхъ и расположенныхъ къ переходу въ антоновъ огонь; въ хроническихъ накожныхъ сыпяхъ, особливо въ паршахъ на головѣ, лишаихъ и чесоткѣ. Въ цынготной опухоли десень, въ молочницѣ,

въ жабѣхъ глопки съ омертвѣніемъ частей, въ фиспулахъ и гнойныхъ ходахъ лѣкарспво сіе оказало удивительное дѣйспвіе (Bielt, Jules Cloquet, Cazenave, Heilberg). Въ ко-
стоѣдѣхъ носовыхъ костей, въ разспроеніи
десенъ, въ жабѣхъ съ аншоновымъ огнемъ, опъ
крыпомъ ракъ, нагноеніи въ мочевоомъ пу-
зырѣ, огненномъ вередѣ, въ госпиціальномъ
аншоновомъ огнѣ, карбункулахъ и другихъ
многихъ болѣзняхъ Врачи видѣли опъ сего
лѣкарспва хорошій успѣхъ (Marjolin, San-
son, Lefevre, Lagneau, Regnard, Chantourelle,
Segalas),

*Предохранительное употребленіе хлорино-
вой соды отъ прилипливости животныхъ
ядовъ (Contagium) и очищеніе оною воздуха
отъ заразы (Miasma).*

Чума (Pestis Orientalis). Смертоносное
дѣйспвіе чумной заразы и гибельныя опусто-
шенія народа цѣлыхъ спранъ, свершившіяся
за нѣскольکو предъ симъ сполѣдій, побуди-
ли къ изысканію средствъ, служащихъ къ
успраненію сего зла и предохраненію опъ
зараженія симъ ядомъ. Всѣ спаранія древ-
нихъ Врачей, равно какъ и средникъ вѣковъ,

въ снисканіи вѣрныхъ средствъ пропиву зараженія чумою оспались пищенными. Между безчисленными запасомъ средствъ, предложенныхъ пропиву чумной заразы, безъ сомнѣнія, первое занимаютъ и всѣмъ яснымъ куренію и въ особенностяхъ куренія хлорнымъ по способу *Гитона-Морво*.

Для предохраненія людей отъ зараженія чумою въ норвѣйское время начали употреблять жидкій хлоръ и растворы хлорноватыхъ солей, изъ коихъ наиболее оказались дѣйствительными хлорноватая известь и хлорноватая сода. Предохранительное дѣйствіе сихъ солей отъ чумной заразы, безъ сомнѣнія, основывается на разложеніи септического яда хлорномъ, въ сихъ соляхъ содержащимся, подобно окуриванію хлорновыми парами неодушевленныхъ веществъ.

Для предохраненія людей отъ чумной заразы надлежитъ производить два или три раза въ сутки обновленіе всей поверхности тѣла, не исключая и лица, растворомъ хлоридной извести или хлоридной соды. Для сего слѣдуетъ брать одну часть хлоридной извести, либо вмѣсто оной такое же количество хлоридной соды и отъ 80 до 100

частней рѣчной воды. Растворъ продѣживается сквозь дырку, вдвое сложенную и онымъ намачивается холстинка или гречкая губка, кою производися обмываніе лица и втираніе раствора досука. Обмываніе различныхъ вещей и самого бѣлья производися растворомъ, составленнымъ изъ одной части хлориновой соды или хлориновой извести и 120-ти частей воды, который употребляется также и для очищенія воздуха въ больничныхъ комнатахъ. Для очищенія воздуха должно соединять хлориную известь и хлориную соду съ равнымъ количествомъ квасцовъ и предписаннымъ количествомъ воды.

Если въспомо сихъ растворовъ признаешь нужнымъ жидкій хлоринъ (*Aqua chlorinica*), то свѣдуешь къ крѣпкому раствору хлориновой извести (*Solutio chlorureti calcis fortior*) прибавить $\frac{1}{20}$ долю сѣрной кислоты или на одинъ фунтъ онаго раствора 4 драхмы сѣрной кислоты. Смѣсь сія сильно взбалтывается и спавишся покойно для опредѣленія сѣрнокислой извести. Прозрачная жидкость, слишая съ осадка, доставляетъ крѣпкую хлориную воду, употребляемую какъ предохранительное средство

пропиву чумы, для обмыванія шѣла и другихъ вещей, равно какъ и для окуриванія самыхъ комнатъ.

Водоболзнь (Hydrophobia). Для предохраненія водоболзни, послѣ укушенія бѣшенными животными, раны больного, послѣ поставленныя кровососныхъ банокъ, обмываются растворомъ хлориновой соды и перевязываются три раза въ сутки.

Для предохраненія отъ прилипчивости венерическаго яда (*Contagium syphiliticum*) и совершеннаго разрѣшенія онаго обмываются и перевязываются венерическія язвы симъ же растворомъ.

Обмываніе рукъ растворомъ хлориновой соды предохраняетъ отъ зараженія чесоточною и лишайною матеріею людей, имѣющихъ хожденіе за пачковыми больными.

Медицинско-Полицейское употребленіе хлориновой соды.

Кромѣ обмыванія всей поверхности шѣла и самаго бѣлья и многоразличныхъ вещей при чумной заразѣ хлориновымъ растворомъ, оный употребляется также и при другихъ прилипчивыхъ болѣзняхъ, наипаче для окуриванія

больничныхъ комнатъ, особливо въ пѣхъ отдѣленіяхъ, гдѣ помѣщаются больные съ цынготными язвами, съ аншоновымъ огнемъ, либо одержимые кровавымъ поносомъ, гнилою горячкою, чесоткою, непроизвольнымъ теченіемъ мочи и многими другими болѣзнями. Кромѣ сего хлориновая сода можетъ быть употребляема во всѣхъ пѣхъ случаяхъ, гдѣ предлагается употребленіе хлориновой извести.

Пріемъ и формы лѣкарствъ, приготовляемыхъ изъ хлориновой соды.

Хлориновая сода не употребляется въ сухомъ видѣ, но предписывается обыкновенно въ растворѣ различной крѣпости.

Растворъ хлориновой соды. крѣпкій.

(Solutio chlorureti sodae fortior).

Rp. Chlorureti sodae crystallisati

partem unam,

Solve in

Aquae communis partibus decem.

Filtretur per chartam bibulam

et servetur loco umbrato frigidoque

in vitro bene obturato.

Растворъ сей дается внутрь и служитъ также для приговоянія снаружи употребляемыхъ лѣкарствъ. Въ цынгошной и другихъ вышеприведенныхъ болѣзняхъ предписывается сначала по 30-ти капель 4 раза въ день въ отварѣ солода. Приѣмъ сей можно постепенно увеличивать до 60-ти и болѣе капель и давать 4 либо 5 разъ въ день.

Растворъ хлориновой соды слабый.

(Solutio chlorureti sodae diluta).

Rp. Solutionis chlorureti sodae fortioris
partem unam,

Aquae communis partes decem.

Слабый растворъ хлориновой соды употребляется въ язвахъ, англоновомъ огнѣ, лишаяхъ, чесоткѣ, паршахъ на головѣ и другихъ вышеприведенныхъ болѣзняхъ. Корпейныя связки, намоченныя сею жидкостію, прикладываются на язвы, утромъ и вечеромъ, что продолжается до тѣхъ поръ, пока онѣ сдѣлаются совершенно чистыми; тогда примочка сія замѣняется приличными мазями.

Растворъ сей также можетъ быть употребляемъ для впрыскиванія, обмыванія ранъ и всей поверхности кожи въ вышеисчислен-

ныхъ случаяхъ; сверхъ сего, соединенный съ сѣрною кислотою либо квасцами, служить онъ для очищенія воздуха, на каковый конецъ спрыскивается онымъ полъ два и три раза въ день.

V.

С М Ъ С Ъ.

1. Средство для открытія мышьяка.

Приготовленіе. Въ унціи перегнанной воды растворяется драхма (Quentchen) селитроокислаго серебра. По совершенномъ раствореніи прибавляется довольно большое количество чистаго амміака, дабы осадить окисель серебра. Когда осажденіе кончилось, то опять прибавляется амміакъ по каплямъ, остерегаясь, чшобы его не прибавишь болѣе, какъ сколько нужно для того, дабы осадившійся окисель опять растворился. Осторожнось сія пѣшь болѣе нужна, чшо мышьяко-кислое серебро растворяется въ амміакѣ. Вшорой растворъ серебрянаго окисла процѣживается и сберегается въ спклянкѣ, закупоренной наждакомъ (Schmergel).

Употребленіе. При употребленіи вышесказаннаго способомъ приготовленнаго раствора берется, посредствомъ стеклянной пробочки, одна капля онаго и кладется на клееную бумагу и въ то же время берется капля испытуемой жидкости такимъ же способомъ, и обѣ капли соединяются, чрезъ согнутіе бумаги, въ складку. Если въ испытуемой жидкости есть хотя нѣсколько атомовъ мышьяковой кислоты, то жидкость тотчасъ пожелтѣетъ и произойдетъ маленькій осадокъ, состоящій изъ мышьяковой кислоты и серебра. Осадокъ сей бываетъ краснато желтаго цвѣта; онъ свѣта не чернѣетъ, но только перемѣняется въ бурый. Если осадокъ будетъ произведенъ фосфоромъ солью, то желтый цвѣтъ онъ вліянія свѣта тотчасъ переходитъ въ черный. Поелику осадокъ, состоящій изъ серебра и мышьяка, бываетъ очень обильный и описанное здѣсь противодѣйствующее средство весьма чувствительно: то помощью его легко удостовѣриться въ присутствіи мышьяка. Если испытуемая жидкость содержитъ соляную кислоту, то нужно ее отдѣлить селитрокис-

дою солью и осадокъ подвергнуть дѣйствию селипрной кислоты. Селипрокислая жидкость, опдѣленная и испаренная, можетъ служить для изслѣдованія.

Г. Гюле употребляетъ такимъ образомъ сѣрноокислую амміачную мѣдь (*sulphas cupri et ammoniæ*), которую онъ приготавливаетъ слѣдующимъ способомъ:

Сѣрноокислая мѣдь осаждается чистымъ амміакомъ, который потомъ еще прибавляется, дабы часть осадка опять растворилась. Жидкость процеживается и собирается въ закупоренной наждакомъ сплѣткѣ.

Осадокъ, произведенный сѣрноокисло-амміачною мѣдью, по способу Г-на Гюле, бываетъ правнаго зеленого цвѣта, а произведенный фосфорокислою солью голубой.

По опытамъ Г-на Гюле и нашимъ, сѣрноокисло-амміачная мѣдь не такъ чувствительна, какъ растворъ, приготовленный изъ селипрокислаго серебра и амміака.

А. Шевалье.

Notizen v. Froriep. Bd. xviii. стр. 81.

2. *Дѣйствіе зеленого чаю.*

В. Ньюгемъ (Newnham), въ Англіи, весною и лѣтомъ 1820 года спрдалъ возвышенною дѣятельностію головныхъ артерій. Два раза была ему пущена кровь въ значительномъ количествѣ, нѣсколько разъ припускали пиявки и вообще было употреблено какъ медицинское, такъ и діететическое противовоспалительное лѣченіе. Средства сіи только облегчали, а совсѣмъ не уничтожали мучительной боли головы, біенія сонныхъ артерій и проч. Впрочемъ болѣзнь появилась не вдругъ, но поспешенно, и только значительно усилилась отъ непомѣрнаго занятія науками, и какъ Г. Ньюгемъ уже прежде, при менѣе жестокой боли головы, получалъ облегченіе отъ употребленія зеленого чаю, то онъ наконецъ рѣшился и теперь испытать сіе средство. Боль была самая жестокая въ то время, когда Г. Ньюгемъ употребилъ оное въ первый разъ, и „я, говоритъ онъ, никогда не забуду его дѣйствія. Чай былъ сдѣланъ очень крѣпкій; выпивши онаго, я скоро почувствовалъ облегченіе боли головы и въ нѣкое время былъ приведенъ въ весьма пріятное состояніе. Я сдѣался свѣжъ и бодръ;

но не могу сказать, происходила ли сія веселость отъ облегченія моего спираданія, или отъ того, что я нашелъ средство, коимъ могу отъ него избавляться, или же это было непосредственное дѣйствіе чаю на мозгъ.“

Но вскорѣ за симъ облегченіемъ боли послѣдовали разныя непріятныя ощущенія: почти несносное спѣсненіе въ предсердіи, препешаніе сердца, дрожаніе всего тѣла и особенное, неизъяснимое спѣсненіе въ груди. Это однако не успрашило Г-на *Нюнгала*, и онъ увѣрялъ окружающихъ его пріятелей, что ни за что не согласился бы перемѣнить теперешняго своего состоянія на прежнее. Волненіе мало помалу успокоилось, и Г. *Нюнгаль* спалъ слѣдующую ночь гораздо покойнѣе, нежели прежде. Въ продолженіе нѣкошораго времени онъ долженъ былъ ежедневно прибѣгать къ сему средству. Дѣйствіе всегда было одинаково, только слѣдовавшія за тѣмъ спѣсненіе и споска не такъ сильны были Г-ну. *Нюнгалу* казалось, что чай дѣйствовалъ сперва на мозгъ и что дѣйствіе его на центръ кровеносной системы было вторичное, какъ бы слѣдствіе перваго дѣйствія.

Избавившись своей болѣзні, которая въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ совсѣмъ не появлялась, Г. *Нюнгалиъ*, дабы узнать дѣйствіе зеленого чаю въ здоровомъ состояніи, началъ употреблять оный вмѣстѣ обыкновеннаго всякой вечеръ въ 9 часовъ. Обыкновенно послѣ того слѣдовало небольшое спѣшеніе въ груди и бессонница ночью; но если мозгъ вечеромъ былъ возбужденъ болѣе обыкновеннаго занимательнымъ разговоромъ либо важнымъ продолжительнымъ размышленіемъ, то непріятнаго онаго ощущенія не было и сонъ былъ очень спокойный.

Желая еще болѣе удостовѣриться въ дѣйствіи зеленого чаю на здоровыхъ, Г. *Нюнгалиъ* вознамѣрился сдѣлать опытъ надъ двумя своими пищикомъ *Картеромъ* и *Нихолсономъ*, не объявляя имъ того.

Каждый изъ нихъ выпилъ по спакану крѣпкаго чаю. Пульсъ *Картера* пошчасъ сдѣлался скорѣе, но спустя немного времени, число ударовъ онаго уменьшилось пропивъ обыкновеннаго; при этомъ біеніе артерій было неправильное и перемежающееся. Онъ чувствовалъ въ себѣ болѣе силъ; но сіе возбужденіе было кратковременное: скоро по-

являлось изнеможение, стѣсненіе въ груди, прерываніе сердца, небольшая тошнота, дрожаніе членовъ, чувство слабости, ноги будто бы подгибались. Сими простыми и безъ всякаго предубѣжденія сдѣланнымъ наблюденіемъ подтверждается мнѣніе *Г-на Ньюгала*, что зеленый чай дѣйствуетъ преимущественно на нервную систему, а чрезъ нее и на прочія оппавленія животнаго организма.

Свойство сего чая успокаивать необыкновенно возвышенную дѣятельность сосудовъ головы обнаружилось еще въспышеніе у *Нихольсона*. Почти за часъ до опыта, о которомъ онъ совсѣмъ не зналъ, выпилъ онъ нѣсколько Единбургскаго элю (крѣпкаго пива). Пульсъ его былъ полный, крѣпкій, 92; вскорѣ послѣ выпитія чаю онъ упалъ до 84-хъ и даже до 80-ти ударовъ, между тѣмъ онъ чувствовалъ большое удовольствіе и бодрость. *Нихольсонъ* охотно согласился повторить сей опытъ; но какъ на сей разъ предъ чаемъ онъ не пилъ элю, то хотя скорость жлобленія и уменьшилась и оно сдѣлалось слабо и неправильно, однако *Нихольсонъ* чувствовалъ нѣкоторое сердечное безпокой-

ство и слабость съ дрожаніемъ всего тѣла, отъ чего онъ нѣсколько часовъ былъ довольно нездоровъ и только къ вечеру поправился совершенно.

Послѣ сего *Нихольсонъ* еще нѣсколько разъ пилъ вечеромъ зеленый чай и всякой разъ поутру жаловался на худой беспокойный сонъ. Если же послѣ чашки зеленого чаю выпивалъ онъ немного вина или пива, то спалъ спокойно и не имѣлъ никакого непріятнаго чувствованія.

Notizen von Froriep. Bd. xvii, стр. 58.

3. *Употребленіе сѣрнокислой мѣди при воспаленіи наружныхъ оболочекъ глазъ.*

Я (кпо? не сказано) давно уже имѣлъ обыкновеніе при нѣкоторыхъ видахъ хроническаго воспаленія прикладывавать сѣрнокислую мѣдь въ существѣ (in substantia) къ соединительной оболочкѣ, и полагая, что острое, равно какъ и хроническое воспаленіе преимущественно состоитъ въ разслабленіи волосныхъ сосудовъ, рѣшился употребить сіе раздражающее средство такимъ же способомъ и въ остромъ періодѣ даже сильнѣй-

днихъ воспаленій соединительной роговой и прозрачной оболочки.

Способъ упоиреблять сіе средство со-
стоитъ въ легкомъ при или чепырекрап-
номъ проведеніи кристалла сѣрникойсой мѣди
по вывороченному нижнему вѣку; послѣ сего
вѣко опять закрывается и слезы скоро рас-
пространяють соль по всему главному яблоку.

Слѣдующая за шѣмъ боль обыкновенно
прекращается чрезъ нѣсколько минушь; если
же она оспається долѣе, то можно ее облег-
чить примочками изъ теплой воды, либо ча-
стымъ опскрываніемъ вѣкъ для доставленія
слезамъ свободнаго выхода, которыя, будучи
задержаны, причиняють чувство сильнаго
жженія. Въ немногихъ случаяхъ сіи способы
не доставляли облегченія; тогда вкапываніе
на соединительную оболочку теплаго молока
или масла мгновенно уничтожило боль.

Во многихъ случаяхъ шончасъ по при-
ложеніи соли можно видѣть, какъ сосуды
сокращаются и промежутки между ними спа-
ваются блѣднѣе; чаще однако послѣ шого
появляется шихо увеличивающаяся краснота,
которая у дѣшей оиъ шренія глазъ бы-
раетъ еще болѣе, но чрезъ нѣсколько ча-

совъ она исчезаетъ и сосудцы сжимаются поспешенно. Боль, сопровождавшая воспаленіе, утихаетъ, глазъ поспешенно начинаетъ переносить свѣтъ и на другой день можно замѣтить явное поправленіе. Если раздраженіе, произведенное воспаленіемъ, было слабо, то употребленіе сего средства можно повторить на другой день; въ противномъ случаѣ его должно употреблять черезъ день.

При гноящемся воспаленіи я часто видѣлъ отъ него величайшую пользу у дѣтей и у взрослыхъ, во всѣхъ періодахъ болѣзни. Употребленное въ началѣ воспаленія средство сіе часто прерываетъ дальнѣйшее развитіе онаго; въ позднѣйшемъ періодѣ, если поспѣетъ не уничтожаетъ болѣзни, то по крайней мѣрѣ, сколько я замѣтилъ, уменьшаетъ ея жестокость и дѣлаетъ ходъ ея легкимъ и безопаснымъ. Употребивъ сѣрноокислую мѣдь, прежде нежели пошепнется прозрачная оболочка или появятся измѣненія, показывающія начало помершвѣнія, мѣдь кажется, можно навѣрно опровергнуть настоящее помершвѣніе. Но и за появленіемъ признаковъ помершвѣлаго измѣненія можно ее употребить съ пользою; во многихъ случаяхъ помершвѣ-

ніе опть того оспановишся въ верхнихъ сло-
 хъ прозрачной оболочки и опврашишся оп-
 крытіе передней камеры глаза. Другая выго-
 да, доставляемая симъ способомъ лѣченія при
 гноящемся воспаленіи, состоитъ въ томъ,
 что чрезъ него можно опврашнить шерохо-
 ватость вѣкъ (*granulationes*). Соль сія ока-
 зываетъ равную пользу въ воспаленіяхъ, про-
 исшедшихъ какъ опть проспуды, такъ и опть
 наружныхъ раздраженій или насилій. Она
 также многократно оказалась весьма полез-
 ною при различныхъ болѣзненныхъ состо-
 яніяхъ прозрачной оболочки, на прим: если
 при язвахъ оной, особливо при оспрыхъ яз-
 вахъ на краю сей оболочки, появились уже
 въ ней кровеносные сосудцы; также при
 глубокопронизавшихъ язвахъ сей оболочки,
 когда внутренняя ея пластинка была выдав-
 ливаема водяною влагою. Только въ одномъ
 случаѣ, при выпаденіи радужной оболочки,
 опть употребленія соли воспослѣдовало силь-
 ное раздраженіе и воспаленіе усилилось.

Но средство сіе, само по себѣ, полезно
 только въ простыхъ случаяхъ, несопряжен-
 ныхъ съ хроническимъ разспрейшивомъ брюш-
 ныхъ внутренностей или другимъ общимъ

медугомъ. Въ пропивномъ случаѣ надлежитъ кромѣ того употреблять средства, наковому сопряженію соопвѣстивующія. Впрочемъ и при сопряженныхъ воспаленіяхъ мѣстное употребленіе сѣрноокислой мѣди имѣетъ рѣшительную, хотя временную, пользу, ограничивая воспаленіе, уменьшая чувствительность глазъ къ свѣту и доставляя по крайней мѣрѣ нѣкоторое успокоеніе для принятія другихъ лѣкарствъ.

Желая испытать дѣйствіе сѣрноокислой мѣди на воспаленіе соединительной оболочки, я во многихъ случаяхъ употребляю ее одну, безъ всякихъ другихъ средствъ, и увѣрился изъ повѣренныхъ наблюденій, что употребленіе одной сѣрной кислоты часто можетъ быть достаточнымъ для уничтоженія боли.

Впрочемъ не должно думать, что я одобряю сѣрноокислую мѣдь, какъ единственное средство въ сказанныхъ случаяхъ. Она не воспрещаетъ употреблять цѣлки, успокоивающія, опивающія и другія средства. Я хочу только ввести ее въ число глазныхъ лѣкарствъ, какъ весьма дѣйствительное и полезное.

Съ особеннымъ удовольствіемъ могу я
привести здѣсь свидѣтельство моихъ пова-
рищей Гг. *Каса* и *Гарлика*, которые также
увѣрились на опытѣ въ дѣйствительности
сѣрнокислой мѣди при воспаленіяхъ наруж-
ныхъ оболочекъ глазъ. Г. *Гарликъ* между
прочимъ пишетъ ко мнѣ: „Я очень радъ, что
„могу подтвердить явственную пользу сѣр-
„нокислой мѣди при самыхъ острыхъ воспа-
„леніяхъ соединительной плевы въкъ.“

Notizen. v. Froriep. Bd. XX. стр. 30.

VI.

**ОФФИЦИАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО
МАРТА ПО 1-Е МАІЯ 1829 ГОДА.**

**1. *Определеіе Медицинскихъ Чиновииковъ
на высшія мѣста.***

Старшими Лѣкарями Штабъ - Лѣкари:
Сараповскаго пѣхотнаго полка Алейниковъ
въ 17-й Егерскій полкъ, Гренадерскаго Фельд-
маршала Графа Румянцова-Задунайскаго полка
Троицкій въ Аспраханскій Гренадерскій полкъ,
Ординапоръ Нарвской военной госпитали Ва-
довскій въ оную же госпиталь, 4-го Украин-
скаго Уланскаго полка Григоровичъ въ поше-
же полкъ, состоящій въ Опдѣльномъ Кавказ-
скомъ Корпусѣ сверхъ комплекта Лещинскій
въ Нижегородскій Драгунскій полкъ, Терскаго
Семейнаго Козачьяго войска Яроцкій въ 41-й
Егерскій полкъ; *Младшіе Лѣкари:* Галицкаго

пѣхотнаго полка Сокольскій въ сей же полкъ, Бѣлозерскаго пѣхотнаго полка Рудневъ въ Оловецкій пѣхотный полкъ, Лейбъ-Гвардіи Гродненскаго Гусарскаго полка Штабъ-Лѣкарь Коллежскій Ассесоръ Говоровъ Лейбъ-Гвардіи въ Уланскій Его Императорскаго Высочества Цесаревича полкъ.

2. *Вновь поступившіе въ службу.*

Вновь выпущенные изъ Московскаго Отдѣленія Императорской Медико-Хирургической Академіи: Лѣкари 1-го отдѣленія: Игнацій Яроцкій Лейбъ-Гвардіи въ Гренадерскій полкъ, Кирило Чикаревскій въ Тираспольскую военную госпиталь Ординаторомъ, Яковъ Архангельскій въ Уфимскій пѣхотный полкъ, Алексѣй Скрябинъ въ пѣхотный Герцога Веллингтона полкъ, Яковъ Черкасовъ и Филиппъ Спасскій въ резервныя войска 2-й арміи сверхъ комплекта, Авраамъ Плащевскій въ Волгскій Козачій полкъ, Николай Неждановъ въ Хоперскій Козачій полкъ, Оедоръ Юркевичъ въ Ошдѣльскій Кавказскій Корпусъ сверхъ комплекта. 2-го отдѣленія: Іосифъ Машковъ и Иванъ Нарциссовъ въ резервныя войска 2-й арміи сверхъ комплекта, Павелъ

Воскресенскій, Иванъ Гринихъ, Алексѣй Бронзовъ, Пётръ Боголюбовъ, Николай Герасимовъ, Порфирій Покровский, Михайло Тимковский, Сергѣй Фатѣевъ, Михайло Солярскій, Димитрій Чернявскій, Конспаншинъ Сабшинъ, Тимофей Добровольскій и Николай Ассиканусъ во 2-ю армию сверхъ комплекта; Николай Лебедевъ во Владикавказскій гарнизонный полкъ, Исая Архангельскій, Левъ Булгаковъ, Афанасій Пролопоповъ и Степанъ Сухомлиновъ въ Кавказскій Корпусъ сверхъ комплекта. 3-го *отдѣленія*: Пётръ Аксековъ въ Одесскую военную 4-шо класную госпиталь, Ардаліонъ Павловскій, Павелъ Веденскій, Іосифъ Шнейдеръ въ Одесскую 5-ши класную военную госпиталь, Алексѣй Корольковъ и Манвѣй Вознесенскій во 2-ю армию сверхъ комплекта; Иванъ Колодоловъ въ Моздокскую и Михайло Вишвенскій въ Георгіевскую военные госпитали Ординашорами. Кандидаты Медицины: Пётръ Орро, Павелъ Поповъ и Сергѣй Правдинъ въ Одесскую 5-ши класную госпиталь. *Изъ Императорскаго Московскаго Университета*: Докторъ Медицины Павелъ Бюровъ въ 3-й баталіонъ Пензенскаго пѣхотнаго полка, Лѣкари: 1-го *отдѣ-*

леніа: Парменъ Важенъ въ 44-й Егерскій полкъ, 2-го *отдѣленія*: Александръ Брюннеръ во 2-ю армию сверхъ комплекта, Иванъ Ивановъ во Владикавказскій гарнизонный полкъ, Пешръ Николаевъ въ Гребенское Семейное Козачье войско, Александръ Фрейшагъ въ Моздокскій гарнизонный баталіонъ; 3-го *отдѣленія*: Иванъ Киселевъ и Яковъ Кобылинъ въ Георгіевскую военную госпиталь Ординаторами. Изъ Казанскаго Университета Лѣкари 1-го *отдѣленія*: Василій Поповъ въ Казанскую военную госпиталь Ординапоромъ, Августъ Николай и Поликарпъ Засухинъ и 2-го *отдѣленія* Александръ Курниковъ въ Кавказскій Корпусъ сверхъ комплекта. Изъ Дерптскаго Университета: Докторы Медицины: Адольфъ Томасъ, Георгъ Барбашъ-де Марни, Генрихъ Глансдорфъ, Лѣкари: Вольдемаръ Даль, Карлъ Линдгрень и Вольдемаръ Гринцеръ во 2-ю армию сверхъ комплекта, Александръ Маіоръ, Юліусъ Лущеръ, Оппо Браше, Павелъ Голубевъ, Августъ Аккерманъ и Гуспавъ Гензингъ въ Одесскую 4-ю класную госпиталь Ординаторами. Изъ Харьковскаго Университета: Лѣкари 2-го *отдѣленія*: Петръ Сшаросвъш-

скій, 3-го отдѣленія Николай Сибиревъ и
 Василій Кириквичъ, 1-го отдѣленія Михай-
 ло Мишридаповъ, 2-го отдѣленія Корнелій
 Логиновъ и 3-го отдѣленія Алексѣй Поля-
 ковъ въ Одесскую 6-ти-классную военную гос-
 питаль, Ординаторомъ 1-го отдѣленія Алек-
 сандръ Елѣвскій въ 23-й, Иванъ Савичъ въ
 24-й Егерскіе полки, Трофимъ Мапшошенко,
 2-го отдѣленія, Оеловъ, Поповъ и Николай
 Марковъ во 2-ю армию сверхъ комплекта.
 Изъ Виленскаго Университета: Лѣкари 1-го
 отдѣленія: Казимиръ Добровольскій въ 3-й ба-
 таліонъ 37-го Егерскаго полка, Осипъ Штен-
 гельмайеръ въ 3-й баталіонъ Владикавказскаго
 пѣхотнаго полка, 2-го отдѣленія: Адамъ Бы-
 шевскій въ Ярославскій пѣхотный полкъ,
 Николай Наливайко въ Суздальскій пѣхот-
 ный полкъ, Устинъ Почоповичъ въ Бѣлев-
 скій пѣхотный полкъ, Амвросій Спирженскій
 въ 3-й баталіонъ 27-го Егерскаго полка; 3-го
 отдѣленія: Юліанъ Модзелевскій въ Рязан-
 скій пѣхотный полкъ, Василій Ниниоровичъ
 въ 3-й баталіонъ 28-го Егерскаго полка,
 Осипъ Рукуйжа въ 26-й Егерскій полкъ,
 Іонъ Закржевскій въ Болградскую военно-
 временную госпиталь Ординаторомъ Изъ от-

Льварь Иванъ Пенсбергъ въ Минскую военную госпиталь Ординаторомъ, Штабъ-Льварь Мадворный Событникъ Россиславовъ въ Рижскую военную госпиталь Ординаторомъ, Штабъ-Льварь Петръ Барановскій въ Виленскій пехотный полкъ Младшимъ Льваремъ. Изъ *волеюопредѣляющихся*: Докторы Медицины: Терманъ Цуръ-Мюллеръ въ 2-й Кадетскій Корпусъ Младшимъ Льваремъ, Евстафій Паулидесъ въ Варшавскую Гвардейскую Военно-Россійскую Госпиталь Ординаторомъ, Льварь 2-го *отдѣленія* Алексѣй Крупшевъ въ Галицкій пехотный полкъ Младшимъ Льваремъ, Льварь 8-го *отдѣленія* Осипъ Виповитъ въ 2-й Морскій полкъ Младшимъ Льваремъ. Изъ *иностранныхъ* Докторовъ: Докторы Медицины: Петръ Амбъ, Фридрихъ Оптенгеймъ, Францъ Верле и Яковъ Чигахъ въ 2-ю армию Сверхъ комплекта.

3. *Целовленіе отъ службы:*

Состоящій во 2-й армии Сверхъ комплекта Докторы Медицины Таверже, 2-го Кадетскаго Корпуса Льварь Тиме, Ингерманландскаго Гусарскаго полка Льварь Ларионовъ и Ординаторъ Вобруйской военной госпитали

Штабъ-Лѣкаръ Сидоренко-Корошя, котораго Высочайше повелѣно не приниматьъ болѣе въ Военно-Медицинскую службу, если онъ будетъ вновь проситься.

4. Производства въ чины.

За выслугу лѣтъ произведены: въ *Статскіе Совѣтники Коллежскіе Совѣтники*: Корпусные Штабъ-Докторы: 1-го пѣхошнаго Корпуса Чорба, 2-го пѣхошнаго Корпуса Хододовичъ, 6-го пѣхошнаго Корпуса Ахматовъ, Личнскаго Опдѣльнаго Корпуса Киприановъ; Дивизионные Докторы: 7-й пѣхошной Дивизіи Лучинскій, 11-й пѣхошной Дивизіи Яновскій, 12-й пѣхошной Дивизіи Шарескій, 24-й пѣхошной Дивизіи Дроссардъ, 25-й пѣхошной Дивизіи Сиронинскій и 10-й пѣхошной Дивизіи Андреевскій; Старшіе Докторы военныхъ госпиталей: Тифлисской Прибыль, Херсонской Голованскій; Старшій Медикъ 3-й Гусарской Дивизіи Штабъ-Лѣкаръ Кочура; Старшіе Лѣкари военныхъ госпиталей: Каменецъ-Подольской Штабъ-Лѣкаръ Германовскій, Казанской Штабъ-Лѣкаръ Андреевскій, Могилевско-Бѣлорусской Докторъ Медицины Бидерманъ, Ораніенбаумской Штабъ-Лѣкаръ Аллеръ, Придворной госпитали Главнаго Шта-

ба Его Императорскаго Величества Штабъ-Лѣкаръ Крестовскій, 2-го Кадетскаго Корпуса Докторъ Медицины и Хирургіи Мерцъ, 14-го Егерскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Яновскій, Штабъ-Лѣкаръ 4-хъ подвижныхъ invalidныхъ ротъ, состоящихъ при Александровской Мануфактурѣ, Анжу, Штабъ-Лѣкаръ Охтенскаго порохового завода Соколовъ, Ординары военныхъ госпиталей: Рижской Штабъ-Лѣкаръ Корниловичъ, Смоленской Штабъ-Лѣкаръ Некрасовъ, Московской Штабъ-Лѣкаръ Масловичъ, Демьяновскій и Субботинъ, Тульчинской Штабъ-Лѣкаръ Вееинскій, Генераль-Штабъ-Докторъ войскъ, состоящихъ подъ начальствомъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича Докторъ Медицины и Хирургіи Кучковскій и Сполоначальникъ Медицинскаго Департамента Военнаго Министрства Штабъ-Лѣкаръ Таліевъ. Въ Коллежскіе Совѣтники Надворные Совѣтники: Дивизионные Докторы: 5-го резервнаго Кавалерійскаго Корпуса Штабъ-Лѣкаръ Шольцъ, 20-й пѣхотной Дивизіи Докторъ Шуллеръ, Бугской Уланской Дивизіи Штабъ-Лѣкаръ Гофманъ, Старшій Докторъ Динабургской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Ада-

мовичъ; Ординапоры военныхъ госпиталей: С. Петербургской сухопутной Докторъ Медицины Оршаво-Чижевскій, госпитали округа военного поселенія Гренадерскаго Наслѣднаго Принца Прусскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Крузе, Кіевской Штабъ-Лѣкаръ Хаборскій; Полковный Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Гродненскаго Гусарскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Эсперрейхеръ и Штабъ-Лѣкаръ Брянскаго Арсенала Кужелевичъ.

5. Производство въ чужныя званія.

Въ Докторы Медицины: Младшій Лѣкаръ 48-го Егерскаго полка Плещковскій и состоящій сверхъ комплекта во 2-й арміи Лѣкаръ Давь. *Въ Штабъ-Лѣкари:* Лубенскаго Гусарскаго полка Лѣкаръ Мамашенковъ, 3-го баталіона Екашеринбургскаго пѣхошнаго полка Лѣкаръ Бѣлицкій и Ординапоръ Ревельской военной госпитали Лѣкаръ Семеновъ. Въ Лѣкари 3-го *отдѣленія:* Ординапоръ Вознесенской военной госпитали Кандидатъ Медицины Молчановъ. *Въ Старшіе Ветеринарные Лѣкари:* Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго эскадрона Долговъ, Лейбъ-Гвардіи Конно-Егерскаго полка Юилевъ, Сибирскаго Уланскаго полка Пешникъ.

ко и 3-й Кирасирской Дивизии Мержевинины.
 Въ Ветеринарных Лѣкари Ветеринарный
 Помощникъ 1-го отдѣленія Спиродубовскаго
 Кирасирскаго полка Лодкинъ.

6. Награды.

По представленію Его Императорскаго
 Высочества Цесаревича Всемилостивѣйше
 награждены: Старшій Лѣкаръ Сум-
 ского Гусарскаго полка Коллежскій Ассесоръ
 Галышусъ орденомъ Св. Анны 3-й степени;
 Старшій Медикъ 1-й Гусарской Дивизіи
 Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Шполь-
 манъ одновременно 900 рублями; Стар-
 шій Лѣкаръ 49-го Егерскаго полка Надвор-
 ный Совѣтникъ Бирмбаумъ подаркомъ въ 500
 рублей; Уланскихъ полковъ: Волынскаго
 Штабъ - Лѣкарю Чернявскому и Липовскаго
 Доктору Медицины Опшо объявлено *Высо-*
чайшее благоволеніе. По засвидѣтельствованію
 Начальства объ отличномъ усердіи къ
 службѣ Всемилостивѣйше награждены ти-
 номъ Коллежскаго Ассесора Штабъ-Лѣкари:
 Конно-Артиллерійской № 1-го роты Григори-
 вичъ и Лейбъ-Гвардіи Волынскаго полка Луц-
 кевичъ. Годовымъ окладомъ жалованья.

Старшій Лѣкаръ Гельсингфорской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Зальцманъ и Петровскаго пѣхопнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Кранихфельдъ; *полурядовый жалованьемъ* Лѣкаръ 3-го баталіона Кременчугскаго пѣхопнаго полка фонъ-Крейцеръ. *Подарками:* Вильманспрандскаго пѣхопнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Кошюковъ брилліаншовымъ персннемъ; Томскаго пѣхопнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Савинъ золопою: табакеркою. За выслугу 20-ти лѣтъ въ Лѣкарскомъ званіи Всемилошпивѣйше повелѣно производить *половинный пансіонъ* Шпабъ - Лѣкарямъ: Дивизіонному Доктору Коллежскому Совѣшнику Екаперининскому, Ординатору Московской военной госпитали Надворному Совѣшнику Миролобову и Починковскаго военно-конскаго завода Коллежскому Совѣшнику Раевскому.

По представленію Главнокомандующаго 2-ю арміею Государь Императоръ Всемилошпивѣйше пожаловать соизволилъ *Кавалерами:* ордена Св. Владимира 4-й степени Шпабъ-Лѣкаря 9-го Егерскаго полка Коцева; ордена Св. Анны 3-го степени Ладожскаго пѣхопнаго полка Шпабъ-Лѣкаря Филонова и Лѣкаря 9-го Егерскаго полка Персенинова,

а 10-го Егерскаго полка Штабъ-Лѣкарь Голд-
неймеру Высочайше повелѣнь соизволилъ обя-
вить: *Высочайшее благоволеніе*. Государь
Императоръ Высочайше повелѣнь соизво-
лилъ: Младшаго Лѣкаря 20-го Егерскаго пол-
ка Гудковскаго за отличное усердіе, ока-
занное имъ при подачѣ помощи раненымъ
воинскимъ чинамъ, произвестъ въ Штабъ-
Лѣкаря.

По ходатайству Командира Отдѣльнаго
Оренбургскаго Корпуса Государь Импера-
торъ Высочайше повелѣнь соизволилъ: Спар-
шему Фельдшеру Оренбургской военной гос-
питали Матвѣю Знаменскому, разжалованному
въ сіе званіе изъ Лѣкарей, во уваженіе хорошаго
поведенія и отлично-усердной службы, возвра-
тить Лѣкарское званіе съ назначеніемъ его
Ординаторомъ въ поманушую госпиталь.

7. Умершіе.

и Ординаторы военныхъ госпиталей: Гирсов-
ской Лѣкарь Романовскій, Одесской Докшоръ
Медицины Кучевскій, Кавариской Лѣкарь Мей-
бо, Вознесенской Штабъ-Лѣкарь Мышляев-
скій, Херсонской Лѣкарь Бонядевичъ и Штабъ-
Лѣкарь Роговъ, Елисаветпольской Лѣкарь

Телегина, Клевской Штаб-Лѣкари: Надвор-
ный Совѣтникъ Карельсонъ и Коллежскій
Совѣтникъ Жаборскій, Спиритрусской Лѣкаръ
Мальмбергъ, Слободзейской временной Лѣкаръ
Коллежскій Секретарь Цвѣтковъ, Брайлов-
ской временной Докторъ Медицины Надвор-
ный Совѣтникъ Рязенко, пѣхотныхъ пол-
ковъ: Уфимскаго Лѣкаръ Андреевскій, Нава-
гинскаго Лѣкаръ Бѣляевъ, Нижегородскаго
Лѣкаръ Ронгайнъ, Курскаго Штаб-Лѣкаръ
Лагушинъ, Селенгинскаго Штаб-Лѣкаръ Ко-
лаковскій, Софійскаго Лѣкаръ Орловъ, Гене-
рала Графа Паскевича Ериванскаго полка
Штаб-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Тимков-
скій, Кабардинскаго Штаб-Лѣкаръ Розовъ;
Егерскихъ полковъ Штаб-Лѣкари: 37-го Ле-
щевичъ, 47-го Боголюбовъ, 31-го Докторъ Ме-
дицины Томасъ; Уланскихъ полковъ: Харьков-
скаго Лѣкаръ Яворскій, Курляндскаго Штаб-
Лѣкаръ Казанскій; Новороссійскаго Драгун-
скаго полка Штаб-Лѣкаръ Вѣлюбинъ и
Вѣсперинарный Лѣкаръ Юрьевъ; Старшій Лѣ-
каръ Ревельской военной госпитали Штаб-
Лѣкаръ Спашскій Совѣтникъ Кильминдшъ;
Дивизионный Докторъ 20-й пѣхотной Диви-
зи Коллежскій Совѣтникъ Шуллеръ; Орен-

бурскаго гарнизоннаго полка Лѣкаръ Галицинскій; подвижнаго магазина Лѣкаръ Благовѣщенскій; соспоавшій сверхъ комплекта во 2-й арміи Штабъ-Лѣкаръ Наумовичъ; Полковый Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Уланскаго Его Императорскаго Высочества Цесаревича полка Коллежскій Ассесоръ Васкевичъ.

ЛУЧШІЯ НОВЫЙШІЯ МЕДИЦИНСКІЯ СОЧИНЕНІЯ.

16. Ueber Diet Entziehungs und Hungercur in eingewurzelen, chronischen, namentlich syphilitischen und pseudosyph. Krankheiten. Von Dr. L. A. Struve. Altona, 1822.

17. Der Krampf in pathologischer und therapeutischer Hinsicht, systematisch erläutert von F. Ch. A. Clarus. Leipzig 1822.

18. The lectures of Sir Astley Cooper on the principles and practice of Surgery, with additional notes and cases, by Fr. Tyrrell. London, 1824.

Vorlesungen von A. Cooper über Grundsätze und Ausübung der Chirurgie. 3 Bde. Weimar. 1825 - 1828.

19. F. Abercombie Untersuchungen über die Krankheiten des Darmcanals, aus dem Englischen von H. Wolff. Bonn, 1822.

20. Abhandlungen über Luxationen und Fracturen der Gelenke des Unterkiefers, der obern Extremitäten und der Knochen des Rumpfes. Von A. Cooper. Aus dem Englisch. Weimar, 1823.

21. Vorschläge zur Verbesserung der Körperlichen Kindererziehung in den ersten Lebensperioden. Angehenden Müttern gewidmet von D. L. A. Gölis 2. vermehrte Auflage. Wien, 1823.

22. Darstellung blutiger heilkünstlerischer Operationen, von Ch. B. Zang. 3 Thle. 3. Auflage. Wien 1823.

23. Lud. H. Friedländeri, Med. Doct. et Prof. Halensis de institutione ad Medicinam libri duo, tironum atque scholarum causa editi. Halæ, 1823.

24. De nervi sympathici humani fabrica, usu et morbis, auctore J. F. Lobstein. Parisiis, 1823. Cum x. tab. aeneis.

25. Recherches sur le ramollissement du cerveau. Par L. Rostan 2. Edit. Paris, 1823.

Untersuchung über die Erweichung des Gehirns, von L. Rostan, aus dem Franz. übersetzt von M. G. Th. Fechner. Leipzig, 1824.

26. *Elements d' Anatomie generale ou description de tous les genres d' organes qui composent le corp humain.* Par. P. A. Bichard. Paris, 1823.

27. Jos. Swan's gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Localkrankheiten der nerven, nebst dessen anatomisch-physiologisch-pathologischen Beobachtungen über das Nervensystem. a. d. Engl. von Dr. E. Franke. Leipzig, 1824.

28. *Practische Bemerkungen über einige der wichtigsten Krankheiten der untern Gedärme und des Afters, von Howship, nach der 2 ten Englischen Ausgabe übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen, von Wolf.* Frankfurt. 1824.

29. *Botanique medicale ou histoire naturelle et medicale des medicamens, des poisons et des alimens, tirés du règne vegetable, par. A. Richard.* 11. vol 4 me Ed. Paris, 1828.

A. Richard's medicinische Botanik. Aus dem Französischen, mit Zusätzen und Anmerkungen, von Dr. G. Kunze und Dr. G. F. Kummer. Berlin, 1824.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

**МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.**

Часть XIII. N. 3.

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

СѢН:

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

**ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.**

1829 ГОДА.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS

1917

1917

1917

1917

1917

1917

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стран.</i>
I. О жизненных припасахъ, какъ предметъ Медицинской Полиціи.	323.
II. О плоскихъ глистахъ	345.
III. Врачебное употребленіе рожковъ ржи.	366.
IV. Селипро-солянокислыя ванны, куреніе хлориномъ и ванны изъ онаго.	381.
V. Клиническія наблюденія и замѣчанія Профессора П. Чаруковскаго	395.
VI. Замѣчанія о съумасшествіи, Доктора К. Кроутера, Врача Векфилдскаго дома ума лишенныхъ.	432.
VII. СМѢСЬ.	
1. Новый способъ лѣчить горбы, изобрѣтенный Докторомъ Гейбергомъ.	444.
2. Успѣшное перевязываніе arteriæ iliacæ communis.	448.
3. Средство къ узнанію чистоты стрончакислаго хинина.	455.
4. Перевязываніе правой сонной артеріи	459.
5. Порошокъ квасцовъ противъ перепончатой жабы.	460.

6.	<i>Употребленіе моксы при Phlegmasia dolens.</i>	461.
7.	<i>Средство противъ лихорадки.</i>	462.
8.	<i>Новый способъ показать полость лабиринта.</i>	—
9.	<i>Амміакъ противъ опьленія.</i>	461.
VIII.	<i>Официальныя извѣстія съ 1-го Маія по 1-е Іюля 1829 года.</i>	463.
IX.	<i>О вновь выходящей книгѣ.</i>	478.

I.

**О ЖИЗНЕННЫХЪ ПРИПАСАХЪ,
КАКЪ ПРЕДМЕТЪ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОЛИЦИИ (Cura victualium, quatenus
Politiam Medicam spectat).**

(Прододженіе).

II. М О Л О К О.

*Виды порчи и подмѣсей молока. Виды
сія супъ:*

- а) Молоко больныхъ живописныхъ, или по-
лучающихъ худой, даже вредный кормъ.
- б) Разведеніе молока водою.
- в) Подмѣсь углекислаго пошана или угле-
кислой извести.
- г) Примѣсь мыла, крахмалу, пшювкой пше-
ничной или гороховой муки.
- д) Примѣсь мѣдныхъ или свинцовыхъ со-
спавовъ.

*

е) Подмѣсъ сливокъ (сливки и смешана супъ часпи молока жирныя, неприведенныя въ масло) порошкомъ спрѣльнаго корня (*Marganta L.*) или риса (*Oriza L.*).

Притины порти и подмѣсей молока. Молоко больныхъ живоциныхъ употребляется иногда безъ всякаго умысла, по неоспорожности или невѣденію продавца и покупателя *). Касаиельно корма, нѣкоторыя травы особенно измѣняютъ вкусъ молока (медвѣжій лукъ—*allium ursinum*, сумка паспущья—*thlaspi bursa pastoris*, зоря—*ligusticum levisticum*, зонтичныя распѣнія—*plantæ umbellatae*, армудъ—*mespilus amelanchior*, богородская права—*thymus serpillum*, прилистникъ доинный—*trifolium melilotus*, шафранъ, полынь, мята, дикая горчица); другія же травы измѣняютъ цвѣтъ молока; такъ молочай (*euphorbia helioscopia*) окрашиваетъ молоко блѣдно-краснымъ цвѣтомъ, марёна (*rubia tinctorum*) краснымъ, синіе полевые цвѣтны голубымъ; зеленые листья квиловые (*rupeus cypripedium*), ореховые, дубовые, ольхо-

*) Notizen a. d. Gebiete d. Nat. u. Heilk: u. L. F. v. Froriep. 19. B. Erfurt. 1828. N. 1. November. S. 13-14.

вые, буковые и шрава лѣшущихъ ножки (*ranunculus aeris* etc.), сообщаютъ молоку красно-кровоный цвѣтъ. Наковецъ нѣкоторыя шравы дѣлаютъ молоко ядовитымъ; шраковы супъ: породы молочая, лихорадочная шрава (*gratiola officinalis*), отъ которыхъ люди, употребляющіе шраковое молоко, получаютъ рвошу и поносъ. Молоко и даже мясо коровъ Американскихъ, пасущихся на Западномъ берегу рѣки Огіо, найдено въ новѣйшія времена весьма нездоровымъ *). Извѣстно также, что чрезъ употребленіе молока животныхъ, страдающихъ водобоязнію, переходила сія болѣзнь на людей. Разведеніе молока водою, для увеличенія его количества, хотя почти безвредно, однакожъ есть обманъ. Подмѣсь пощана и извѣсти дѣлается для предопшращенія закисанія и спшвороженія молока въ лѣпнее время; а мыло и мука, также крахмалъ, примѣшиваются для доставленія молоку пріятнаго вида и густоты. Примѣсь свинцовыхъ и мѣдныхъ сосшавовъ бываетъ при неосшорожномъ, иногда же и умышленномъ, храненіи молока въ нечистой, нелуже-

*) Der Getränkeprüfer. von C. A. F. Hoffmann. Quedlinburg und Leipzig. 1826. S. 123.

ной мѣдной и немуравленной достаточной глиняной посудѣ. Порошокъ рисовый или спиртъный примѣшивается къ молоку, которое выдается за сливки.

Предотвращеніе порчи и поджигей молока. Дабы молоко больныхъ живошныхъ не было продаваемо, то, если въ какомъ либо округѣ окажется падежъ между домашними живошными, не должно позволять доенія самокъ, а надлежитъ только высасывать искусственно молоко и выливать вонъ. Въ городахъ торговцы, приносящіе молоко изъ сосѣднихъ деревень, должны на заставахъ предъявлять свидѣтельница въ томъ, что въ ихъ околоткѣ нѣтъ падежа между живошными и что молоко такое не взято отъ свѣже-родившей самки, у которой опнѣли уже ея плоды, или отъ спелой коровы и т. д. Дабы молоко не смѣшивалось съ вредными нечистотами, то должно смотрѣть, чтобы оно не было выносимо на продажу въ открытой посудѣ, чтобы также посуда сія была чиста, хорошо вымуравлена или вылужена. Строго запрещенъ должно примѣсь къ молоку воды, извести, мѣлу и другихъ сказанныхъ веществъ, не позволять молошницамъ имѣть

при себѣ мушовку и наблюдать, дабы молоко сохраняемо было въ холодномъ мѣстѣ.

Распознаваніе порчи и подмѣсей молока.
Сіе производится:

Во первыхъ, трезъ показаніе недостатка естественныхъ или хорошихъ качествъ молока, къ каковымъ относятся:

а) Собственный цвѣтъ, сладковатый вкусъ, запахъ слабый, животный.

б) Непрозрачность и равномерная густота, безъ осадка на днѣ сосуда, въ коемъ хранился и безъ оспанка на холстинѣ, чрезъ которую процеживается молоко.

в) При кипяченіи не свораживается.

г) Остъ прибавленія кислоты или остъ долгаго стоянія въ покоѣ раздѣляется на сыворотку и пиворогъ, который либо содержитъ только сырную часть, либо же вмѣстѣ и жирную, — масло.

д) Хорошія сливки гуще, жирнѣе, маслянистѣе, нежели свѣжее молоко; цвѣтъ ихъ свѣтложелтый, вкусъ сладковатый, нѣжный, жирный.

Во вторыхъ, трезъ показаніе худыхъ или постороннихъ качествъ молока, куда принадлежатъ слѣдующія:

а) Измѣненный цвѣтъ молока есть, какъ выше сказано, признакъ худого, вреднаго корма, либо же болѣзненнаго состоянія. Желто-красноватый цвѣтъ молока, или полосы сего цвѣта, замѣтаемыя въ молоко, означающъ нѣрѣдко болѣзненное качество оного. Молоко весьма жидкое и голубоватое бываетъ при гнилостномъ воспаленіи въ легкихъ молочнаго животнаго *). Молоко спелыхъ и кормимыхъ мякиною коровъ имѣетъ горькій вкусъ, поощроу наводлящій. Коровы, спращущія омертвѣніемъ селезенки, дающъ желтоватое молоко, сладковато-солянаго вкуса **). Впрочемъ молоко болѣе не всегда отличаетъ по внѣшнему своему виду отъ здороваго. Въ Медицинскихъ наставленіяхъ, приложенныхъ къ Высочайшему Указу 1764 года отъ 31 Генваря ***) сказано: „При, „помъ примѣчаясь надлежитъ, чпо молоко „у коровъ болѣзнію (скопскій падежъ) зара, „женныхъ, ничѣмъ не разнспвуетъ отъ моло-

*) Grüll. I. c. S. 24.

**) Jdem. I. c. S. 10.

***) Указъ 1764 Генваря 31. О правилахъ леченія больнаго скота и о Полицейскихъ мѣрахъ при семъ случаѣ.

„~~ка~~ коровъ здоровыхъ и при вареніи не бываетъ, ещѣ въ немъ никакой перемѣны опѣ здороваго. Однако молоко, которое дошпсѣ въ послѣдній день (болѣзни) и на канунѣ послѣдняго дня болѣзни, бываетъ желто, иногда же и воняетъ.“

б) Молоко, подмѣшанное водою, имѣетъ водянистый вкусъ и голубоватый цвѣтъ, особливо по краямъ, даетъ мало сливокъ, перлеетъ весьма скоро пѣну и при свораживаніи отдѣляетъ весьма много сыворотки. Впрочемъ иногда молоко и само по себѣ бываетъ водянисто (на прим: у свѣже-родившихъ коровъ) и такъ называемый галактометръ (орудіе, служащее для измѣренія примѣси воды) *Г-на Каде де Во* не можетъ открыть сего, потому что количество воды, естественнo содержащейся въ молокѣ, бываетъ по различію обстоятельствъ весьма различно.

в) Молоко, подмѣшанное углекислымъ кали или шавою же известью, имѣетъ щелочный вкусъ; оно возстановляетъ голубой цвѣтъ лакмусовой бумаги, окрашенной кислотою и вскипаетъ опѣ прибавленія кислоты, минеральныхъ и расщипельныхъ.

г) Примѣсь мыла узнается изъ того, что въ молокѣ образуются большіе пузыри; опливающие разными цвѣтами и при дуновении пропадающіе.

д) Молоко, подмѣшанное крахмаломъ или мукою, имѣетъ чрезмѣрную густоту (особливо сваренное), запахъ и вкусъ мучной или крахмальный, оставляетъ на днѣ посуды осадокъ, на погруженной въ оное соломинкѣ образуетъ большую длинную каплю, при переливаніи тянется въ видѣ нитей и когда свернется, то производитъ обильный, клейстеру подобный осадокъ, неплавающий на верху вмѣстѣ съ сливками, но оседающійся вмѣстѣ съ сырной и водянистою частями, отъ которыхъ и можетъ быть отдѣленъ чрезъ вымываніе съ водою. Наконецъ на цѣдилкѣ паковое молоко оставляетъ много муки.

е) Для опкрытія въ молокѣ свинцовыхъ и мѣдныхъ соспавовъ нужно оное доспачно развеспи водою. Если потомъ прибавишь Ганнеманову пробную жидкость (*Aqua hydrosulphurata acidula*, Ph. Castr. Ruth.), то молоко получишь черносѣрый цвѣтъ, — признакъ присущствія свинца. Если же прибавишь водянистый расшворъ амміака, то

молоко получишь грязный голубой цвѣтъ, — признакъ присутствія мѣди. Если молоко содержишь въ себѣ много мѣди, то лезвее ножа, погруженное въ сосудъ съ молокомъ, дѣлается мѣдно-краснымъ. Наконецъ чрезъ накаливаніе обоеихъ осадковъ (черносѣраго и голубаго), если оныя доспаивочно уже образовались, вытѣпъ съ угольнымъ порошкомъ получишься свинецъ или мѣдь въ металлическомъ видѣ,

ж) Худые сливки имѣють горькій, кисло-вапый вкусъ, образують на поверхности своей кожицу и опдѣляютъ отъ себя сырныя часпицы. Если сливки подмѣшаны порошкомъ рисовымъ или спрѣлымъ, то нужно въ чайную ложечку шиковыхъ сливокъ впустить нѣсколько капель іодиновой настойки (*tinctura Joodini*), отъ чего произойдетъ голубой цвѣтъ; напропивъ того чистые, хорошіе сливки получають присемъ блѣдножелтый цвѣтъ *).

*) C. A. F. Hoffmann's der Getränkeprüfer etc, §. 127-128.

III. МАСЛО.

Виды порчи и подмѣсей масла (коровьяго). Они суть слѣдующіе:

- а) Прогорклое масло.
- б) Масло больныхъ коровъ, или получающихъ худой, вредный кормъ.
- в) Примѣсь къ маслу сала, песку, мѣлу, поваренной соли, спертого карпозелю.
- г) Примѣсь распищельныхъ соковъ (*succus chelidonii majoris, calendulae officinalis, crocus sativus, etc.*).
- д) Примѣсь мѣдныхъ и свинцовыхъ составовъ.

Причины порчи и подмѣсей масла. Масло спарое и хранимое особливо въ тепломъ мѣстѣ дѣлается прогорклымъ. Кормленіе коровъ багуномъ (*ledum palustre*), масляными лепешками, сухою соломою, сообщаетъ маслу непріятныя качества. Сало, песокъ, мѣлъ, соль, карпозель прибавляющіяся для вѣсу, а распищельные соки, — шафранъ, куркумъ, орлеанъ, — для доспавленія маслу желтаго цвѣта. Свинецъ и мѣдь попадающъ въ масло, хранимое въ соименной посудѣ; но свинцовыя бѣ-

лила примѣшиваются иногда для бѣлизны и вѣсу.

Предотвращеніе порчи и подмѣсы масла.
Надлежитъ запрещать продажу масла отъ больныхъ коровъ, или же получающихъ вредный кормъ, не допускающъ въ продажу спараго, прогорклаго масла и спорого наблюдать за тѣмъ, чтобы продажное масло содержалось въ безвредной посудѣ и холодномъ мѣстѣ, чтобы для увеличенія вѣсу и поправленія цвѣта не примѣшивались никакія вещества, чтобы наконецъ при продажѣ масла въ раздробъ не употреблялись мѣдные вѣсы.

Если для сбереженія коровьяго масла употребляется соль, то два унца соли достаточны для 16-ти унцовъ масла. Соль сія должна быть сухая и крупносмолотая. Для отвращенія естественной порчи или прогорклости масла нужно, по совѣту *Андерсона* *), смѣшивать масло съ 2-мя частями хорошей соли и мелкимъ порошкомъ, состоящимъ изъ одной части сахара и селитры; по-

*) Dictionary of Chemistry, on the basis of Mr. Nicholson's etc. by Andrew Ure. London. 1821. 8. p. art. butter. См. также вышеприведенную часть Сына Отечества, стр. 126.

соленное такимъ образомъ масло до испеченія двухъ недѣль не имѣетъ хорошаго вкуса, но понюхъ получаетъ пріятный вкусъ и весьма мало опшывается солью, а чрезъ два года удерживаетъ еще пріятноссть вкуса и цѣлоссть своего соснава; посему масло, такимъ образомъ посоленное, можно смѣло, говорить *Андерсонъ*, посылать въ Осиу-Индію. На фунтъ масла полагается одинъ унцъ сказанной смѣси.

Распознаваніе порти и подмѣсей масла.
Сіе производися:

Во первыхъ, трезъ показаніе недостатка естественныхъ или хорошихъ качествъ, каковы суть:

а) Бѣложелтоватый цвѣтъ, собснвенный вкусъ, безъ горечи и безъ запаха.

б) По расплненіи масла не бываетъ никакого осадка.

в) Во рпу распускается масло совершенно, безъ жженія и хруста.

Во вторыхъ, трезъ показаніе постороннихъ качествъ масла, каковы суть:

а) Лежалое масло, или сдѣланное изъ спарой смешаны, имѣетъ горьковатый вкусъ; масло коровъ, кормленныхъ багуномъ, получаетъ

прошивный вкусъ, а кормленныхъ соломою, — блѣдный цвѣтъ.

б) Если масло имѣетъ салыный вкусъ, темныя, полупрозрачныя полосы или пятна и прошивный запахъ, то сіе доказываетъ примѣсъ сала.

в) Съ пескомъ или мѣломъ смѣшанное масло имѣетъ зернистый видъ и хруститъ между зубами. Если одну часть такого масла варить съ 10-ю частями кипячей воды, то масло всплываетъ на верхъ, а землистыя части падаютъ на дно сосуда и песокъ узнается съ перваго взгляду, а мѣлъ опъ прибавленія крѣпкаго уксусу вскипаетъ.

г) Пересоленное масло уже по вкусу узнается. Если масло сіе варить съ 10-ю частями воды, то масло всплываетъ на верхъ, а соль растворится въ водѣ, которую надлежитъ ослудить и, процѣдивши, выпарить до сухости. Черезъ сіе получится все количественно соли, примѣшанной къ маслу.

д) Масло, смѣшанное съ спертнымъ каршофелемъ, будучи расширяемо въ игонѣ съ водою и іодиномъ, получитъ голубой цвѣтъ; напрошивъ того чистое масло опъ такого сширанія получаетъ желто-оранжевый цвѣтъ.

е) Соками расптѣній окрашенное масло перяетъ свой искусственный цвѣтъ чрезъ вымываніе съ водою.

ж) Мѣдъ и свинецъ опшкрываючися въ маслѣ также, какъ и въ молокѣ; для сего нужно предварительно распопить масло.

IV. С Ы Р Ъ.

Виды порги и подмѣсей сыра. Сюда относятся:

а) Старый, гнилой сыръ.

б) Примѣсь муки, свареннаго каршофеля, крахмала и проч.

в) Примѣсь мѣдныхъ и свинцовыхъ составовъ.

Причины порги и подмѣсей сыра. Поелику сыръ есть не иное что, какъ сырная часпъ молока, смѣшанная съ солью и пряностями и подверженная сушенію въ шеплопѣ: но чрезъ согниваніе сырной часпи, а въ жирныхъ сырахъ крошѣ шего и масляной часпи, дѣлается сыръ оспрымъ, вошкчимъ. Чѣмъ жирнѣе сыръ, тѣмъ скорѣе порпится. Мука, каршофель, крахмалъ прибавляются для умноженія вѣса, а храненіе сыра въ мѣдной и свинцовой посудѣ бываетъ при-

чиною примѣси обоихъ сихъ металловъ. Иногда же нарочно примѣшивается мѣдная окись для доставленія сыру красиваго цвѣта и болѣе оспропы.

Предотвращеніе порчи и подлѣсокъ сыра.
Не должно позволять продажи сыраго, испорченнаго сыра и не храниль его въ мѣдныхъ, свинцовыхъ и оловянныхъ сосудахъ. Продажу правяныхъ сыровъ, содержащихъ въ себѣ много пряностей, надлежитъ весьма ограничить, равно какъ и продажу такъ называемаго кислаго сыра. Въ Бордо, въ 1802 году, 9733 пшеницы сыра, приняшаго на одномъ кораблѣ, Полиція выбросила въ воду. Швейцарскій сыръ заслуживаетъ въ торговлѣ преимущество предъ другими, по причинѣ весьма спорого въ сей сырѣ присмопра за молочнымъ скопомъ.

Распознаваніе порчи и подлѣсокъ сыра:
Сіе производится:

Во первыхъ, чрезъ показаніе недостатка хорошихъ качествъ, куда принадлежатъ:

- а) Вкусъ пріятный, соленоватый, безъ оспропы и пряности, безъ жженія на языкѣ.
- б) Запахъ непрошивной.
- в) Соспавъ равномерно плотный.

Часть XIII. N. 3.

2

Во вторыхъ, чрезъ показаніе постороннихъ качествъ сыра, куда принадлежатъ слѣдующія:

а) Испорченный сыръ узнается съ перваго взгляду по опиврапительному запаху, весьма острому вкусу, темному цвѣту; въ составѣ его усматриваются нерѣдко сырные черви (*asarus domesticus*, *asarus sirio* *).

б) Картофельный лежалый сыръ опличается желтоватымъ цвѣтомъ, кашеобразнымъ видомъ, гнилымъ, острымъ вкусомъ и пѣнью, что въ кипячей мясной похлебкѣ нисколько не растворяется; напротивъ того хорошій сыръ, послѣ такого варенія процеженный, дѣлаетъ весьма незначительный осадокъ **). Если сыръ, подиѣшанный картофелемъ, мукою, крахмаломъ, расширять въ игони съ водою и іодиномъ, то смѣсь получитъ красивый голубой цвѣтъ, предполагая, что количество примѣся не слишкомъ мало; напротивъ того чрезъ такое же расширѣніе чистаго сыра полу-

*) Handbuch der Zoologie. v. G. A. Goldfuss. Erste Abtheilung. Nürnberg. 1820. 8. S. 209.

**) J. F. Niemann's Handb. d. Staatsärzneyk. I. T. Leipzig. 1813. 8. S. 482.

чится смѣсь, имѣющая цвѣтъ не голубой, но похожій на цвѣтъ Испанскаго табаку.

в) Для опкрытія мѣди въ сырѣ спирается въ стеклянной чашкѣ или на перекѣ одна часть сыра съ 20-ю частями перегнанной воды и кипящися до того, что уже смѣсь болѣе не растворяется. Нераспворенную часть надлежитъ отдѣлить чрезъ процеженіе отъ жидкости и наспивать разведенною селитреною кислотою до того, что уже не дѣлается болѣе раствора. Отъ прибавленія къ обѣмъ симъ жидкостямъ водянистаго амміака происходитъ голубой осадокъ, — знакъ присутствія мѣди. Чрезъ накаливаніе сего осадка съ угольнымъ порошкомъ получается мегаллическая мѣдь.

г) Для опкрытія свинца должно растворить сыръ въ водѣ и селитреной кислотѣ, какъ то сказано объ опкрытіи мѣди въ сырѣ. Сверхъ того нужно одну часть сыра съ 20-ю частями чистаго (безъ свинца) уксусу кипящися нѣсколько часовъ въ стеклянной колбѣ и жидкость процедить. Всѣ сіи жидкости отъ прибавленія Ганнемановой пробы получаютъ черный осадокъ, — знакъ присутствія свинца. Или же спираются равнымъ

*

часпи сыра и угольного порошка, смѣсь сія кладется въ пнгель, наполненный углями и подвергается на нѣкоторое время дѣйствию плавильнаго жара въ духовой печи; послѣ чего на днѣ сосуда оказыывается свинецъ въ металлическомъ видѣ.

V. Я И Ц А.

Виды порти и подмѣсей яицѣ. Виды сіи супы:

- а) Спарыя, тнилыя лица.
- б) Яица больныхъ живошныхъ.
- в) Насиженныя лица.

Причины порти и подмѣсей яицѣ. Неоспорожностъ, нерадѣніе и корысть супъ главнѣйшіе поводы къ сему.

Предотвращеніе порти и подмѣсей яицѣ. При свирѣпствованіи болѣзней между домашними ппицами продавцы должны предспавлять свидѣтельсво въ томъ, что лица опъ здоровыхъ самокъ. Надлежитъ подвергать спрогой опвѣспвенности продающихъ испорченныя лица и запрещать окрашиваніе лицъ къ Пасхѣ вредными средспвами, проникающими нерѣдко чрезъ скорлупу до самага бѣлка яичнаго.

Гнилость яицъ предохраняется чрезъ удаленіе ихъ отъ вліянія воздуха, чрезъ зарываніе въ золу, овесъ, чрезъ намазываніе масломъ, храненіе подъ водою, покрываніе лакомъ и проч. Лишеніе воздуха не убійственно для яичнаго зародыща. *Реолморъ* *) покрылъ яйца лакомъ и держалъ ихъ въ семь соспояніи цѣлые два года; попомъ лакъ снятъ былъ оспорожно и яйца сіи произвели цыплятъ. *Бейнль* **) совѣдуетъ для крѣпостей и кораблей употреблять въ замѣну яицъ слѣдующій порошокъ: изъ потребнаго для запаса количества яицъ, выпущенныхъ изъ скорлупы и сбитыхъ до шого, чпо бѣлокъ и желтокъ хорошо уже смѣшались, получается смѣсь, копорую должно вылить на многія плоскія блюда и въ опкрытомъ мѣстѣ, но не на солнцѣ и не на печи, высушить такъ, чпобы вся масса сдѣлалась крѣпка какъ стекло и опскакивала отъ блюда. Сію твердую массу надлежитъ спо-

*) Вышеприв. часть Сына Отечества.

**) Versuch einer militärischen Staatsarzneykunde in Rücksicht auf d. K. K. Armee. Herausgeg. von Anton Beinkl, Edlen von Bienenburg. Wien. 1804. 8. § 278. S. 435.

лочь въ порошокъ, просѣявъ сквозь сито и хранивъ въ хорошо закупоренномъ спеклянномъ сосудѣ. Сей порошокъ сохраняется безъ порчи опъ пяти до шести лѣтъ. Для употребленія одна столовая ложка сего порошка смѣшивается съ осьмью ложками рѣчной или другой мягкой воды, оспавляется на полчаса въ покое, попомъ сбивается и употребляется на яичницу или къ другимъ яспвамъ.

Распознаваніе порти и подлѣсей лицъ. Сіе совершается:

Во первыхъ, чрезъ показаніе недостатка хорошихъ качествъ лицъ, каковыми почтипаются слѣдующія:

- а) Лица падають на дно сосуда съ водою.
- б) Будучи держимы къ свѣшу, просвѣчивають.
- в) Одинъ конецъ лица, какъ замѣчаетъ Реберъ *), холоденъ, а другой шепель, если, п. е., коснувшись языкомъ. Явленіе сіе есть

*) System der medicinischen Gesetzgebung, von C. F. L. Wildberg. Zweyte Ausgabe. Berlin. 1820. 8. S. 95. § 188.

доказательство присутствія жизненной силы въ лицѣ.

г) Въ кипячей водѣ свѣжее лицо чрезъ нѣшнере минушы дѣлается мягкимъ какъ слива, а чрезъ пять минушъ швердѣеть *).

д) Желпокъ свѣжаго, здороваго лица имѣеть блѣдножелтый цвѣшъ и легко опдѣляется опъ бѣлка **).

Во вторыхъ, чрезъ показаніе постороннихъ катествъ лицъ, каковыми признаются слѣдующія:

а) Гнилыя лица специфически легче воды и не просвѣчиваютъ; на ровной поверхности они легко приводятся въ кругообразное движеніе и на обоихъ концахъ своихъ, если коснуться къ онимъ языкомъ, показываютъ ровную темперашуру; при разломѣ скорлупы опдѣляютъ запахъ сѣроводороднаго газа.

б) Въ кипячей водѣ лежалое лицо уже чрезъ три минушы швердѣеть,

*) Neues medicin. Kochbuch, v. T. Ph. Bodo Menzger 1. T. S. 228.

**) Menzger, 1. c. S. 229.

в) Желтокъ лежалаго яйца имѣеть тем-
ножелтый цвѣтъ и неудобно отдѣляется
отъ бѣлка *).

в) Насиженные яйца при шрясеніи ихъ
въ рукѣ какъ бы хлопають и шѣмъ узна-
ются.

(Будетъ продолженіе).

*) Idem. По замѣчанію *Менищера*, куриныя яйца,
снесенныя до Пасхи, лучше яицъ, снесенныхъ
послѣ Пасхи. Первые гораздо прочнѣе и
не такъ легко поршились, какъ послѣднія.

II.

О плоскихъ глистахъ.

*Новое и вѣрное средство противъ плоскихъ
елистовъ, купленное Прусскимъ Правитель-
ствомъ у Доктора Шмита и обнародо-
ванное въ Гукфеландовомъ Журналѣ, 1828
года м. Августъ.*

Докторъ Шмитъ, вольнопрактикующій
Врачъ въ Берлинѣ, объявилъ въ 1823 году
Правительству, что онъ знаетъ новое и
вѣрное средство противъ плоскихъ глистовъ,
которое уже около 20-ти лѣтъ употре-
бляется съ полнымъ успѣхомъ, и согласенъ
уступить за извѣстное награжденіе, если
Правительство, испытавъ сперва на са-
момъ дѣлѣ, признаетъ оное надежнымъ сред-
ствомъ въ сей болѣзни. Въ то же самое вре-
мя еще два другіе специфика предъявлены
были Правительству на тѣхъ же самыхъ
условіяхъ.

Въ слѣдствіе сего спецификъ Доктора *Шмита*, какъ болѣе уже публикѣ извѣстный, по причинѣ удачнаго лѣченія опъ глистовъ, подвергнутъ былъ испытанію, которое поручено было сдѣлать Доктору *Шмиту*, подѣ надзоромъ Доктора *Наторпа*, Берлинскаго Шпадтъ-Физика. Въ 1824 году Докторъ *Наторпъ*, послѣ сдѣланныхъ опытовъ съ симъ средствомъ надъ больными, объявилъ Начальству, что спецификъ или новое вѣрное средство Доктора *Шмита* противъ плоскихъ глистовъ дѣйствительно есть превосходное, потому что а) оное непротивно и самимъ нѣжнымъ субъектамъ; б) что не болѣе 24-хъ часовъ пребуется для изгнанія симъ средствомъ глистовъ; с) что никакого долговременнаго предуготовительнаго лѣченія не нужно; д) что оно не болѣе раздражаетъ кишечную систему, какъ и всякое другое слабительное. При семъ донесеніи Докторъ *Наторпъ* представилъ слѣдующія исторіи больныхъ, плоскими глистами страдавшихъ и симъ средствомъ вылѣченныхъ.

а) Дѣвица *Н.*, 28-ми лѣтъ, въ 1823 году съ 7-го Декабря начала употреблять средство Доктора *Шмита* противъ плоскихъ

глистовъ, и послѣ перваго употребленія 8-го Декабря вышли три плоскія глисты; при вѣпоричномъ приѣмѣ онаго, 10-го Декабря, вышли чешыре плоскія глисты. Докторъ *Шмитъ* совѣщовалъ больной продолжати употребленіе сего средства; но она пренебрегла совѣщомъ и оставила лѣченіе. Въ 1824 году припадки плоскихъ глистовъ снова появились, и Докторъ *Шмитъ* опять приглашенъ былъ къ лѣченію. Послѣ прехъ приѣмовъ его специфика вышли двѣ цѣльныя плоскія глисты. При употребленіи онаго спрдавшая не только въ силахъ не ослабѣла, но чувствовала себя гораздо здоровѣе, и съ тѣхъ поръ опъ припадковъ глистныхъ совершенно была освобождена.

b) Девятилѣтній мальчикъ *К.*, спрдавший уже три года плоскими глистами, употреблялъ многія средства, но безъ всякой пользы. Послѣ употребленія 12-ти пилюль *Шмитова* средства, по чешыре пилюли черезъ два часа, вышла плоская глιστα съ головою, и больной оспался совершенно здоровымъ.

c) Дѣвица *С.*, 24-хъ лѣтъ, сухощаваго сложенія, большаго росшу, спрдала часто

кровохарканіемъ и одышкою; она была весьма раздражительна и имѣла чахоточное расположеніе. Между болѣзненными припадками находились также припадки плоскихъ глистовъ. Она начала принимать *Шмитова* средство съ 6-ми часовъ утра, по пяти пилюль черезъ два часа; послѣ обѣда въ 4 часа вышла глиста *tenia solium* съ головкою; въ 6-мъ часовъ вечера она нисколько слабости опъ того не чувствовала.

d) Благородная дѣвица А., 17-ми лѣтъ, крѣпкого сложенія, уже четыре года страдала плоскими глистами, и послѣ принятія 15-ти пилюль *Шмитова* средства, въ продолженіи пяти часовъ, вышла цѣлая плоская глиста, безъ малѣйшихъ худыхъ послѣдствій.

e) Госпожа Д., 40-ка лѣтъ, слабого сложенія, страдая плоскими глистами, уже четыре недѣли принимала спецификъ Доктора К. безъ всякой пользы; она начала употреблять *Шмитова* средство съ 6-ми до 10-ми часовъ утра, черезъ два часа по пяти пилюль; въ 11 часовъ вышли три цѣльныя плоскія глисты.

г) Сынъ сей же Г-жи спрадалъ пою же болѣзнію и по упопрѣбленіи пѣхъ же пилюль въ печеніи 24-хъ часовъ вышла глиспа, восемь аршинъ длиною.

г) Мальчикъ, 2½ лѣтъ, послѣ упопрѣбленія сихъ пилюль въ малыхъ приемахъ, въ печеніи 12-ти часовъ избавился опть плоской глиспы.

Послѣдніе два субъекта лѣчимы были безъ присмотра Доктора *Наторпа*.

Шпаццъ-Физикъ Докторъ *Наторпъ* въ до-
несеніи своемъ Начальству о пользѣ сего спе-
цифика между прочимъ утверждаетъ, что изъ
всѣхъ доселѣ извѣстныхъ спецификовъ сего
рода ниодинъ не можетъ сравниться съ *Шми-
товымъ* спецификомъ, кошорый дѣйствуетъ
вѣрно и скоро и не причиняетъ почти нима-
лѣйшей непріятности.

По поводу предъявленныхъ еще прехъ спе-
цификовъ на пѣхъ же самыхъ условіяхъ по-
ручено было Начальствомъ Главнымъ Вра-
чамъ градской больницы (*Charité*) Доктору
Клуге (*Kluge*) и *Нейману* сдѣлать сравни-
тельное испытаніе всѣхъ четырехъ специ-
фиковъ и опредѣлить ихъ опносительное
достоинство и выгоды, что и выполнено
было въ печеніи 1825 года. Въ 1826 году

въ рапортѣ оныхъ Врачей о сихъ спецификахъ между прочимъ сказано:

а) Спецификъ и способъ лѣченія Доктора К. довольно вѣренъ въ своихъ результатахъ, но весьма медленно дѣйствуетъ и по сей причинѣ дорого стоить; сверхъ того спецификъ сей весьма ослабляетъ силы больного продолжительнымъ своимъ драспическимъ дѣйствіемъ, и для многихъ субъектовъ, коимъ шестинедѣльный поносъ можетъ причинить другую болѣзнь, вовсе неприемлемъ: ибо скорѣе можетъ быть вреденъ, нежели полезенъ.

б) Хирургъ К. сдѣлалъ только одинъ опытъ надъ больнымъ съ своимъ спецификомъ, но и тотъ былъ безуспѣшенъ.

в) Иностраннѣйшій Врачъ, Докторъ С. сдѣлалъ шесть опытовъ по собственному способу лѣченія, изъ коихъ одинъ только удался; въ двухъ случаяхъ показались только куски плоскихъ глистовъ; въ прочихъ же лѣченіе продолжалось безъ всякаго успѣха.

г) Касаательно *Шмитова* специфика и способа лѣченія должно сказать, что оный всѣхъ лучше, потому что никогда не изменилъ въ своемъ дѣйствіи, гдѣ только

о присутствіи глистовъ безошибочно заключаешь было можно. Припомъ способъ сей въ дѣйствіи своемъ скоръ, безопасенъ, не распространяетъ силъ больного и изгоняетъ глисты цѣльныя и живыя.

Увѣрившись такимъ образомъ въ превосходствѣ *Шмитова* средства противъ плоскихъ глистовъ, Его Превосходительство Министръ Духовныхъ Дѣлъ и Врачебнаго Управленія па *Альтенштейнъ* входилъ съ докладомъ по сему дѣлу къ Его Величеству Королю Прусскому и получилъ Высочайшее соизволеніе на опредѣленіе Доктору *Шмиту* 200 талеровъ (700 руб.) ежегоднаго пансіона, а по смерти его той же суммы женѣ его, съ тѣмъ, чтобы Докторъ *Шмитъ* объявилъ Правительству составныя части своего специфика, присоединивъ къ сему подробный способъ лѣченія.

Въ слѣдствіе сего Докторъ *Шмитъ* представилъ Правительству свое средство противъ плоскихъ глистовъ вмѣстѣ съ подробнымъ описаніемъ способа лѣченія, который мы здѣсь и сообщаемъ.

Способъ сей раздѣляется на а) *предуговительный*, б) *радикальный* и с) *профилактический*.

а) *Лѣченіе предуготовительное.*

При лѣченіи плоскихъ глистовъ по *Шмитову* способу надлежитъ въ первое утро принимать слѣдующую микстуру:

Rr. Pulv. rad. valer. minor. dr. j.

Fol. zennæ dr. jj. f. l. a. infusum.

Colat. unc. vj. adde:

Natri sulphur. crystal. dr. jjj.

Syr. mannæ unc. jj.

Eleosach. tanacet. dr. jj. M. S.

Принимаютъ черезъ два часа по двѣ столовыя ложки.

При употребленіи сей микстуры должно послѣ всякаго приѣма запитъ чернымъ кофеемъ (безъ сливокъ), довольно подслащеннымъ сиропомъ или сахаромъ, чтобы такимъ образомъ вывести глисты изъ ихъ гнѣздилища, привлечь къ окончанію кишечнаго канала и ускорить ихъ выходъ. Употребленіе микстуры надлежитъ продолжатъ до семи часовъ вечера. Діета присемъ должна быть щощая, т. е., постный супъ къ обѣду и нѣскольکو кусочковъ сельди съ ея икрою; на ужинъ

сельдяной салатъ, состоящій изъ картофеля, сельди, луку, перцу и копченого окорока, съ довольномъ количествомъ масла и сахара приготовленный. Во время предуготовительнаго сего лѣченія, изъ легкаго слабительнаго и пощей діеты состоящаго, часпо уже того же дня куски глистовъ выходятъ, а по наблюденіямъ Дра Шмита въ двухъ случаяхъ послѣ сельдянаго салата цѣлая глиста вышла.

в. Лѣченіе радикальное.

Послѣ предуготовительнаго лѣченія, копорое не болѣе одного дня продолжается, на слѣдующее утро долженъ больной принять специфическое Шмитово средство, состоящее изъ слѣдующихъ пилюль:

Rp. Assæ faetidæ.

Extr. gramin. aa dr. jijj.

G. guttæ.

Rad. rhei.

— — jalap. aa dr. jj.

— — ipecac.

Hbæ digital. purp.

Sulphur. stibiat. aurant. aa scrup. sem.

Calomel. scrup. jj.

Ol. tanacet.

— anisi aa gutt. xv.

m. f. pil. ponder. gr. jj. consperg.
lycopod.

D. ad vitr. bene obturat. S.

Принимають по шестипи пилюль черезъ часъ, начиная съ 6-ти часовъ утра.

Пилюли сіи должно приниматьъ въ обыкновенномъ сиропѣ по чайной ложкѣ; черезъ полчаса послѣ перваго приѣма пилюль надлежитъ принять споловую ложку клецевиннаго масла; послѣдующіе же приѣмы слѣдуетъ запивать черезъ полчаса чернымъ кофеемъ, сахаромъ или сиропомъ довольно подслащеннымъ. Около двухъ часовъ послѣ обѣда того же дня глисты большею частію выходятъ, и тогда употребленіе пилюль прекращается; если же появились только частіи или куски глисты, то пилюли надлежитъ продолжать, пока никакихъ слѣдовъ, присущіе глистовъ доказывающихъ, не останется. Иногда глиста весьма медленно выходитъ; въ такомъ случаѣ должно еще нѣсколько разъ принять по споловой ложкѣ клецевиннаго масла, прибавляя къ оному по чайной ложкѣ сахару.

Діета въ сей день должна быть строго соблюдена; къ обѣду мясной супъ, не употребляя говядины; на ужинъ щоже, или лучше

супъ съ свѣжимъ коровьимъ масломъ и сахаромъ.

На слѣдующій день надлежитъ еще принявъ нѣсколько пилюль изъ предоспорожности, дабы и самого гнѣздилища глисповъ не осталось въ первыхъ пушяхъ.

Вышедшая глиспа обыкновенно находится на днѣ ночнаго сосуда. Дабы увѣришься о цѣлоспи ея, должно оспорожно посредствомъ пера приподнять и вынять ее, чшобы не оппорвать спонкой ея шейки и головки *).

*) Такъ какъ при лѣченіи сей болѣзни особенное обращашъ вниманіе на вышедшую головку глиспы, какъ на единспвенный вѣрный признакъ совершенно удачнаго излѣченія: то весьма кспаша упомянуть здѣсь о мнѣніи *Бремзера* въ семъ отношеніи. „Все равно для меня, говоритъ *Бремзеръ*, находится ли головка глиспы въ испражненіяхъ или нѣтъ: поелику при лѣченіи могутъ выйти при или чепыре головки глиспы, и больной при всемъ томъ не будетъ освобожденъ отъ глисповъ, когда многія шамъ находятся. Если въ печеніи прехъ мѣсяцовъ никакихъ слѣдовъ глиспы не замѣчаемъ въ испражненіяхъ, то эшо есть вѣрный знакъ, чшо больной совершенно освобожденъ отъ глисповъ. Если же послѣ двухъ или прехъ лѣтъ куски

*

с) *Лѣченіе профилактическое.*

Окончивъ съ полнымъ успѣхомъ лѣченіе радикальное, должно стараться укрѣпить

ихъ опять появляясь, по это есть признакъ вновь образовавшихся плоскихъ глистовъ. Онъ же въ другомъ мѣстѣ говоритъ:,, если при лѣченіи головка глисты не вышла, то не должно изъ того заключать, что она съ глистою еще въ больномъ находится, поелику глиста сія обыкновенно при выходѣ своемъ близъ головки опрыскается, и чѣмъ ближе къ головкѣ разрывъ оной сдѣлался, тѣмъ труднѣе опыскашь ее въ испражненіяхъ. Лучшій способъ къ ея опысканію есть слѣдующій: надлежитъ налишь остаточно теплой воды въ сосудъ, испражненія содержащій, и попомъ споль же остаточно слишь оную съ прочими нечистотами; тогда на днѣ сосуда останется глиста съ своими частями. Такимъ образомъ нашелъ я даже и головку глисты, вышедшей у одной Петербургской дамы, мною вылѣченной; длина головки сей, отъ прочихъ частей опорванной, была въ одинъ дюймъ. Для размытія кала употребилъ я нѣсколько ведеръ воды. Изъ многихъ сопенъ больныхъ, всякаго пола и возраста, вылѣченныхъ мною отъ плоскихъ глистовъ, я ни въ одномъ случаѣ не видѣлъ окончанія головки

пилапшельною діепою и горькими средствами силы больного, и особенно первые пупи, дабы они вшорично не сдѣлались гнѣздилищемъ глистовъ. Иногда припадки глистовъ снова появляются, особливо, когда больной предписанныхъ правилъ въ шочности не выполнилъ, или же лѣкарство, имъ употребленное, вышло рвотою; въ такомъ случаѣ нѣкоторые только куски глисты выходятъ; или же когда многія внутри находящіяся и изъ нихъ однѣ вышли, а другія въ своемъ гнѣздилищѣ, часпо опъ 5 до 6-ти, небольшія, величиною въ палець, оспаюются и со временемъ распухнуть и увеличиваются. Сии-то мелкія плоскія глисты бывають весьма трудно выгнать, поелику онѣ своею головкою лежатъ сокрытыми въ слизи гнѣзда, либо въ складкахъ кишечнаго канала. Дабы припадки сии уничтожишь совершенно, надлежитъ послѣ изгнанія глисты совѣпновать больному долгое употребленіе вышесказаннаго сельдянаго салаща; также употреблять сырой шершый хрѣнь съ уксусомъ и сахаромъ, и че-

глисты, хотя, сколько мнѣ извѣстно, 99 изъ 100 совершенно были освобождены опъ глистовъ. Wien. 1819. 4. 8. 194. 107.

резъ всякіе восемь дней принимаѣть неоднократно пилюли *Шмитова* специфика.

Иногда случается, что обнаруживаются нѣкопорые признаки сей болѣзни, но между тѣмъ никогда не бывають замѣчены куски глисты въ испражненіяхъ. Для почнаго опредѣленія сей болѣзни надлежитъ употребить больному сельдяной салапъ вечеромъ, записать сахарною водою, а на слѣдующее утро принять въ сиропъ слѣдующій порошокъ:

Rp. Rad. jalap. gr. xv.

Sem. cinæ scrup. sem.

G. guttæ,

Colomel. aa gr. vj.

Eleosach. tanacet. dr. j. M. D. S. Принять и записать чернымъ кофеемъ, въ соединеніи съ сахаромъ либо сиропомъ, или же записать мяснымъ жирнымъ супомъ. Послѣ употребленія сего порошка обыкновенно слѣдуютъ порядочныя испражненія вмѣстѣ съ кусками глисты, когда она находится. Иногда даже цѣлая глиста выходитъ. Если догадка наша симъ способомъ подтвердился, тогда надлежитъ давать больному специфическія пилюли съ сиропомъ черезъ часъ, дабы въ случаѣ если,

бы многія плоскія глисты въ немъ находились, совершенно освободишь его отъ оныхъ.

Противопоказанія при употребленіи *Шмитовыхъ* пилюль суть: беременностъ, періодическое кровоочищеніе, ш. е., во время или же вскорѣ послѣ онаго и до онаго, воспаленія или горячки, изнурипельныя лихорадки, кровохарканія, пекучіе почечуи, чахопки различнаго рода и старческая немочь.

Вопъ весь секретъ *Шмитова* удачнаго лѣченія отъ плоскихъ глистовъ. Способъ сей подлежащъ извѣстнымъ модификаціямъ, смотря по полу и возрасту, въ количественномъ отношеніи. Въ историческомъ и патологическомъ отношеніи плоской глисты *Дрѣ Шмитъ* мало достойнаго замѣчанія сообщилъ намъ. Изъ 166-ти субъектовъ, имъ вылѣченныхъ отъ плоскихъ глистовъ, 15 только было женскаго пола. Изъ сихъ 166-ти больныхъ 20 имѣли по одной только глистѣ; прочіе же имѣли отъ двухъ до девяти; одинъ же изъ нихъ, 18-ти лѣтъ мальчикъ, имѣлъ 17 довольно длинныхъ плоскихъ глистовъ, такъ что онѣ наполнили собою весь пазъ. *Дрѣ Шмитъ* присемъ замѣтилъ, что спраждающіе плоскими глистами

ми никогда не имѣють круглыхъ глистовъ, и на оборотъ; сіе однакожь наблюденіями другихъ Врачей не подтверждается. Вышеупомянутый Хирургъ К. сообщаетъ, что въ числѣ 29-ти сею болѣзнію спирадавшихъ 9 только было мужескаго пола.

Послѣ уступки Докторомъ *Шмитомъ* Правительству своего специфическаго средства и всего способа лѣченія поручено было вновь Главнымъ Врачамъ градской больницы повѣрить опыты, чтобы увѣрились въ одинаковомъ надѣ всѣми дѣйствіи и пользѣ оного. Послѣ кратковременныхъ опытовъ представили они результаты, которые можно видѣть изъ слѣдующихъ испорій.

а) *Эмилія К.*, дѣвушка 20-ти лѣтъ отъ роду, сухоощаваго сложенія, въ теченіи двухъ лѣтъ пользована была Прускими Врачами отъ плоскихъ глистовъ, и во все продолженіе лѣченія только руски оныхъ выходили. Въ 1827 году поступила она въ градскую больницу и лѣчима была по способу *Шмита*. Въ первой день употреблено было лѣченіе предуготовительное, ш. е., вечеромъ она ѣла салатъ безъ луку и корпорея, съ доспапочнымъ количествомъ перцу, масла и сыраго копченаго

ожорока; на слѣдующій день предписана ей была вышесказанная микспура, послѣ коей имѣла она пять испражнений, изъ коихъ послѣднія содержали куски плоской глисты; на третій день съ 6-ти часовъ утра начала она принимать Шмитовы пилюли, черезъ часъ по шести пилюль, и продолжала такимъ образомъ до 2-хъ часовъ послѣ обѣда; въ 6 $\frac{1}{2}$ часовъ вечера приняла споловую ложку клещевиннаго масла; до 2-хъ часовъ больная имѣла шесть испражнений, а ночью только два; во всѣхъ сихъ находились только куски плоской глисты; посему больная въ 3 $\frac{1}{2}$ часа приняла еще споловую ложку клещевиннаго масла, въ 4 часа шесть пилюль, въ 5 $\frac{1}{2}$ опять споловую ложку масла; спустя нѣсколько, имѣла она два испражнения, и въ послѣднемъ находилась глιστα, *tenia solium*, въ 2 $\frac{1}{2}$ аршина длиною.

б) Иванъ Б., пикарь, сухоощаваго сложенія, спрадавшій уже нѣсколько лѣтъ отъ плоской глисты, подверженъ былъ испытательному лѣченію въ той же больницѣ. Въ печеніи предуготовительнаго лѣченія на другой день показались куски плоской глисты въ испражненіяхъ; на третій день, при употребленіи Шмитовыхъ пилюль, вышло предъ 2-мя

часами послѣ обѣда семь плоскихъ глисповъ, каждая семь аршинъ длиною; во всѣхъ сихъ глиспахъ головки не лѣзя было примѣпипъ, даже чрезъ увеличительное стекло, хопя шейки оныхъ имѣли до двухъ линій толщины; послѣ имѣлъ онъ еще много испражнений, кои однакожь вовсе не содержали кусковъ глиспы.

с) *Вильгельмъ М.*, 24-хъ лѣтъ отъ роду, слабого сложенія, уже долгое время спрадалъ припадками отъ плоской глиспы. Въ 1827 году, принявъ клещевинное масло и другія слабительныя средства, выгналъ онъ двѣ плоскія глиспы, длиною въ два аршина, но отъ припадковъ глиспныхъ совершенно не освободился и поспунилъ въ градскую больницу, гдѣ и подверженъ былъ испытательному лѣченію. При употребленіи микстуры послѣдовало семь испражнений, не содержащихъ однакожь кусковъ глиспы. При радикальномъ лѣченіи принималъ онъ пилюли до 2-хъ часовъ, а въ 3 $\frac{1}{2}$ часа дана ему споловая ложка клещевиннаго масла, послѣ чего вышли два куска плоской глиспы, каждый длиною въ полъаршина, по изслѣдованіи коихъ оказалось, что это были

частии одной и той же глисты, съ окончаніемъ и головкою.

d) *Фридерика Б.*, дѣвушка 19-ти лѣтъ, крѣпкаго сложенія, спрадала опть плоской глисты, и куски оной показывались въ испражненіяхъ. Въ 1827 году подвергнула она себя испытательному средству *Шмита* и способу его лѣченія во всей точности. Въ первой и второй день съ начала лѣченія употребляла она предуготовительныя средства, на третій же начала принимать специфическія пилюли, и уже въ 8-мъ часу утра вышла плоская глιστα съ головкою, въ три аршина длиною; около 12-ти часовъ вышли еще двѣ плоскія глисты, такой же длины, но безъ головки, копорая легко могла быть оторвана при разсмаприваніи глистовъ. Послѣ сего при всякомъ испражненіи выходили еще куски глисты; въ 3 часа послѣ обѣда приняла она еще споловую ложку клещевиннаго масла, а на ужинъ употребила постный супъ съ сахаромъ и бѣлымъ хлѣбомъ. На слѣдующій день никакихъ слѣдовъ глисты не было замѣчено въ испражненіяхъ, и посему выписалась она изъ больницы,

Діета, при семъ лѣченіи предписанная, выполнена была въ точности при всѣхъ вышеприведенныхъ исторіяхъ.

е) *Марія Н.*, дѣвушка 26-ти лѣтъ, хорошаго сложенія, давно уже замѣтила, что въ испражненіяхъ ея были куски плоской глисты, а при употребленіи домашнихъ слабительныхъ средствъ выходили даже значительные куски оной. Въ 1827 году подвергнула она себя испытательному *Шмитову* средству, во всей его обширности. Вечеромъ, въ началѣ лѣченія, употребила сельдяной салатъ, на другой день микстуру; но куски глисты въ испражненіяхъ вовсе не появлялись. На третій день приняла она пилюли; около 10-ти часовъ утра показались куски плоской глисты въ испражненіяхъ; въ 4 часа послѣ обѣда вышла плоская глιστα съ головкою, длиною въ $\frac{3}{4}$ аршина. На четвертый день приступлено было къ профилактическому лѣченію для укрѣпленія первыхъ пушекъ и укрощенія болей, опть первыхъ средствъ происходившихъ; посему предписанъ ей былъ Elixir. augment. composit. Употребляя средство сіе нѣсколько дней, она совершенно выздоровѣла и оставила больницу.

1) *Генріетта П.*, 49-ти лѣтняя благородная вдова, удручена будучи многоразличными спраданіями, поступила въ 1827 году 3-го Октября въ градскую больницу. Уже нѣсколько лѣтъ спрадала она завалами брюшныхъ внупренностей; животъ былъ пвердый и надутый, по временамъ сильно болящій; рвопа со слизью; послѣ сладкой пищи болѣзненные припадки увеличивались; весьма неправильныя испражненія, въ коихъ еще до вступленія въ больницу показались куски плоской глисты. При паковомъ многоразличномъ спраданіи сначала надлежало поправить общее ея болѣзненное состояніе извѣстными средствами. Послѣ сего приступлено было къ противуглистному способу по правиламъ *Шмита*. Сначала употребляла она салапъ; на другой день предписанъ былъ *pulvis probatorius Schmidt*, послѣ чего куски глисты показались въ испражненіяхъ; за симъ употребляла она микстуру, отъ коей послѣдовала рвопа нѣсколько разъ; на третій день приняла пилюли, и около 9-ти часовъ упра вышли куски плоской глисты. Больная отъ сихъ средствъ весьма ослабѣла, и при вообще разспроенномъ состояніи ея здоровья не льзя было безъ влщшаго вреда продолжати

оныя; посему пипательною діешою и горькими средспвами нужно было силы ея укрѣпить и поправить общее состояніе; послѣ сего выписалась она изъ больницы.

Изъ всѣхъ сихъ врачебныхъ опытовъ, Главными Врачами въ больницѣ произведенныхъ, явспвуетъ, что *Шмитово* средспво и способъ лѣченія опгъ плоскихъ глсповъ, по своей вѣрности, скорости и безопасности, предъ прочими особенное заслуживаетъ вниманіе; и хопя средспво сіе, такъ какъ и всѣ доселѣ извѣстные специфики сего рода, не можетъ назваться во всѣхъ случаяхъ совершенно надежнымъ, но при всемъ томъ соспавляетъ величайшее обогащеніе пракпической Медицины.

Л. Саковичъ.

III.

ВРАЧЕВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ РОЖ- КОВЪ РЖИ, SECALE CORNUTUM.

Въ большемъ количествѣ употребленные рожки ржи оказываютъ на организмъ вредное дѣйствіе, но въ надлежащихъ приѣмахъ составляютъ полезное лѣкарство. Уже издавна извѣстно, и припомъ въ разныхъ справахъ, дѣйствіе ихъ на мапку. Спарухи, повивальныя бабки, знахари и проспонародныя Лѣкари уже давно знали и употребляли сіе средство (по Нѣмецки рожки называются Mutterkorn, мапочная рожь); но когда оно введено въ число лѣкарствъ, эшо неизвѣстно. *Жофруа* *) говоритъ, что *К. Баугинъ* употреблялъ рожки противъ непомѣрнаго мѣсячнаго кровоочищенія. Въ Марбургѣ въ одной аптекѣ чрезъ долгое время приготавливали

*) Tractatus de Materia medica. Tom. II. p. 242.

возбуждающій потуи порошокъ, который состоялъ преимущественно изъ рожковъ.

Въ 1778 году Ганноверское Правитель-ство запретило повивальнымъ бабкамъ упо-треблять рожки. Таковое же запрещеніе послѣдовало и въ другихъ Нѣмецкихъ госу-дарствахъ, и средство сіе въ печеніи нѣ-сколькихъ лѣтъ было совсѣмъ забыто Вра-чами. Лѣтъ за 20 оно опять явилось въ чис-лѣ лѣкарствъ въ Америкѣ, подъ названіемъ *pulvis parturiens*, а опшуда перешло въ Евро-пу и заслужило почти единогласное одобре-ніе всѣхъ испытавшихъ его дѣйствіе Врачей разныхъ націй *).

Въ слѣдствіе собранныхъ понынѣ нема-лочисленныхъ наблюденій рожки ржи оказа-лись полезными наипаче въ слѣдующихъ слу-чаяхъ.

*) Кромѣ частныхъ наблюденій и замѣчаній о пользѣ рожковъ при родахъ, помѣщенныхъ въ разныхъ Журналахъ, особливый о семъ предме-тѣ сочиненія суть: *Mémoire historique sur l'emploi du seigle ergoté, pour accélérer ou déterminer l'accouchement*, и проч. Par M. Vil-leneuve. Paris. 1827.

On difficult cases of parturition and the use of ergot of the rye. by W. Michell. London, 1828.

1. При слабыхъ и рѣдкопоявляющихся потугахъ впротѣхъ правильныхъ родовъ. Слабость и недостатокъ потугъ зависятъ частію отъ слабости всего тѣла, просширающейся и на мащку, а частію отъ слабости сего органа, произведенной ея разслабленіемъ (atonia), раннимъ вынужденіемъ потугъ, являющимися прежними родами, выкидыщами и другими подобными причинами, и употребляя употребленія рожковъ. Средство сие лучше всего давать въ то время, когда мащонное рыльцо расширилось величиною въ серебряный рубль или болѣе. Употребленное прежде того, оно не только не окажетъ желаемого дѣйствія, но еще напротивъ того причинитъ вредъ, возбудитъ преждевременное сжиманіе всей мащку, слѣдовательно и мащочной шейки и рыльца, воспрепятствуетъ разрыву пузыря и выходу младенца и наконецъ подвергнетъ роженицу опасности разрыва мащки, не говоря уже о бесполезныхъ потугахъ и другихъ спораданіяхъ.

2. При родахъ медленныхъ съ рѣдконаступающими потугами. Иногда у самыхъ крѣпкихъ женщинъ флегматическаго темперамента роды идутъ очень тихо и медленно.

Сія недѣлительность матки, соединенная иногда со слабостію ея, особливо у женщинъ, въ роскоши живущихъ или весьма бѣдныхъ, преодолевается упопребленіемъ рожковъ, которые здѣсь скоро довершаютъ благополучное для матери и для младенца разрѣшеніе.

3. *Когда мертвый младенецъ весьма долго остается въ маткѣ.* Если по обыкновеннымъ признакамъ можно навѣрное полагать, что зародышъ уже умеръ, то рожки, возбуждая въ маткѣ сокращенія, изгоняютъ изъ нее мертвую и вредную массу, могущую причинить матери опасную болѣзнь.

4. *При кровотеченіяхъ изъ матки во время родовъ, происшедшихъ отъ преждевременнаго отдѣленія послѣда.* Если шолько дѣшское мѣсто не лежитъ въ маточномъ опверстіи (placenta praevia), то гдѣ бы онъ ни находился, кровотеченіе останавливается чрезъ сокращеніе матки, съ которымъ вмѣстѣ сжимаются или запираются успія кровопочивыхъ сосудовъ.

5. *При маточныхъ кровотеченіяхъ послѣ родовъ, зависящихъ отъ слабости матки.* Въ сихъ случаяхъ, когда послѣдъ уже опча-

спя или и совсѣмъ опдѣлился, но малюка, такъ сказать, упомянутая во время родовъ, поперяла способность сокращаться, рожки ржи поощасть придають ей къ тому силу.

6. *Для изгнанія послѣда.* Для сего на-мѣренія надлежитъ употреблять сіе средство только въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ, по правиламъ Родовспомогательной Науки, нужно опдѣлить послѣдъ искусственно.

7. *Для отвращенія кровотеченія послѣ родовъ у тѣхъ роженяцѣ, кои омыли страдали послѣ прежнихъ разрѣшеній.* Въ сихъ случаяхъ рожки нужно употреблять въ малыхъ приемахъ, дабы они возбуждали только умѣренное сокращеніе матки и ея сосудовъ.

8. *Для уменьшенія неполнѣрнаго послѣ родового отищенія.* Сей припадокъ случается не только у женщинъ весьма полнокровныхъ, но иногда и при умѣренномъ количествѣ жизненной жидкости въ организмъ. Такое неполнѣрное испражненіе можно содержать въ надлежащихъ границахъ чрезъ сооплѣтспивенное употребленіе рожковъ.

9. *При искусственно возбужденныхъ преждевременныхъ родахъ* (partus praematurus arte

✱

provesatna). По искусственному расширеніи маточнаго рыльца и разорваніи оболочек яйца рожки возбуждаютъ сжиманіе матки, изгоняють зародышъ и опивращаютъ могущее попомъ воспослѣдовать кровотеченіе.

40. При заперѣ мѣсячныхъ кровей отъ слабости матки. Нѣкоторые Врачи утверждаютъ, что рожки въ сей болѣзни не у мѣста и производили худыя послѣдствія; по замѣчаніямъ другихъ они, пусть не оказываютъ никакого дѣйствія и обнаруживаютъ оное только на беременную матку. Причина худыхъ послѣдствій, вѣроятно, заключается въ особенномъ способѣ дѣйствія рожковъ. Они возбуждаютъ дѣятельность матки, увеличиваютъ ея сжимательность и тѣмъ приводятъ ее въ состояніе, противоположное прежнему, слишкомъ возвышаютъ ея крѣпость (hypertonia), которая также препятствуетъ мѣсячному кровоочищенію. Въ малыхъ, постепенно возвышаемыхъ приемахъ средство сіе въ сказанной болѣзни можетъ быть весьма полезно.

Кромѣ исчисленныхъ случаевъ рожки ржи можно испытать еще въ слѣдующихъ:

1. При матотномѣ кровотеченіи *появѣ* *выкидыша* (metrorrhagia abortiva).

2. При опасности *выкинутія* по *прити-*
нѣ *слабости* *матки* (въ *малыхъ* *пріемахъ*).

3. При *скрытнои* *кровотеченіи изъ* *мат-*
ки (metrorrhagia occulta).

4. При *двойняхъ*, для *ускоренія* *вторыхъ*
родовъ, *п. е.*, когда по *рожденіи* *перваго* *мла-*
денца *попуги* *прекрапились*.

Воспрещается употребленіе *рожковъ* при
слѣдующихъ *обстоятельстввахъ*:

1. Когда *матотное* *рыльцо* *еще не* *от-*
крылось (въ *нѣкопрыхъ* *случаяхъ*).

2. При *полнокровіи* *матки* и *сильнои*
притегеніи *крови* *къ* *оной* (по *крайней* *мѣрѣ*
не *прежде*, *какъ* по *едѣланіи* *кровоиспраж-*
ненія).

3. При *сильныхъ* *потугахъ*.

4. При *ущемленіи* *послѣда*.

5. При *крѣпкои* *срощеніи* *послѣда* *съ*
маткою.

6. При *воспаленіи* *матки*.

7. При *судорогахъ* и *другихъ* *нервныхъ*
припадкахъ: *рвотѣ*, *болѣ* *головы* и *проч.*

8. При *малои* *количествѣ* *дѣтскихъ*
водъ.

9. При заворотѣ, выпаденіи, косвеннолиб положеніи матки.

10. При неправильнолиб образованіи таза.

11. Когда послѣ прежнихъ родовъ очищеніе совершалось худо (schlimm).

12. У женщинъ нѣжныхъ и весьма чувствительныхъ.

13. При уродливости младенца, головной водяной болѣзни онаго.

14. При худосотіи всего тѣла.

15. У женщинъ истерическихъ и страдавшихъ потугами до беременности.

Дѣйствіе рожковъ на матку обнаруживается чрезъ нѣсколько минушъ по принятіи оныхъ, что въ опасныхъ положеніяхъ, какія при родахъ случаются, весьма важно. Ненадлежащимъ образомъ или не во время употребленное сіе средство, вмѣсто пользы, можетъ причинить вредъ. Нерѣдко оно задерживаетъ послѣродовое очищеніе; въ большихъ приѣмахъ возбуждаетъ столь сильныя сокращенія матки, что подвергаетъ ее опасности разорваться. Въ большемъ количествѣ принятыя рожки производятъ шошному, годовокруженію, потерю аппетита, запоръ на

низъ, слабость, судороги и другіе тому подобныя припадки.

Приемы рожковъ, какъ и всякаго другаго лѣкарства, должны быть различны, по различію тѣлосложенія женщины, состоянія матки, другихъ припадковъ и доброты лѣкарства. При вяломъ, флегматическомъ тѣлосложеніи и зависящихъ отъ того медленныхъ родахъ приемы должны быть больше, нежели при большой раздражительности тѣла. Старое, худосбереженное лѣкарство, какъ удобопонятно, дѣйствуетъ гораздо слабѣе, нежели свѣжее, хорошо пригошовленное.

Самое лучшее время для собиранія рожковъ есть жатва ржи, когда себелъки совсѣмъ высохли. Въ сіе время они бывають зрѣлы и годны для врачебнаго употребленія. Надлежитъ выбирать рожки плошныя, мало надгрызенныя, очищать ихъ отъ пыли и постороннихъ примѣсей и сберегать въ прокладномъ и влажномъ мѣстѣ. Поелику отъ долгаго лежанія теряють они свою силу, то лучше, гдѣ можно, всякой годъ заготовлять свѣжіе.

Рожки можно давать въ разныхъ видахъ, а именно: въ порошокъ, наливкѣ, отварѣ и

настойкѣ, которые обыкновеннѣе пригошов-
ляются слѣдующимъ образомъ:

Rp. Pulv. Secal. cornut. recentis drachm.
dimidiam—unam.

Pulv. radic. glycyrrhisæ gl.

----- graminis,

-----gummi acaciæ veræ aa drach. unam.

M. f. pulv. divid. in tres partes aequal.

S. Черезъ четверть часа по порошку; по-
ка воспослѣдуетъ дѣйствіе.

Rp. Secal. cornuti recent. contusi

drach. unam—unam et dimidiam.

Herbæ veronicæ officin. drachm. unam,

infunde aquæ ferventis s. q. Colat.

refrigeratæ unciar. quatuor adde

Eleosachari citr. drachm. duas,

----- cinnam. drachm. unam.

M. S. Черезъ четверть часа по столовой
ложкѣ.

Rp. Secal. cornut. recent. contusi

drachm. unam et dimid.

Coque cum aquæ commun. uncis octo,

ad reman. unciar. quinque

Colaturæ refriger. adde

Syrupi fœniculi drachm. duas.

M. S. Черезъ четверть часа по столовой ложкѣ.

Rp. Secalls cornuti recent. contusi unciam
dimidiam,

infunde

Alcoholis vini unc. sem,

Stent in digestionem per quadriduum,
tunc liquor coletur et usui servetur.

Прієлѣ. 15 - 20 капель каждую четверть часа.

Порошокъ и отваръ дѣйствительнѣе наливки (infusum), а настойка (tinctura) не надежна.

Rust's Magazin. Bd. 25. Heft 2.

Г. Вильневъ въ вышеприведенномъ сочиненіи между прочимъ замѣчаетъ, что во всѣхъ эпидеміяхъ, произведенныхъ употребленіемъ въ пищу рожковъ вмѣстѣ съ хлѣбомъ, не замѣчено выкидышей, которые можно бы приписать ихъ вліянію. Выкидыши, говоритъ онъ, случившіеся во время употребленія таковаго испорченнаго хлѣба, вослѣдовали не въ началѣ употребленія онаго, но уже въ то время, когда появлялись признаки изнеможенія и разрѣшенія всего организма; и потому ихъ не лзя было приписать особенному дѣйствию рожковъ на матку, но они происходили отъ глубокаго раз-

спройства всего организма, какъ это случается при жестокихъ механическихъ поврежденіяхъ, въ шрудныхъ оспрыхъ и хроническихъ болѣзняхъ. Онъ поспавляетъ общимъ правиломъ, что рожки надлежитъ упопрелять для ускоренія родовъ только тогда, когда медленность ихъ зависитъ отъ недостаточной сократительности или сжимаемости матки. Частныя, имъ отсюда выведенныя правила сходны съ вышеизложенными. По замѣчаніямъ Англійскаго Акушера *Дависа* рожки уничтожаютъ судорожное состояніе матки и возбуждаютъ сокращенія маточной шейки. Рецензентъ сочиненія Г-на *Вильнева* въ *Gazette de santé* замѣчаетъ слѣдующее весьма важное, нерѣдко встрѣчающееся и Г-мъ *Вильнесомъ* пропущенное обстоятельство. Дѣйствіемъ слабыхъ и продолжительныхъ попуговъ головка младенца проведена въ малый пазъ и тамъ остановилась по причинѣ истощенія силъ и совершенной медѣлтельности матки. Что пуговъ предпринять? Извлечь младенца щипцами. Но какъ остановить опасное кровотеченіе, которое неминуемо воспослѣдуетъ, если сжимательность матки по извлеченіи младенца не возстановится? Сей опас-

ный припадокъ можно опшвращитъ упопреленіемъ рожковъ въ шо время, когда прикладываются щипцы.

Г. *Вильневъ* почипаетъ также полнокрое главнымъ и весьма важнымъ прошивопоказаніемъ къ упопреленію рожковъ и согласенъ съ *Прескотомъ*, что гдѣ слѣдуетъ сдѣлать кровопусканіе, шамъ упопреленіе рожковъ воспрещаетъ, и на оборотъ.

Въ порошокъ, вмѣстѣ со многими другими Французскими Врачами почипаетъ онъ рожки дѣйствительнѣйшими для сказаннаго намѣренія, нежели въ другомъ какомъ либо видѣ. Г-жа *Лашапелъ* (главная повивальная бабка Парижскаго родильнаго дома, извѣстная и своими сочиненіями по части Акушерства и женскихъ болѣзней) не имѣла желаемаго дѣйствія отъ упопреленія сего средства, вѣроятно попому, что она давала его въ наливкѣ или опварѣ, примѣчивая къ пому и порошокъ. Г. *Вокаленъ* нашелъ въ рожкахъ, кромѣ другихъ химическихъ составныхъ частей, свободную кислороду, опчасти подобную фосфорной, и свободный амміакъ, коихъ не лзя получить при темперашурѣ кипящей воды. Можетъ бытъ, сіи вещества измѣняются дѣйствіемъ

щеплопы. Для женщинъ, которыя не могутъ приниматьъ рожковъ въ порошокъ по причинѣ непріятнаго запаха, можно смѣшивать оныя съ веществами, уничтожающими сей запахъ. Мяльное масло совершенно соотвѣтствуетъ сему намѣренію. Г. Вильневъ прописываетъ рожки слѣдующимъ образомъ:

Rp. Pulv. Secal. cornuti drachm. unam,

Syrupi simpl. unc. unam et simis,

Olei menthæ gutt. tres.

Misce in mortario.

Кашельно времени дѣйствія рожковъ Г. Вильневъ приводитъ слѣдующія наблюденія Г-на Прескота (Prescot). Изъ двадцати случаевъ дѣйствіе рожковъ оказалось въ двухъ чрезъ 7 минутъ, въ чепырехъ чрезъ 8, въ трехъ чрезъ 11, въ трехъ чрезъ 15, въ чепырехъ чрезъ 20. Если дѣйствіе рожковъ не обнаружилось чрезъ полчаса отъ начала ихъ употребленія, то это показываетъ, что они не могутъ возбудить пошугъ. Г. Вильневъ не замѣнилъ никакихъ худыхъ послѣдствій, которыя можно бы приписать употребленію сего средства.

И. Ч.

IV.

СЕЛИТРО-СОЛЯНОКИСЛЫЯ ВАННЫ, КУРЕНІЯ ХЛОРИНОМЪ И ВАННЫ ИЗЪ ОНАГО.

Сообщилъ Профессоръ А. Нелюбинъ.

I. Селитро-солянокислыя ванны.

Историческое извѣстіе.

Хотя первоначальное употребленіе сихъ ваннъ и приписываютъ Англійскимъ Врачамъ, но съ нѣкоторою вѣроятностію должно полагать, что онѣ гораздо прежде того были уже употребляемы простымъ народомъ во многихъ государствахъ Европы. Кому не извѣстно исцѣленіе ломотныхъ болѣзней помощію обмыванія всего тѣла крѣпкою водкою (Aqua fortis)? Въ Россіи между простымъ народомъ сей способъ лѣченія употребляется уже издавна. Въ Англіи, по свидѣтельству нутреннеспивенниковъ, у простаго на-

рода былъ онъ также не безызвѣстенъ. Врачи, какъ надлежитъ полагать, видя успѣшное исцѣленіе многихъ недуговъ сею кислотою, обратили на оную вниманіе и приспособили сей способъ лѣченія къ другимъ болѣзнямъ. Докторъ *Скоттъ* въ Индіи первый испыталъ опличное дѣйствіе сихъ ваннъ въ болѣзняхъ печени. Сіе также подтвердили собственными опытами *Белль*, *Джонсонъ*, *Данлопъ* (W. Danlop), *Валласъ* (Wallas) и *Коксъ*. Способъ сей вскорѣ распространился во всей Англіи и имѣлъ желаемый успѣхъ. Докторъ *Дорферъ* (Dorfer) въ Вѣнской больницѣ произвелъ недавно любопытные и при томъ весьма счастливые опыты исцѣленія сими ваннами болѣзней печени, и теперь нималѣйшаго не оспаривается сомнѣнія на счетъ вѣрнаго и надежнаго излѣченія сихъ болѣзней селипро-солянокислыми ваннами.

Динамитическое дѣйствіе.

Изъ употребленія селипро-солянокислыхъ ваннъ оказывается, что онѣ составляютъ проникающее, дѣйствующее на репродуктивную, мышечную и нервную системы лѣкарство. По употребленіи сихъ ваннъ обна-

руживается обильная испарина въ кожѣ, возбуждающая у чувствительныхъ особъ нѣкоторое непріятное чувство въ нервахъ, сопровождаемое слабостію шѣла, а иногда и обморокомъ. Во рту ощущается металлическій, какъ бы мѣдяный вкусъ. При дальнѣйшемъ употребленіи ваннъ образуются часпю въ полости рта пятнушки, иногда же пузырьки, переходящіе въ поверхностныя язвы. Отдѣленіе слюны увеличивается и нѣрѣдко переходитъ въ наспоящее слюнопеченіе, но безъ всякой опухоли десенъ и дурнаго запаха изо рта, чѣмъ и опличается отъ меркуріальнаго слюнопеченія. Спрандіе зубовъ бываетъ незначиштельно и скоро проходитъ. Пульсъ примѣшно ускоряется, кругообращеніе крови спановишся живѣе, отдѣленіе въ кожѣ увеличивается, оказывается зудъ, а иногда слѣдуютъ за онымъ гнойныя сыпи. Сіи ванны наиболѣе оказываютъ дѣйствіе свое на печень и вспомошествоуютъ отдѣленію желчи, а вмѣстѣ съ шѣмъ и испражненію низомъ. Моча принимаетъ кислое качество и отдѣляется въ болѣшемъ проливу обыкновеннаго количества.

Болезни, въ коихъ солитро-солянокислыя ванны употребляются.

1. **Болезни сиапелы, воротной вены,** въ особенности же **печени**. Къ нимъ слѣдуетъ отнести:

а) **Болезненнымъ образомъ умноженное,** равно какъ и **уменьшенное отдѣленіе желчи,** сопровождаемое **головокруженіемъ, желудочною и головною болью, безпокойнымъ сномъ, многими нервными болезнями и самими горячками.**

б) **Желтяница (Icterus) и желчная колика,** происходящія отъ **многожелчія (Polycholia).**

с) **Отвердѣніе печени (Hepatemphtaxis) и** отъ онаго происходящія: **водяная болѣзнь, перемежающіяся лихорадки, ипохондрія, истерика, гемороидалыя припадки, меланхолія, неправильное мѣсячное кровоочищеніе, дѣвичья немочь, сухопка, болѣзни сердца, на-кожныя сыпи и другіе многіе недуги.**

д) **Печеночныя нарывы, узловатыя отвердѣнія, переходящія въ нагноеніе и черновисныя опухоли печени (Melanosis).**

Въ приведенныхъ здѣсь болѣзняхъ печени Докторъ Скоттъ, Джонсонъ и Валласъ употребляли селипро-солянокислыя ванны съ большимъ успѣхомъ.

2. *Хроническія накожныя сыпи* (morbi cutanei chronici), какъ то: злокачественная чесотка, парши на головѣ, лишай, проказа и другіе сего рода недуги исцѣляются легко сими ваннами и даже однимъ обмывеніемъ тѣла.

3. *Венерическая болѣзнь* (Syphilis). Белье совѣдуетъ употреблять сіи ванны, когда распознаваніе болѣзни бываетъ не совсѣмъ вѣрное и когда подозрительныя сыпи и язвы, покрывающія лице и другія части тѣла, суть либо венерическаго качества или опъ злоупотребленія ртутныхъ лѣкарствъ происшедшія.

4. *Хроническій ревматизмъ* (Rheumatologia) и ломотныя болѣзни могутъ также быть излѣчены сими ваннами.

Приготовленіе и употребленіе ваннъ.

Докторъ Скоттъ употреблялъ селипро-солянокислыя общія ванны. Впрочемъ признается весьма доспапочнымъ погружать однѣ только ноги по колѣна или нѣсколько

выше оныхъ (Lavagna). Для сего берутся 4 унціи крѣпкой селипреной и соляной кислоты и 40 унцій воды. Для ваннъ средней крѣпости берется отъ $\frac{1}{2}$ до 2-хъ унцій селипро-соляной кислоты (составленной изъ 1 чашки селипреной и 2-хъ частей соляной кислоты) на 3 фунта рѣчной воды. Смѣшеніе сіе подогревается до $+26$ или $+28^{\circ}$ Р. ш. и вливается въ деревянный узкій сосудъ, въ который больной погружаетъ ноги и держитъ отъ 20 до 30-ти минутъ каждый вечеръ или черезъ день. Одна и та же жидкость можетъ быть употребляема до 4-хъ разъ. На сей конецъ хранится она въ деревянномъ сосудѣ и предъ всякимъ употребленіемъ разогревается въ глиняномъ сосудѣ, либо помощію разгоряченныхъ голышевыхъ камней.

Вмѣсто ножныхъ ваннъ во многихъ случаяхъ бываетъ доспапочно производить одно только обмоченіе пѣла, наипаче женщинамъ и дѣтямъ. Для сего 2 драхмы селипреной кислоты либо Царской водки (aqua regia) смѣшиваются съ 16-ю унціями горячей воды. Сею смѣсью напиывается нѣжная грѣцкая губка и помощію оной производится обмоче-

ніе груди, брюха, верхнихъ и нижнихъ конечностей въ продолженіи 10 или 15-ти минутъ ежедневно, либо черезъ день.

Докторъ *Геннингъ* излѣчилъ чешуеобразную сыпь (*Ichtyosis*) помощію обмывенія сею смѣсью, составленною изъ 1 драхмы *aquæ regię* и 2-хъ фуншовъ воды.

Надлежитъ замѣтить, что не иначе какъ принадлежащей вегетации организма и правильномъ оппавленіи репродуктивной системы можно ожидать пользы отъ сихъ ваннъ; въ прошивномъ случаѣ успѣхъ бываетъ сомнителенъ. Въ упорныхъ случаяхъ, неуспѣвающихъ дѣйствовать сего средства, должно прибѣгать къ слѣдующимъ хлориновымъ ваннамъ:

II. Куреніе хлориновъ и ванны изъ онаго.

Историческое извѣстіе.

Со времени открытія хлорина *Шеелѣмъ*, въ продолженіи послѣднихъ 50-ти лѣтъ весьма много сдѣлано Химіею и оппѣнно мало Врачебною Наукою въ пользу сего средства. Медленность сію и невниманіе Врачей надлежитъ приписать наиболѣе боязни и нерѣшительности употреблять хлоринъ въ видѣ

*

пара, который весьма проникателенъ и сильно дѣйствуетъ на дыхательные органы. *Валласъ* былъ первый, рѣшившійся употреблять хлоринъ въ видѣ пара. Успѣшное излѣченіе накожныхъ болѣзней селипро-солянокислыми ваннами, которое *Валласъ* приписывалъ единственно хлорину, въ оныхъ образующемуся, подало ему поводъ испытать оный въ тѣхъ же болѣзняхъ, въ коихъ употреблены были первыя. Предположеніе сіе оказалось совершенно справедливымъ. Изъ многихъ опытовъ, произведенныхъ сначала надъ самимъ собою, а потомъ и надъ другими, *Валласъ* удостовѣрился, что хлориновыя пары и таковыя же ванны не только сходствуютъ дѣйствіемъ своимъ съ селипро-солянокислыми ваннами, но во многомъ превосходятъ оныя.

Дѣйствіе паровъ и хлориновыхъ ваннъ.

Хлоринъ, доведенный до температуры 110-ти градусовъ *Фаренгейтова* термометра и соединенный съ достаточнымъ количествомъ водяныхъ паровъ и атмосфернаго воздуха, производитъ въ кожѣ, по прошествіи 10-ти минутъ, чувство, подобное ужаленію малыми

насъкомыми. Въ тоже время оказываеяся обильная испарина на всемъ тѣлѣ, сопровождаемая иногда палящимъ жаромъ. Накожные сыпи и маленькіе прыщички, сопряженные съ болью, часто подають поводъ къ благопріятному заключенію о счастливомъ исходѣ болѣзни. Опъ усиленія гаса и теплоты до $+ 130^{\circ}$ Фаренгейтова термометра, при продолжительномъ (полчаса) дѣйствіи на кожу, вышеприведенные припадки увеличиваюяся; зудъ въ кожѣ часто переходитъ въ жгучую нестерпимую боль; краснота общихъ покрововъ, сыпи, подобныя корѣ, а иногда и отдѣленіе верхней кожицы бывають слѣдствіемъ употребленія сего гаса. Хлоринъ умножаетъ также отдѣленіе слюны, образуешь язвы во рту, глоткѣ и пищепріемномъ горлѣ. Чувство сжимаемости на языкѣ и оскомины на зубахъ случаюяся у бѣльшей части субъектовъ. Отдѣленіе желчи и мочи примѣрно увеличивается, дыханіе ускоряется, равно и кругообращеніе крови дѣлается живѣе, опъ чего больные спановаяся веселѣе и бодрѣе.

Болезни, въ коихъ пары и хлориновыя ванны употребляются.

Хлоринъ составляетъ проникающее, постоянно дѣйствующее и сильно раздражающее кожу средство. Онъ усиливаетъ кругообращеніе крови и вмѣстѣ съ тѣмъ умножаетъ отдѣленіе испарины, мочи, въ особенности же желчи и другихъ влаги въ тѣлѣ. Посему хлориновыя ванны наиболѣе приличествуютъ въ болезняхъ хроническихъ, происходящихъ отъ слабости (atonia) репродуктивной системы и упадка силъ въ отдѣлительныхъ органахъ. Къ онымъ слѣдуетъ отнести:

1. *Болезни печени.* Сии недуги столь многоразличны и сопровождаются столь великимъ числомъ особенныхъ припадковъ, что здѣсь исчислить оныя не возможно. Хлориновыя ванны бываютъ полезны токмо въ тѣхъ недугахъ печени, кои происходятъ отъ недѣлительности сей внутренности и ея слабыхъ отдѣлительныхъ силъ. Сюда надлежитъ отнести всѣ тѣ болезни, кои выше сего исчислены и многія другія, имѣющія общее съ ними происхожденіе.

2. Венерическая болѣзнь.
3. Хроническія кожные сыпи.
4. Ломотныя болѣзни.
5. Золотуха.
6. Болѣзни катарральныя.

*Приготовленіе и употребленіе паровъ и
хлориновыхъ ваннъ.*

Валласъ, а съ нимъ и другіе Врачи, совѣ-
щаютъ производить окуриваніе хлориновыми
парами въ снарядъ *Галеса* или *Ассалини*,
употребляемыхъ для сѣрныхъ куреній. Сна-
рядъ, исправленный *Шпабъ-Лѣкаремъ Клей-*
неке, служащимъ при С. Петербургской во-
енносухопутной госпитали, по мнѣнію моему,
имѣетъ преимущество предъ другими, какъ
по простотѣ своей, такъ и по совершенству
изобрѣщенной имъ замшевой повязки, покрывающей всю волосистую часть головы и весьма плотно прилегающей ко лбу и вискамъ и завязываемой подъ подбородкомъ.

На сей конецъ больной садится на скамейку, въ снарядъ имѣющуюся, просовываетъ голову чрезъ люкъ аппарата наружу и тогда же надѣваетъ на голову повязку и крѣпко за-
тягииваетъ ее шнурами подъ подбородкомъ.

Въ нижнюю часть снаряда вкладывается раскаленный булыжный камень, который поливается водою до тѣхъ поръ, пока температура въ ящикѣ возвысится до $+115^{\circ}$ Фар. ш. Тогда пропускается немедленно хлориновый газъ, опредѣляющійся изъ реторпы, подогреваемой лампаднымъ огнемъ. Для каждого окуриванія берущся 3 лоша поваренной соли, 1 лошъ чернаго марганцоваго окисла, 2 лоша сѣрной кислоты и шаковое же количество воды. Количество пропускаемаго газа должно соотвѣтствовать пространству снаряда, раздражительности больного и чувствительности кожи. Время, потребное для сихъ курений, опредѣляется жженіемъ кожи и слѣдующимъ за тѣмъ головокруженіемъ. Для сего достаточно 10-ти и ошнюдь не болѣе 30-ти минутъ.

Неизлишнимъ считаю замѣнить, что при всемъ совершенствѣ аппарата и при всѣхъ предосторожностяхъ никоимъ образомъ нельзя успранить прохожденія тонокихъ паровъ хлорина и сильнаго ихъ дѣйствія на дыхательные органы. По сей причинѣ совѣтую прибѣгать къ употребленію общей или част-

ной хлориновой ванны. Для составленія первой напишываюся 4 ведра холодною рѣчной воды хлориновымъ газомъ; послѣ чего сія жидкость вливается въ обыкновенную деревянную ванну и прибавляется къ оной горячей воды столько, чѣмъ температура ванны получила отъ 30—32° Р. н. При употребленіи общей ванны больные должны держать голову внѣ оной; самая же ванна покрывается плотно одеялами.

Ножныя ванны съ равною пользою могутъ быть употребляемы въ болѣзняхъ печени, какъ и общія, исключая кожныхъ болѣзней, гдѣ послѣднія имѣютъ преимущество.

Не могу утверждать положительно, но смѣю думать, что хлоридная извѣсть во многихъ случаяхъ можетъ замѣнить пары и хлоридныя ванны. Желательно, чѣмъ Врачи обратили на сіе обстоятельство особенное вниманіе. Для сего можно бы брать отъ 1 — 2-хъ фунтовъ хлоридной извести (*Chloruretum calcis exsiccatum*) на 8 или 10 ведеръ теплой рѣчной воды. Для увеличенія дѣйствія плаковой ванны можно прибавить $\frac{1}{2}$ фунта сѣрной кислоты; чрезъ сіе обра-

зуется сѣрноокислая известь, упдающая на дно и въ поже время хлоринъ соединяется съ водою и соспавляетъ хлориновую ванну въ самое крапчайшее время, и припомъ довольно дешево.

При упопробленіи сихъ ваннъ надлежитъ поддерживать очищеніе кишечнаго канала легкими слабительными.

V.

КЛИНИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ И ЗАМѢЧАНІЯ ПРОФЕССОРА П. ЧАРУКОВСКАГО,

I. Бѣлая горячка, *febris metisthica*,

Мужчина за 60 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія и еще въ силахъ, тихаго нрава, характера твердаго, даже до упрямства, холостый и жившій одинъ, при хорошемъ дослужкѣ, въ теченіи своей жизни, кромѣ одного довольно жестокаго и упорнаго ревматизма въ ногахъ, за три года не страдалъ никакими болѣзнями и не употреблялъ никакихъ лѣкарствъ, но уже съ давняго времени подверженъ былъ излишнему употребленію спиртныхъ напитковъ, никогда впрочемъ не доходившему до опьяненія *),

*) Сіе замѣчено въ болѣеи части случаевъ сей болѣзни, и теперь я знаю трехъ шаковыхъ больныхъ.

и опъ того уже нѣсколько разъ имѣлъ не-
большіе приступы бѣлой горячки, которые
однако проходили опъ слабительнаго, движе-
нія на свободномъ воздухѣ и шренія лица
льдомъ. 15-го Марша сего года, послѣ пяти-
недѣльнаго запоя, прекращеннаго однако уже
дней за восемь, начали ему предспавляться
опличающіе сію болѣзнь разные призраки, ко-
порые завели его слишкомъ далеко опъ его
жилища, безъ всякаго впрочемъ вреда какъ
для него самаго, такъ и для другихъ. Узнавъ о
состояніи больного, ближайшіе его родспвен-
ники призвали къ нему Врача, какого скорѣе
опыскашь могли и извѣспнаго больному по
имени и по должности.

Не видя въ шеченіи прехъ или чешырехъ
дней никакого успѣха опъ своего лѣченія,
сказанный Врачъ пригласилъ себѣ въ помощь
другаго; но какъ и спараніе обоихъ было не
болѣе успѣшно, и безпокойство больного, при-
зраки и безсонница продолжались безпрерывно
болѣе недѣли: по родспвенники больного рѣ-
шились искашь помощи далѣе и 24-го Марша
пригласили на совѣштъ меня и еще одного
больному знакомаго, опышнаго Врача.

Собравшись къ больному въ 12 часовъ, мы узнали отъ пользовавшаго Врача, что употребленныя донинѣ средства были преимущественно пропивувоспалительныя, а именно: больному два раза спавили пиявки, однажды къ головѣ, а въ другой разъ къ поясицѣ, попомъ пускали кровь изъ руки, прикладывали ледъ къ головѣ, мушки между лопатокъ и горчицу къ икрамъ, давали слабительныя и прохлаждающія лѣкарства, и сверхъ того больной принялъ шестнадцать гранъ опія, въ пріемахъ отъ четверти до полграна чрезъ два или три часа. Больного нашли мы въ постели; онъ былъ въпревоженъ нашимъ посѣщеніемъ и несговорчивъ; лице нѣсколько блѣдное, языкъ влажный, бѣловатый, температура тѣла мало возвышенная, кожа мягкая, безъ пота, пульсъ не очень частый, полный, некрѣпкій, небольшое дрожаніе рукъ, брюхо мягкое, безъ боли. Положено давать больному по два грана опія и по три грана сладкой ртутки въ порошокъ, каждые два часа, пока уснетъ, и слизистое питье.

25-го, въ 11 часовъ утра. Вчера больной принялъ первые четыре порошка неохотно,

и большею частью ихъ выплеваль; послѣдніе чепыре проглотилъ хорошо; вскорѣ послѣ послѣдняго, приняшаго около полуночи, уснулъ и спалъ часовъ 8 - 9 довольно крѣпко. Теперь въ памяти; жалуется на слабость всего тѣла, тяжесть и шумъ въ головѣ и боль въ правой икрѣ послѣ горчичниковъ. Положено прописать микстуру cum aceto camphorato, а потомъ употреблять горькія, легкокрѣпительныя средства, съ кислыми Галлеровыми каплями, смотря по обстоятельству.

29-го. Больной просилъ меня чрезъ одного изъ своихъ родственниковъ, чтобы я взялся его пользоваться, поелику прежній его Врачъ самъ заболѣлъ. Я нашелъ его лежащимъ въ постели, въ памяти, но очень слабымъ, впрочемъ безъ особенныхъ припадковъ, кромѣ, что его не слабило болѣе сутокъ, и онъ жаловался на боль правой икры, гдѣ я увидѣлъ язву, величиною во всю ладонь съ перстами, вялую, нечистую, блѣднобагровую. Внутрь: Submur. hydrarg. gr. iv.; extr. colocynth. compos. gr. vj. pro dosi; когда прослабитъ больного, давать: Rp. Extr. gentianæ

3j, aquæ foeniculi, acetat. ammon. liquidæ
aa ʒij, syrupi avrantior. ʒβ. полунціи чрезъ
2 - 3 часа. Пищье: ячный опваръ съ неболь-
шимъ количествомъ порпвейна. Язву пере-
вязать solut. chlorur. calcis.

30-го. Больного слабило разъ семь, жидко,
съ пвердыми небольшими комками; сонъ
легкій, часпо прерывающійся, шумъ и звонъ
въ ушахъ, призраки не совсѣмъ исчезли;
язва чиста. Принималъ микспуру раза че-
тыре. Продолжалъ микспуру; на ночь tinct.
orii crocatæ gutt. sedecim; язву перевязать
cerato simplici.

31-го. Больной еще вчера подъ вечеръ
сдѣлался весьма безпокоенъ; лѣкарствъ не
принималъ; безпрестанно ходишь по комна-
тѣ и говоришь самъ съ собою про свои при-
зраки. Обмышь больного теплымъ раство-
ромъ поваренной соли, дашь пятнадцать ка-
пель tinct. orii crocatæ въ полрюмкѣ порп-
вейна и повпоряшь чрезъ два часа, пока
уснеетъ, прибавляя каждый разъ по пяти
капель.

Въ 10-мъ часу вечера сказали мнѣ, что
больной по моемъ уходѣ не принималъ ни-
какого лѣкарства и не позволилъ себя обмыть;

но при мнѣ поспѣхъ согласился обмыться и принялъ 16 капель сказанной наспойки опія, а чрезъ часъ и еще 20.

1-го Апрѣля въ 7 часовъ по полудни. Безъ меня больной опять упрямился и не хотѣлъ принимать лѣкарства, ходилъ часа чепыре; потомъ началъ образумываться, самъ спросилъ капли, принялъ около 40 въ два приема, въ 5-мъ часу утра уснулъ и спалъ до 3-хъ часовъ по полудни. Весьма слабъ, пульсъ частый, слабый, языкъ влажный, температура умѣренная, на низъ было вчера два раза, язва очень нечиста и издаетъ помершвѣлый запахъ. *Extr. amar. cum infuso gentianæ, tinctura chinæ compos. et tinct. acida*; на ночь *tinct. opii crocatæ gutt. xxx.*; ногу перевязать *solut. chlorur. calcis.*

2-го. Вчера больной цѣлый день лежалъ въ постели и дремалъ почти безпреспанно; ночью легкій, грезами часто прерываемый сонъ. Сегодня вставалъ на короткое время и прохаживался; на низъ болѣе супюкъ не было; язва чище и безъ запаха. *Infusi laxat. Viennensis ℥jj., træ jalappæ 3℔. pro dosi.*

3-го. Больного слабило разъ пять; испражненіе было жидкое, весьма неприятнаго запаха;

слабость, звонъ и шумъ въ ушахъ какъ прежде; боль десенъ, слюна очень вязкая. Decoct. cinch. off. cum tinctura ejusdem composita et tinct. acida aromat.; gargarisma emolliens.

4-го. Еще вчера вечеромъ бредъ возобравился; больной ходилъ безпрестанно, лѣкарства не принималъ и при мнѣ на то не соглашался; но когда я поднесъ ему около полдрахмы tinct. opii crocatæ въ полрюмкѣ порпвейну, то онъ выпилъ безъ отговорок. Давать сію настойку въ винѣ, кофе или другой жидкости, какую захочетъ пить. Безъ меня однако больной былъ очень оспороженъ вразсужденіи питья и кромѣ квасу ничего не пилъ, дабы не дали ему капель. Въ 7 часовъ вечера частію угрозами, клонившимися къ главнымъ обстоятельствомъ, которыхъ онъ боялся, частію обѣщаніемъ содѣйствовать къ удаленію сихъ обстоятельствъ, склонилъ я его къ тому, что онъ при мнѣ выпилъ болѣе 30-ти капель той же настойки опія, и обѣщался принимать послѣ и сдержалъ свое обѣщаніе, а именно: въ три приема, съ промежутками 1 - 2 часовъ, выпилъ онъ полторы драхмы tinct. opii crocatæ; послѣ второго приема вырвало его желтоватою жидкостію;

попомъ принялъ еще два порошка, содержащихъ по два грана опія; въ 12 часовъ ночи легъ въ постелю, черезъ часъ уснулъ и спалъ крѣпко до 6-ти часовъ утра 6-го числа. 5-го числа по полудни просыпался два раза, но на короткое время, такъ что не успѣли и чаю для него приготовить.

6-го. Совершенно въ полномъ умѣ; призраки исчезли, слухъ спокойнѣе; очень слабъ, сухость во рту, языкъ чистый, пульсъ частый, слабый, частое испражненіе низомъ; язва весьма нечиста, кровопочива, издаетъ дурной запахъ. Я предложилъ больному пригласить на совѣтъ одного изъ двухъ извѣснѣйшихъ Врачей нашей столицы, но онъ рѣшительно отказался принимать въ печеніи прехъ дней какія бы то ни были лекарства, и только принялъ, съ согласія моего, около небольшой ложки дома приготовленнаго угольного порошка, который ему и прежде въ подобномъ состояніи помогаль. Для питья слизистый отваръ съ малымъ количествомъ краснаго вина; язву перевязывать *solut. chlorur. calcis.*

7, 8 и 9-го. Состояніе больного изрядное; совершенно въ памяти; но и теперь еще

едва вѣришь, что главный его призракъ ложный; а впрочемъ голова спокойна, спить часа по три и по чепыре сряду хорошо; поносъ унялся; языкъ влажный; не жалуется на боль десенъ и во рту, прежде его очень беспокоившую; только очень слабъ и не имѣетъ аппетита. Decoct. cinch. off. cum tinct. ejusdem et tinct. acida aromat.

10-го. Сильный кашель, безъ боли въ груди, густая, очень вязкая слизь во рту, языкъ сухой, нечистый, красноватый, пульсъ полный, частый, жаръ умеренный, жажда, на низъ было два раза. Nitras potassæ cum mur. ammon. in decoct rad. althæae.

Здѣсь долженъ я замѣтить, что больной по какому - то мнѣ неизвѣстному обстоятельству, даже въ памяти, не хотѣлъ лечь въ другой удобнѣйшей комнаѣ, но лежалъ въ залѣ для бѣльшаго удобства на полу, между окномъ и дверью, и по упряму теръ себѣ голову и лице льдомъ, увѣряя, что это ему полезно и что онъ къ тому привыкъ уже издавна.

11-го. Вчера по полудни одно неожиданное и для больного весьма тягостное посѣщеніе распиротало его до слезъ; послѣ чего онъ ви-

*

димо ослабѣлъ. Ночью тихій бредъ, какъ въ обыкновенной горячкѣ во время сна. Теперь совершенно въ памяти, но очень слабъ; лице упало, пульсъ частый, неровный, по временамъ икоша, языкъ сухой, температура пѣла мало возвышена, язва сухая, поносъ, кашель рѣдкій. Infusum rad. valerianæ cum mucil. g. arabici et aethere nitrico; по временамъ давать по ложкѣ винограднаго вина.

12-го. Слабость усиливается; во время сна тихій бредъ. Къ вечеру пульсъ сдѣлался неправильнымъ, конечности начали охлаждать, но больной былъ совершенно въ памяти; еще въ 11-мъ часу разговаривалъ со мною и только въ 12 часовъ потерялъ чувствъ и чрезъ нѣсколько минутъ скончался.

И сей, хотя несчастно окончившійся, случай подтверждаетъ превосходное дѣйствіе опія въ большихъ приемахъ для прекращенія приступа бѣлой горячки, равно какъ и то, что малые приемы онаго совсѣмъ не дѣйствительны. Впрочемъ о семъ средствѣ извѣстно вообще, что малые приемы онаго, а у привыкшихъ къ нему и довольно большіе, не только не наводятъ сна, но еще оный прогоняютъ. Даже значительное количество опія,

принятое больнымъ, на прим: 24-го Марта, хопя и произвело сонъ, но онъ былъ кратковременный (въ сравненіи съ продолжавшеюся бессонницею), некрѣпкій и достапочно не успокоилъ больного. Равнымъ образомъ и другіе два раза, вскорѣ по пробужденіи жаловался онъ на шумъ въ ухахъ, быспрое печеніе мыслей, и можно было замѣпить, что призраки не совсѣмъ его оставили. Послѣ 6-го Апрѣля напропивъ того не только печеніе мыслей успокоилось, но и слухъ сдѣлался гораздо свободнѣе и призраки совсѣмъ исчезли. Главное однако заблужденіе, родившееся, по видимому, случайно во время болѣзни и о копоромъ упомяну ниже, впечатлѣлось въ умъ его столь сильно, что и въ сіе время съ шрудомъ могъ я увѣрить больного въ томъ, что оно ложно и никогда не бывало.

Вразсужденіи пріемовъ опія вообще можно сказать, что они должны быть пакъ велики и пакъ часто повпоряемы, чтобы въ печеніи нѣсколькихъ часовъ навели сонъ. Такъ, на прим: если пріемъ одного или двухъ гранъ, чрезъ два часа повпоренный, не окажется примѣпнаго дѣйспвія, то слѣдующіе пріемы надлежитъ увеличивать. Вреда отъ большихъ

пріемовъ опія въ сей болѣзни я не видалъ, да и извѣстные мнѣ наблюденія другихъ Врачей того не предспавляютъ. Прежде сего одинъ шаковой больной принялъ вдругъ драхму *incuturæ opii crocatae* и разведенные въ ней два грана опія, прописанные на два пріема, безъ всякихъ худыхъ послѣдствій.

При споль многихъ и такъ досповѣрныхъ свидѣтельсвахъ о пользѣ опія въ бѣлой горячкѣ я не знаю, предубѣжденію ли, недовѣрчивости или невѣденію слѣдуетъ приписать неправильный способъ лѣченія въ описанномъ случаѣ прежними Врачами? Мнѣ извѣстно, что въ Германіи нѣкоторые отвергали пользу сего лѣкарства въ сказанной болѣзни; но это безъ сомнѣнія произошло либо отъ неправильнаго употребленія онаго, или отъ необстоятельнаго наблюденія. Конечно опій не возвращаетъ пошерянныхъ силъ, не исправляетъ разспроеннаго пищеваренія и не уничтожаетъ уже воспослѣдовавшихъ опасныхъ органическихъ измѣненій; но онъ прекращаетъ опличительныя и важнѣйшія явленія сей болѣзни — *бессонницу* и *бредъ*, успокоиваетъ чувствва, прерываетъ быстрое печеніе мыслей и чрезъ успокоеніе больнаго подаетъ воз-

можность употребить другія, соспоянію его соопвѣтствующія средства, коими слѣдуетъ довершитъ лѣченіе больного, если еще возможно его спасти.

Касательно обращенія съ больными сего рода я уже прежде *) замѣнилъ, что ласковое обхожденіе должно быть предпочитаемо суровому и что для усмиренія ихъ (и склоненія къ принятію лѣкарства и проч.) рѣдко бываетъ нужно употреблять насиліе. Въ описанномъ случаѣ явственно видимъ мы вредъ насильственныхъ мѣръ. Будучи совершенно въ памяти, 8-го Апрѣля, больной сказывалъ мнѣ, что онъ помнитъ все, не только дѣйствительно съ нимъ случившееся, но даже представлявшіеся ему призраки, и жаловался, что съ нимъ поступали какъ съ опаснымъ сумасшедшимъ. Употребленные для усмиренія больного способы и присутствіе постороннихъ лицъ, по его словамъ, болѣе его разспроили, нежели самая болѣзнь. Въ особенности его встревожило и огорчило предложеніе одного изъ бывшихъ во время консультаціи, не Врача, отправить его въ домъ ума лишенныхъ, что онъ самъ слышалъ.

*) В. М. Ж. Ч. Х. N. 2 и 3.

Во всѣхъ слѣдующихъ приступахъ болѣе всего боялся онъ сего человѣка, почиалъ его шпиономъ, имѣющимъ опъ Начальства порученіе и власть за нимъ присматривать и управлять его поступками. Даже, будучи совершенно въ памяти, онъ, какъ выше замѣчено, съ трудомъ повѣрилъ, что мысль сія была ложная.

Если только больной принимаетъ лѣкарство, то я не дѣлаю ему никакого проповѣдья, ни принужденія: ибо увѣренъ, что оно скоро окажетъ свое дѣйствіе и больной скоро образумится; но и тамъ, гдѣ въ семъ отношеніи не лзя ничего сдѣлать ласкою и невозможно дать лѣкарства даже обманомъ, хитрость большею частію бываетъ для сего доспапчна. Обыкновенно больные сего рода чего нибудь боятся, и благоразумный Врачъ можетъ воспользоваться симъ обстоятельствомъ. Такъ склонилъ я своего больного принять лѣкарство пѣмъ, что общался умилоспивить человѣка, котораго онъ боялся и грозилъ объявить ему все, если спанетъ долѣе упорствовать. Правда и послѣ сего онъ еще опговаривался, но когда я поднесъ ему лѣкарство, то онъ поспчасъ его выпилъ.

Сколь неопредѣлительны наши понятія о слабости и крѣпости и сколь обманчивы явленія, по коимъ заключаемъ мы о томъ или другомъ состояніи силъ, явствуетъ изъ сего и подобныхъ случаевъ. Человѣкъ, за нѣсколько часовъ обнаруживавшій значительную крѣпость мышцъ и кровеносной системы (ибо и пульсъ при томъ бываетъ полный и довольно крѣпкій), по успокоеніи болѣзненного возбужденія нервовъ, безъ употребленія ослабляющихъ средствъ, лежитъ въ величайшей слабости, даже не можетъ приподняться въ постели; но коль скоро возвращается прежнее болѣзненное состояніе, онъ опять самъ встаетъ и ходитъ какъ здоровый. Кто изъ практическихъ Врачей не видалъ таковыхъ переменъ и въ другихъ болѣзняхъ, кромѣ бѣлой горячки?

2. *Воспаленіе спиннаго мозга (myelitis).*

Иванъ Ялишкинъ, Л. Г. Гренадерскаго полка рядовой, 28 лѣтъ, хорошаго тѣлосложенія, поступилъ въ Терапевтическую Клинику 14-го Марта сего (1829) года. До 1828 года солдатъ сей былъ здоровъ; но въ семь году, возвращаясь изъ Персіи, осенью забо-

лѣлъ въ Грузіи лихорадкою, продолжавшеюся около прехъ мѣсяцовъ. Въ Генварѣ прибылъ онъ въ С. Пепербургъ, а 19-го Феврала лихорадка появилась снова; но больной перемогался до 5-го Марша; наконецъ гашелся принужденнымъ иппи въ госпиталь и сказаннаго числа переведенъ въ Клинику.

Ходъ (typus) лихорадки былъ прешьднвенный; приступы случались по вечерамъ. Послѣ умѣреннаго озноба черезъ часъ жаръ продолжался во всю ночь, а къ утру появлялся обильный потъ. Но иногда и въ свободные отъ лихорадки дни оказывался легкій ознобъ, переходившій въ потъ, безъ жара. Пульсъ и во время перемежки былъ раздраженный, п. е., частый и пвердовапый, языкъ нечиспый, горечь во рпу, испражненіе низомъ жидкое, нечастное, температура тѣла еспешпвенная. Сверхъ того больной жаловался на легкую боль въ горлѣ, нѣсколько препяпспивовавшую глопанію, на птяжестъ головы и шумъ въ ушахъ; голосъ былъ осиплый.

При упопробленіи соопвѣпспвующихъ лѣкарспвъ (Mist. mur. ammon. stibiatæ и смягчающихъ припарокъ) боль горла скоро умень-

шилаь и голюсь сдѣлаься чище; но лихорадка продолжалась по прежнему.

19-го. Острыя боль въ правомъ ухѣ, безъ наружной красноты и опухоли; чешыре раза небольшое кровопеченіе изъ носа; легкіе лихорадочные припадкы около полудня. Припарка къ уху.

20-го. Днемъ два раза небольшое кровопеченіе изъ носа; вечеромъ наспоащій приспуть лихорадки.

22-го. По причинѣ продолжающейся боли уха и головы приложена мушка къ запылку, и вскорѣ послѣдовало облегченіе; а 25-го прописанъ порошокъ хины (3β); принимають каждыя при часа съ горькимъ виномъ (*crematum amagum*) и нѣсколькими каплями сѣрной кислоты.

26-го. Приспуть, начавшійся въ 4 часа по полудни, продолжался до утра.

27-го. Весь день по ознобъ, по дрожь, боль головы, пошнопа и рвопа, пульсъ раздраженный. Порошки оспавлены. *Mixt. acetatis potassæ.*

28-го. Безпрерывная боль и жаръ головы, по временамъ пошнопа и рвопа, языкъ чистый, одно испражненіе низомъ, пульсъ малый, мягкій, неровный, шемперапура тѣла

мало возвышенная. Тоже лѣкарство, *fomentum commune* къ головѣ, *sinapismus ad scrobiculum cordis*; вечеромъ теплая ванна.

29-го. Значительный непрерывный жаръ всего тѣла, боль головы, пульсъ частый, твердоватый. *Mixt. nitrat. potassæ*; холодныя примочки къ головѣ.

30 и 31-го. Тоже состояніе болѣзни и лѣченіе.

1-го Апрѣля. Ночью сильный ознобъ, потомъ такой же жаръ, боль головы, въ плечахъ, а наипаче въ поясницѣ и нижнихъ конечностяхъ, испражненіе мочи нѣсколько затруднительное, пульсъ частый, твердый, сжатый, температура тѣла умеренная. Ванна, кровососныя банки къ поясницѣ, потомъ припарки; внутрь также микстура и *Rp. Submur. hydrargyri, suboxydi stibii hydrosulphur. succi spissati hyoscami aa gr. j. sacchari gr. x. f. p. omni trihorio sumendus.*

2-го. Послѣ ванны, банокъ и припарокъ небольшое облегченіе; боль поясницы продолжается, безъ общихъ воспалительныхъ признаковъ. Ванна, мушка къ поясницѣ; вмѣсто прежней микстуры *infusum flor. chamom. cum vino antimon., порошки.*

3-4-го. Боль поясницы къ вечеру ожесточается, испражнение низомъ и мочи свободное, пульсъ и температура почти естественные. Тоже лѣченіе; 4-го послѣ ванны вечеромъ *haustus oriatus*.

5-го. Жесткая, жгучая боль глубоко въ поясницѣ, при малѣйшемъ движеніи туловища усиливающаяся; больной лежитъ на лѣвомъ боку; нижнія конечности полусогнутыя, какъ бы одеревенѣлыя; больной не можетъ ихъ выпрямить; запоръ на низъ и мочи; лице красное, пульсъ частый, полный, крѣпкій, жаръ всего тѣла. Кровопускание до двухъ фунтовъ, кровососныя банки къ поясницѣ; къ порошкамъ вмѣсто *succ. hyosc. n.* прибавить по грану *pulv. fol. digitalis p.*, *emulsio sem. cannabis nitrata* для питья; промывательное; мочу выпускать каплетеромъ.

6-го. Небольшое облегчение. Порошки, *emulsio*, припарки къ поясницѣ.

7-го. Боль поясницы усилилась; туловище нижнихъ конечностей, полусогбенныхъ; пульсъ частый, твердый, жаръ всего тѣла умеренный, запоръ на низъ и мочи. Порошки (по два грана *submur. hydrargyri*), *emulsio oleosa*, ванна, промывательное, каплетеръ.

8-го. Кромѣ пѣхъ же припадковъ, пульсъ полный, крѣпкій, жаръ всего пѣла. Кровопусканіе до полпора фунпа, теплая ванна, порошки, emulsio.

9-го. Пульсъ малый, частый, твердоватый, жаръ пѣла умѣренный; мочу испражняють чрезъ капшерь; ноги въ прежнемъ положеніи.

10-го. Бредъ, съ громкимъ вскрикиваніемъ, жаръ головы; лежишь на спинѣ, а прежде все лежалъ на боку; спина въ поясницѣ нѣскольکو вогнута. Кромѣ прежнихъ лѣкарствъ холодныя примочки къ головѣ.

11-го. Поупру сильный ознобъ; больной мало чувствившелекъ; пульсъ малый, слабый, моча и испражненіе низомъ задержаны.

12-го. Лежишь на спинѣ, мало чувствившелекъ; бедра приведены къ брюху; пульсъ малый, слабый, неровный; запоръ на низъ и мочи.

13-го. Совершенное безчувствіе; бедра прижаты къ брюху; руки, согнутыя въ локтяхъ, какъ у нерожденныхъ младенцовъ, лежатъ на груди; конечности холодныя, пульсъ неощутительный, дыханіе слабое, по видимому, свободное. Ввечеру скончался.

При вскрытіи пѣла въ брюшной полости мы не нашли никакихъ болѣзненныхъ измѣненій. Позвоночный столбъ, за неимѣніемъ особливаго удобнѣйшаго инструмента, вскрыли мы посредствомъ долотца, находящагося въ обдукціонномъ наборѣ, разрублявая имъ сзади поперечные отростки или дуги позвонковъ, какъ можно ближе къ ихъ пѣламъ. Мы открыли позвоночный каналъ отъ копчиковой кости до послѣдняго шейнаго позвонка. Поднявши нижнюю отдѣленную часть позвонковъ, увидѣли мы въ оболочкахъ спиннаго мозга нѣсколько опверстій разной величины, сквозь которыя выступало вещество сѣробѣловатое, мягкое, плотностію подобное густымъ сливкамъ. Таковыхъ опверстій было много противъ поясничныхъ позвонковъ и ниже, а выше, противъ нижнихъ спинныхъ позвонковъ, только два. Опверстія сіи, вѣроятно, были сдѣланы нами при разрубленіи позвонковъ: ибо они находились наиболѣе по сторонамъ, противъ разрубленныхъ, и какъ поспѣшь замѣчено, больше ихъ было противъ поясничныхъ позвонковъ, кои, по вогнутому ихъ положенію, вскрывать шруднѣе. Существо спиннаго

мозга, на вышесказанномъ пространствѣ, было почти все превращено въ упомянутую мякоть; многіе пучки конскаго хвоста были распроеены и представляли отдѣльные концы верхніе и нижніе. Въ полости позвоночнаго столба, ни между оболочками спиннаго мозга не было никакого изліянія, ни выпотѣнія; оболочки вообще не представляли признаковъ предшествовавшаго воспаленія; только передняя поверхность твердой оболочки, противъ окончанія спиннаго мозга, дюйма на четыре, была красная, сосудистая. Верхняя часть оболочекъ и спиннаго мозга была совершенно здоровая *).

Болезни спиннаго мозга и его оболочекъ, несопряженныя съ поврежденіемъ позвонковъ, только недавно обратили на себя особенное вниманіе Врачей и именно съ того времени, какъ патологическія вскрытія труповъ вошли болѣе въ обыкновеніе. Прежде того зависящіе отъ нихъ припадки приписываемы были совсѣмъ другимъ причинамъ, или считаемы за динамическія, просто нервныя, ни

*) Исторію болѣзни писалъ Студентъ 3-го класса *Бѣликовъ*.

съ какою органическою переменною несопряженными спаданіями. Патологическая Анатомія, коей Врачебная Наука обязана большимъ своимъ усовершенствованіемъ, сдѣланнымъ наипаче въ послѣднія 20 лѣтъ, теперь показала, что большая часть припадковъ, которые прежде принимали за особливый болѣзни, а особливо многія судороги и параличи, происходятъ отъ болѣзненныхъ измѣненій спиннаго мозга и его оболочекъ. Большая часть сихъ измѣненій, если не всѣ они, получаютъ свое начало отъ оспраго либо хроническаго воспаленія, коего распознаваніе вообще бываетъ весьма трудно. Главнѣйшіе припадки сего воспаленія суть слѣдующіе:

Постоянная, при оспромъ воспаленіи жестокая, жгучая, а при хроническомъ менѣе чувствительная боль глубоко въ спинѣ, по направленію позвоночнаго столба, начинающаяся отъ спраждающаго мѣста и простирающаяся по направленію нервовъ, происходящихъ отъ спраждающей части. При хроническомъ воспаленіи иногда боль бываетъ чувствительнѣе въ конечностяхъ, нежели въ

спинѣ *). При положеніи на спинѣ, при движеніи позвоночнаго столба и опѣ прижапія осписпыхъ позвоночныхъ опроспиковъ прошивъ спраждущаго мѣспа боль усиливается. При воспаленіи оболочекъ чаще замѣчены судороги разныхъ мышцъ, либо и всего шѣла, безъ поврежденія чувспвипельности, а при воспаленіи самага мозга онѣменіе или, лучше сказать, одеревенѣніе и неподвижность членовъ (*Оливье*). Одеревенѣніе и неподвижность нижнихъ конечностей было одно изъ главныхъ явленій нашего больного, и у него въ оболочкахъ спиннаго мозга по смерпи не замѣчено никакого болѣзненнаго измѣ-

*) Я помню одного больного, который въ теченіи болѣе года жаловался на поспоянную, по временамъ усиливавшуюся боль въ нижнихъ конечностяхъ, а особливо съ наружной стороны лѣвой голени, безъ другихъ особенныхъ припадковъ, кромѣ слабости и изнуренія всего шѣла и шупой боли глубоко въ поясницѣ. Не задолго передъ смерпію появились общіе воспалипельные припадки и вскорѣ послѣ того больной сей впалъ въ безчувспвіе, безъ судорогъ. Въ трупѣ нашель я обширное нагноеніе въ полости паза, съ лѣвой стороны, съ коспофдою поясничныхъ позвонковъ.

ненія. Судорогъ у него совсѣмъ не было; подусогбенное положеніе нижнихъ конечностей не зависѣло отъ судорогъ: ибо мышцы не были напряжены, но только больной не имѣлъ надъ ними власти. Впрочемъ онѣ не были и вялыя, какъ въ параличѣ. Смотри по степени и обширности воспаленія, бываетъ припомъ болѣе или менѣе сильная горячка, а наконецъ присоединяется параличъ тѣхъ частей, къ коимъ идутъ нервы, отъ воспаленнаго мѣста происходяще.

Кромѣ сказанныхъ общихъ признаковъ воспаленія спиннаго мозга, оно сопровождается еще особенными, зависящими отъ пораженнаго мѣста. Если воспаленіе занимаетъ верхнюю часть спиннаго мозга, близкую къ общему чувствительному, то оно производитъ измѣненіе наружныхъ чувствъ, бредъ, судорожное сжатіе челюстей, иногда судороги всего тѣла, прудное дыханіе, глотаніе, даже водобоязнь.

При воспаленіи шейной части спинной жилы спржадутъ мышцы шеи и верхнихъ конечностей, въ коихъ сперва появляются судороги, а потомъ параличъ. Онемленіе конечностей начинается чувствомъ шупости

*

въ персплахъ, поспепенно проспирающимся
вверхъ до плеча. Дыханіе также бываешъ
запруднишельное и совершаешъ болѣе по-
средствомъ грудобрюшной преграды. Иногда
и глопаніе запрудняешъ. Касашельно онѣ-
менія верхнихъ конечностей, зависящаго отъ
разспроенія верхней часпи спиннаго мозга, я
почипаю примѣчашельнымъ слѣдующій слу-
чай, описанный *Рюлліеромъ* *).

Мужчина, малаго росша, слабого тѣлосло-
женія, на правомъ боку нѣсколько горбашый
съ малолѣпспва, пылкаго харакшера, съ мо-
лодыхъ лѣтъ чрезмѣрно преданный плошско-
му сладоспраспію, началъ на 34-мъ году чув-
спивовашъ запрудненіе въ движеніи верхнихъ
конечностей, поспепенно увеличивавшееся,
къ кошорому скоро присоединилась боль и
онѣменіе (*engourdissement*) въ выдававшейся
часпи спиннаго сполба. Въ 1815 году, про-
гуливаясь за городомъ (Парижемъ), онъ нечаян-
но упалъ и не могъ вспашъ по той причинѣ,
что не владѣлъ руками. Съ того времени,
кромѣ совершеннаго бездѣйспвія рукъ, ко-
пторыя при хожденіи качались какъ бы привѣ-

*) *Magazin der ausländischen Litteratur der gesamm-
ten Heilkunde. VI. Bd. стр. 456.*

шенныя къ туловищу, здоровье сего человѣка начало примѣтно разспроиваться, опухоль на спинѣ увеличивалась, плеча поднимались до того, что наконецъ, въ 1822 году, достигали ушей; но почти до самой смерти владѣлъ онъ нижними конечностями. Руки кромѣ того были согнуты къ туловищу, ладони выворочены впередъ, персты согнуты. Равнымъ образомъ спрадали грудныя мышцы; дыханіе было весьма затруднительное и часто угрожало задушеніемъ; сильное бѣненіе сердца, но чувствительность какъ верхнихъ конечностей, такъ и грудныхъ мышцъ ослабевала, даже была возвышена. Умственные способности не были повреждены, пищевареніе совершалось худо, продолжительный запоръ на низъ, моча темноцвѣтная испражнялась свободно, въ маломъ количествѣ, *frequentes erectiones*.

По вскрытіи пѣла въ паупинной оболочкѣ спиннаго мозга найдено много сыверопочной жидкости, а сосуды собсвенной его оболочки были очень налиты кровью. Спинной мозгъ, сверху до четвертаго шейнаго позвонка, былъ здоровъ, равно какъ и двѣ нижнія прешпи онаго; но заключающаяся между си-

ни часть онаго, на пространствѣ 8—9-й пары нервовъ, была размягчена такъ, что превратилась совсѣмъ въ жидкость, кошорая по разрѣзѣ выпекала съ клочками мозгового существа, и только на передней сторонѣ сей разспроенной доли видны были мозговые пучки, соотвѣтствовавшіе корешкамъ спинныхъ нервовъ, а на лѣвой сторонѣ, на мѣсто размягченного существа мозга, на полтора дюйма въ длину, находились чечевицеобразные кусочки, рядомъ лежавшіе. Въ размягченномъ существѣ было множество тонкихъ, кровью наполненныхъ волосныхъ сосудовъ.

По вынущіи спинного мозга изъ позвоночного столба оказалось, что передняя часть менѣе прочаго была разспроена, пучки, соотвѣтствовавшіе переднимъ корешкамъ спинныхъ нервовъ, были видны непрерывно, кромѣ лѣвой стороны, о чемъ упомянуто выше. Ихъ можно было преслѣдовать до мякотнаго существа спинного мозга, изъ котораго они происходили.

Такимъ образомъ верхняя часть спинного мозга соединялась съ нижнею, на пространствѣ 6—7 дюймовъ, только посредствомъ оболочекъ и полоскою бѣлаго существа, ши-

риною линіи въ двѣ, и сіе соединеніе было достапочно для проведенія вліянія воли на нижнія конечности.

При воспаленіи спинной части спановой жилы замѣчаются судороги мышц пуловища, рѣдко проспирающіяся на конечности; дыханіе частое, короткое совершается одною грудобрюшною преградою; препептаніе сердца; опсправленія пищеварительныхъ органовъ расспроиваются.

Наконецъ воспаленіе поясничной части сего органа опспичается недѣйспвіемъ либо онѣмненіемъ нижнихъ конечностей, запоромъ на низъ и мочи, либо непроизвольнымъ оныхъ испражненіемъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣчено *satyriasis* разной степени.

По исчисленнымъ признакамъ, если они бываютъ довольно явспвенны, не трудно различить воспаленіе спиннаго мозга опъ подобнаго спсраданія другихъ близлежащихъ частей, принявши въ уваженіе и признаки, свойспвенные симъ послѣднимъ; но хроническое, медленное воспаленіе обыкновенно чрезъ долгое время сопровождается припадками весьма неопредѣлительными и нерѣдко распознается уже по печальному своему исходу—параличу,

и это неудивительно: поелику въ самомъ мозгѣ находили нарывы въ такихъ случаяхъ, въ коихъ при жизни не лзя было предполагать воспаленія онаго (*Моргагни*).

18-го Февраля 1823 года одинъ солдатъ, съ виду здоровый, 56-ши лѣтъ, поступилъ въ Клинику съ параличемъ лѣвой руки, копорый, по его словамъ, воспослѣдовалъ послѣ кровопусканія, сдѣланнаго за нѣсколько дней предъ тѣмъ, по причинѣ сильного кашля и боли головы, копорые у него продолжались съ Октября предшедшаго. 24-го принималъ онъ крѣпительныя средства (агаа) и просилъ ординарной порціи, а 25-го поупру вдругъ впалъ въ безчувствіе и черезъ часъ скончался. Вскрывши тѣло, я не нашелъ никакого другаго болѣзненнаго измѣненія, кромѣ гнойнаго мѣшка, величиною въ голубиное яйцо, находившагося въ бѣломъ существѣ мозга, безъ примѣтнаго измѣненія самаго существа, даже нарывъ окружавшаго. Посему при всякой продолжительной, постоянной глубокой боли по направленію спиннаго столба Врачъ долженъ быть оспорожень въ опредѣленіи болѣзни и внимательно

разсмотрѣвъ всѣ признаки и другія обстоятельствова.

Обыкновеннѣйшія причины воспаленія спиннаго мозга, кромѣ наружныхъ механическихъ насилій, сущь:

1. Простуда, особливо чрезъ скоропоспѣжное измѣненіе температуры. Посему - по простой сполбнякъ (*tetanus idiopathicus*) чаще случается въ жаркихъ странахъ, нежели въ Сѣверныхъ. Въ Вѣнѣ въ одно лѣто видѣлъ я при случая сей болѣзни, а въ С. Петербургѣ, въ восемь лѣтъ, изъ числа нѣсколькихъ тысячъ больныхъ только одного, у котораго по смерти нашелъ я воспаленіе оболочекъ шейной и верхней спинной части спановой жилы. Болѣзнь произошла отъ сильнаго напряженія силъ до разгоряченія на открытомъ воздухѣ, при сильномъ холодномъ вѣтрѣ. Но даже при сполбнякѣ, происшедшемъ отъ поврежденія нервовъ и сухихъ жилъ, по изслѣдованіямъ *Бергамаски* *) и другихъ, находився воспаленіе въ позвоночномъ сполбѣ.

*) Sulla mielitide stenica e sul tetano etc. osservazioni. Pavia. 1820.

2. Внутрь скрывшіяся, какъ осприя, такъ и хроническія сыпи, подагра, ревматизмъ. Если сіи болѣзненные процессы скоропоспѣжно прекращающіяся въ своихъ органахъ, то обыкновенно спраждутъ сходные съ ними внутренніе органы, къ каковымъ принадлежатъ оболочки мозга и нервовъ.

3. Занятія, требующія согбеннаго положенія, какъ-то: садоводство, жатва и другія тому подобныя.

4. Подниманіе и ношеніе тяжестей на спинѣ. Солдаты, дѣйствовавшіе въ гористыхъ странахъ и поднимавшіе на горы пушки и другія тяжести, часто жалуются на глубокую боль въ спинѣ, проспирающуюся въ конечности, каковыхъ примѣровъ имѣю я теперь нѣсколько въ солдатахъ, возвратившихся изъ Персіи. Нѣкоторыя гимнастическія упражненія: прыганіе, борьба и проч.

5. Застой крови въ геморроидальныхъ и другихъ брюшныхъ сосудахъ (*stases abdominales, congestio venosa*) также могутъ произвести хроническое воспаленіе въ спинномъ каналѣ.

6. Онанія и *abusus venereis*, наипаче въ молодыхъ лѣтахъ. Спинная сухопка (*tabes dorsalis*) есть хроническое воспаленіе спиннаго мозга. *Береамаски* въ шѣлѣ одного 16-лѣтняго онаниста нашелъ спинной мозгъ сухимъ, сжатымъ и швердымъ, какъ будто бы онъ лежалъ въ винномъ спиртѣ, а оболочки его хрящеватыми.

Малолѣтныя дѣти, по наблюденіямъ *Гарлеса* и *Гелиса*, часто спрадають сею болѣзнію, и многіе припадки, приписываемые шрудному прорѣзыванію зубовъ, глистамъ, разспройспву пищеварительныхъ органовъ, шакже судороги у младенцовъ, суть не иное что, какъ обнаруживаніе воспаленія спиннаго мозга.

Теченіе оспраго воспаленія спиннаго мозга большею частію бываетъ быспрое и оканчиваеися смертію или переходить въ хроническое. Хроническое воспаленіе сего органа нерѣдко продолжается нѣсколько лѣтъ подѣ видомъ поясничной или спинной боли (*lumbago, rachialgia*), паралича.

Патологическія измѣненія, находимыя по смерши, суть: сыворошчное изліяніе между позвоночнымъ сполбомъ и оболочками спиннаго мозга или внутри оболочекъ, кровоиз-

ліяніе, нагноєніе, размягченіе, зашвердніе и сухопка спиннаго мозга.

Для преодоленія оспраго воспаленія спиннаго мозга необходимо нужно употреблять пропивувоспалительный способ лѣченія во всей его обширности. Кровопусканіе до обморока, піявицы къ спраждущему мѣсту, потомъ теплыя припарки, чрезъ нѣсколько часовъ замѣняемыя шпанскою мушкою. Внутрь, при сильной горячкѣ, селипра съ рвотнымъ камнемъ, *submur. hydrargyri gr. jj - jii* чрезъ два или три часа, *digit. purpurea*. Можетъ бытъ вмѣсто припарокъ полезнѣе будетъ прикладывасть снѣгъ или ледъ, либо Шмуккеровы примочки, а при воспаленіи нижней части спиннаго мозга и холодныя промывательныя.

При хроническомъ воспаленіи внутреннія средства мало дѣйствительны; изъ числа ихъ надлежитъ употреблять ртутныя, сурьмяныя и наперсточную праву; болѣе пользы можно ожидать отъ теплыхъ общихъ ваннъ, повторяемаго припусканія піявицъ къ позвоночному столбу и нарывныхъ медленно дѣйствующихъ, каковы сунтъ: *cortex d. mezerei, unguentum stibiatum (Autenrith)*. Дѣйствія

раскаленного желѣза и моксы въ сихъ случаяхъ я не испытывалъ.

Само собою разумѣется, что гдѣ какая либо сыпь или подагра содѣйствовала происхожденію болѣзни, тамъ надобно употреблять средства, Общю Терапіею въ подобныхъ случаяхъ предписываемыя.

Слѣдующій случай подходитъ близко къ острому воспаленію верхней части спановой жилы.

Парфенъ Андреевъ, деньщикъ, 19-ти лѣтъ, средственнаго, флегматическаго тѣлосложенія, на службѣ находившійся шестъ мѣсяцовъ, поступилъ въ Клинику 13-го Маія сего года, по причинѣ ежедневной лихорадки, продолжавшейся уже недѣлю и ревматическихъ болей во всей передней части груди, верхней части брюха, подреберьевъ и поясницы. И во время перемежки больной чувствовалъ тяжесть головы, шумъ въ ушахъ, пятна передъ глазами, языкъ нѣсколько сухой, красноватый, пульсъ частый, твердый, неровный. Приступы вечерніе, отступающіе (р. postponentes).

22-го. Общія воспалительныя признаки сдѣлались явственнѣе и посильнѣе; приступъ

поупру въ 6-мъ часу. *Nitras potassæ cum supertartarate potassæ.*

23-го. Ночью бредъ; приступъ въ тоже время; острая боль по направлѣнію позвоночнаго столба, опъ прикосновенія усиливающаяся; пульсъ частый, сжатый; жаръ умѣренный, подергиваніе сухихъ жилъ верхнихъ конечностей. Ванна, кровососныя банки къ спинѣ, припарка; *nitras potassæ cum tartar. stibii et potassæ*; мушка между лопатками.

24-го. Приспупъ поупру въ 8-мъ часу; прочіе припадки какъ вчера. Кромѣ микспуры каждыя при часа порошокъ *submur. hydr. gr. jj, pulv. f. digit. purpur. gr. j* съ сахаромъ.

25-го. Приспупъ въ 9-мъ часу; неносная, жгучая боль въ нижней часпи шеи, пропивъ позвонковъ, пульсъ весьма частый, крѣпкій, твердый; сильный жаръ всего тѣла, судорожныя движенія верхнихъ конечностей. *Venaesectione ad libr. jj*, двадцать пиявицъ пропивъ шейныхъ и спинныхъ позвонковъ, *ungventum stibiatum* для перевязанія мушки; также микспура и порошки.

26-го. Послѣ кровопусканія и пиявицъ большое облегченіе припадковъ. Поупру легкій

приспустъ и коропкій; боль десень. Оспавиль порошки, продолжалъ микспуру.

27-го. Лихорадки не было, боль прекрапи-
лась, пульсъ спокойный, шемпература пѣла
естпественная; словомъ, всѣ припадки исчезли;
больного слабило чепыре раза.

Симъ кончилась лихорадка и всѣ мѣспныя
спраданія, и 2-го Іюня *Андреевъ* оспавиль
Клинику совершенно здоровымъ *).

*) Исторію болѣзни писалъ Студентъ 3-го клас-
са *Иновесъ*.

VI.

ЗАМѢЧАНІЯ О СЪУМАСШЕСТВІИ, Док- тора К. Кроутера, Врача Век- филдскаго дома ума лишен- ныхъ *).

При опредѣленіи излѣчимости съумасше-
ствія вообще нужно принимая въ уваженіе
слѣдующія обстоятельствова: возрастъ боль-
наго, состояніе органовъ его шѣла, дѣятель-
ность нервной и кровеносной системы и
живость или вялость его умственныхъ спо-
собностей.

Въ особенностяхъ нужно изслѣдовавъ, не
наслѣдственна ли болѣзнь въ семействѣ,
что ея причиною, въ чемъ состоятъ обык-
новенное занятіе больного, каковы его до-
спашки и домашнія обстоятельствова, сколь-
ко приступовъ болѣзни онъ уже имѣлъ, оспа-
вался ли онъ въ то время въ своемъ домѣ,

*) Edinburgh Med. and Surg. Journal. Vol. 25.

или былъ помѣщенъ въ приличномъ заведеніи, подѣ хорошимъ присмотромъ, и не спра-
ждеть ли онъ припомъ какою либо явспвен-
ною пѣлесною болѣзнію.

О съумасшесствіи можно поже сказапъ, что
и о болѣшей часпи другихъ болѣзней. Молодые
люди, коихъ внупренности не повреждены,
нервы имѣють надлежащую степень чувспви-
пельности и кровообращеніе совершается
равномѣрно, удобнѣе выздоравливають опъ
какой бы то ни было болѣзни, нежели по-
жилые или неимѣющіе вышеупомянурыхъ ка-
чеспвъ. По моимъ однако наблюденіямъ, го-
раздо болѣе выздоравливаетъ больныхъ, ода-
ренныхъ живыми душевными способностями,
нежели тупыхъ, чего о другихъ болѣзняхъ
сказапъ не можно, хопя они, по причинѣ
болѣшей чувспвипельности, бывають болѣе
безпокойны и мечпы ихъ гораздо сильнѣе,
нежели людей слабоумныхъ. Люди чувспви-
пельные, имѣющіе живое воображеніе и обра-
зованный умъ, гораздо скорѣе и сильнѣе вос-
принимають впечатлѣнія, нежели люди съ
обыкновенными способностями; но ихъ раз-
судокъ, если нѣптъ наслѣдспвеннаго распо-
ложенія къ съумасшесствію, сильнѣе противодѣй-

спивуешъ ихъ чувспвованіямъ; они въ состояніи обуздывать неправильные порывы своего воображенія и преодолевать свои спраспи, прежде нежели онѣ поработягють разумъ. Одинъ шаковой больной сказалъ мнѣ: „я чувспвовалъ, что разсудокъ мой гошовъ былъ меня оспавилъ и что мнѣ должно было либо опврапитивнманіе свое опъ предмета, споль сильно меня прогавшаго, или сойпи съ ума. Борьба была шягоспная, но я побѣдилъ, и это послужитъ мнѣ наукою впередъ шакъ сильно не превожитесь неприяпносшями, случающимися въ жизни.“

Съ другой стороны, люди недалняго ума, будучи подвержены обыкновеннымъ вліяніямъ, могущимъ произвести съумасшесствіе, скоро шеряють разсудокъ. По моему мнѣнію, чепыре изъ пяпи находящихся въ Векфилдскомъ домѣ ума лишенныхъ, бѣдныхъ, суть люди съ обыкновенными умспвенными способносшями и шаковы же суть, большею часптію, сего рода больные, пользующеые мною въ часпныхъ домахъ. Въ нѣкошорыхъ случаяхъ однако больные съ ограниченными душевными способносшями скорѣе выздоравливали. Полуслабоумные, кошорые еще въ состояніи обрапшитъ

свое вниманіе на какое нибудь механическое занятіе, скоро совсѣмъ лишаются ума, но скоро и выздоравливаютъ. Гнѣвъ, опьяненіе, либо другое какое нибудь раздраженіе производятъ въ таковыхъ случаяхъ съумасшествіе, которое прекращается съ удаленіемъ раздраженія и разсудокъ опять приходитъ въ обыкновенное свое состояніе. По причинѣ слабой памяти и способности мыслить умъ снова не подвергается раздраженію, и это, можетъ быть, содѣйствуетъ къ прекращенію съумасшествія.

Во всякомъ случаѣ преимущественно нужно смотрѣть на наследственное расположеніе къ съумасшествію. Сильные приступы помѣшательства въ умѣ влекутъ за собою уменьшеніе или и совершенное уничтоженіе умственныхъ способностей. Въ пѣлахъ дураковъ (dements) находилъ я важныя органическія измѣненія мозга. Одинъ таковой больной черезъ двѣ недѣли послѣ выздоровленія опъ съумасшествія умеръ опъ болѣзни легкихъ, и я нашелъ у него паупинную оболочку непрозрачною и скопленіе воды въ желудочкахъ мозга. Посему въ случаяхъ, въ коихъ дѣятельность умственныхъ способностей, по



видимому, возстановляется совершенно, надлежитъ опасаться поврежденія мозга, которое можетъ сообщиться дѣтямъ, послѣ паковыхъ припадковъ рожденнымъ. Мы часто видимъ, что въ нѣкоторыхъ семействахъ одни дѣти имѣютъ хорошія умственные способности, а другія бываютъ суровы либо слабоумны, или же имѣютъ особенное свое нравіе, такъ что всякое противорѣчіе ихъ самымъ неблагоприятнымъ намѣреніямъ приводитъ ихъ въ гнѣвъ и ярость; они не могутъ быть довольны, пока не достигнутъ исполненія своихъ желаній, сколь бы нелѣпы оныя ни были. Само собою разумѣется, что въ разныхъ случаяхъ бываетъ большое различіе, касательно выздоровленія отъ наследственного помѣшательства въ умѣ. Возможность выздоровленія опредѣляется степенью помѣшательства и случайною причиною онаго; но вообще болѣзнь въ паковыхъ случаяхъ рѣже излѣчивается полностью, нежели безъ врожденнаго расположенія. Я часто имѣлъ случай замѣтить, что у паковыхъ больныхъ первый или второй приступъ скорѣе проходитъ, нежели безъ наследственного расположенія; но у нихъ болѣзнь ско-

рѣе возвращается послѣ маловажныхъ вліяній. Въ наслѣдственномъ съумасшествіи обыкновенно случаются сильныя и спрашныя, приступы неистовства, неуступающіе никакому врачебному пособию и продолжающіеся всю жизнь. Надлежитъ замѣтить, что рѣдкое семейство покажетъ, что у нихъ съумасшествіе есть наслѣдственная болѣзнь, и потому должно стараться узнавать о семь изъ другихъ источниковъ.

Для вѣрнаго предсказанія въ съумасшествіи недоспапочно одного исчисленія случайныхъ причинъ онаго. Только чрезъ точное изслѣдованіе особенныхъ обстоятельствъ каждаго случая можно получить надлежащее понятіе въ семь отношеніи. Опъ одной и той же причины происшедшее съумасшествіе содержится различно касательно выздоровленія. Если духъ колеблется между противоположными ученіями, или съумасшествіе и горячка произошли опъ страха бытъ наказаннымъ, то болѣзнь споль же легко проходитъ, какъ и происходящая опъ другихъ раздраженій мозга. Но если больной почтываетъ себя вдохновеннымъ и имѣющимъ даръ предвѣщать будущее, безъ примѣтной тѣлесной болѣзни,

то мало оспается надежды къ выздоровленію. Квакеры, по особенному ученію ихъ вѣры, болѣе другихъ склонны къ съумасшествію сего рода. Въ Векфилдскомъ заведеніи самое бѣльшее число съумасшедшихъ опъ ложныхъ понятій о предметахъ религіи сославляють меподиспы. Изъ 100 съумасшедшихъ опъ пьянства выздоравливають 99, даже послѣ повѣторенныхъ приспуповъ, шолько бы болѣзнъ не происходила опъ безпреспаннаго, въ привычку обратившагося злоупотребленія спиршныхъ напишковъ; въ каковомъ случаѣ мозгъ повреждается и болѣзнъ спановишся неизлѣчимою. Если человекъ необразованный и съ слабыми умспвенными способностями будепъ ревностно заниматься какимъ бы шо ни было шемнымъ и шруднымъ предметомъ, шо эшо можетъ произвеспъ сильное раздраженіе въ его мозгъ и причинишъ съумасшествіе; но надежда на излѣченіе въ шиковыхъ случаяхъ бываетъ различна. При раздраженномъ соспоянніи кровеносной системы и сильныхъ лихорадочныхъ припадкахъ болный можетъ скорѣе выздоровѣшъ, нежели когда болѣзнъ произошла исподоволь, безъ при-

мѣтнаго шѣлеснаго спраданія, и когда болѣзненное печеніе мыслей бываетъ быспрое безъ всякаго возвышенія дѣяшельности кровоносныхъ сосудовъ. Помѣшательство въ умѣ, происшедшее отъ гордости, мнимаго очарованія, или зараженія опасною болѣзнію, отъ скупости или дѣйствительной бѣдности трудно излѣчивается. Также весьма мало выздоравливаетъ изъ шѣхъ, у коихъ болѣзнь обнаружилась отъ ушибовъ головы, послѣ заразительной горячки (typhus) и падучей; особливо въ двухъ послѣднихъ случаяхъ. Здѣсь съумасшествіе зависитъ отъ органическаго измѣненія въ мозгѣ, произведеннаго предшествовавшею болѣзнію. Таковыя больныя и по выздоровленіи весьма склонны къ возврату болѣзни. По той же причинѣ съумасшествіе, коему предшествовалъ параличъ или посмрълъ, либо вмѣстѣ съ сими болѣзнями происшедшее, рѣдко излѣчивается. Почти всѣ помѣшавшіяся въ умѣ роженицы поправляются, если имъ не пускали много крови. Человѣкъ, помѣшавшійся въ умѣ отъ домашнихъ огорченій, если и выздоровѣетъ, то по возвращеніи въ домъ падаетъ снова въ съумасшествіе.

Опытные и образованные писатели о психических болѣзняхъ уже неоднократно внушали здѣсь сказанное; но большая часть Врачей въ Лондона еще и теперь пускаютъ кровь до того, что нервная сила ослабѣваетъ, и если больной не истощается совершенно, то впадаетъ въ слабуміе. Сильное неисповсѣво, которое надлежитъ преодолѣвать укротительными мѣрами, почтиаютъ за воспаленіе мозга и лѣчатъ повпоротельными кровопусканіями.

Другое большое препятствіе къ излѣченію ума лишенныхъ составляетъ недоспапокъ соопвѣстствующихъ укротительныхъ мѣръ въ началѣ болѣзни. Если больной не будетъ удаленъ изъ тѣхъ обспоятельствъ, которыя содѣйствовали происхожденію его болѣзни; то не лзя ожидать ни скорого, ни поспояннаго излѣченія. Во многихъ случаяхъ больной, увидѣвъ себя въ полной власти надзирапеля, добровольно, безъ всякаго укрощенія, спановипся тихимъ и спокойнымъ. Обспоятельствва, препятствующія выздоровленію ума лишенныхъ, супъ: между богатыми гордость, а между бѣдными крайняя бережливость попечипелей о бѣдныхъ, и ложное мнѣніе, что для излѣченія

болѣзни все равно, будетъ ли больной находиться въ собственномъ своемъ домѣ, или въ опредѣленномъ для паковыхъ больныхъ заведеніи подѣ надлежащимъ присмотромъ. Такимъ образомъ болѣзнѣ, сначала соспоявшаѣ въ одномъ только распройспвѣ мыслей, дѣлается послѣ органическою и неизлѣчимою. Съумасшесствіе опѣ продолжительнаго дѣйствія холода на нижнія конечности часто бываетъ весьма упорно. Большая часть писателей почитаютъ задумчивость (*melancholia*) труднѣе излѣчиваемою, нежели неистовство (*mania*). Съумасшедшіе большею частію пучнѣютъ при выздоровленіи; но ежели они пучнѣютъ безъ умственнаго поправленія и при томъ бываютъ сонливы и непонятны, то паковые обыкновенно оспаются навсегда слабоумными. Всякое съумасшесствіе имѣетъ вліяніе на продолженіе жизни, исключая бѣшенство, не сопровождаемое пѣлесною болѣзнію. Съумасшедшіе и слабоумные, долго находившіеся въ паковомъ соспояніи, обыкновенно умираютъ послѣ кратковременнаго, легкаго недуга и по смерти находятся оспапки хроническаго воспаленія въ грудныхъ или брюшныхъ внутренностяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

оболочки мозга обыкновенно бывают ополснѣлыя и непрозрачныя, а желудочки мозга наполнены сыворопочною влагою. У чахопныхъ часпо можно видѣть, что съ появленіемъ съумасшесствія припадки грудные прекращающіяся и возвращающіяся не прежде, какъ съ прекращеніемъ съумасшесствія. Я видѣлъ одно значительное нагноеніе легкихъ, хотя у больного только за нѣсколько часовъ предъ смертію появились грудные припадки. Многіе писатели упоминаютъ, что много съумасшедшихъ умираетъ отъ поноса. При вскрытіи тѣла у таковыхъ большею частію находилъ я изъязвленіе или скопленіе гноя въ какой либо внутренности, грудной или брюшной полости, а иногда и въ самомъ мозгѣ.

Для Судебнаго Врача весьма важно знать, въ какихъ случаяхъ съумасшесствіе можно считать излѣчимымъ, и въ какихъ мало надежды къ прекращенію онаго; и мнѣ кажется, что сей трудный предметъ можно нѣсколько усовершенствовать. Продолженіе болѣзни не можетъ служить достаточнымъ основаніемъ для опредѣленія излѣчимости или неизлѣчимости болѣзни: ибо и въ застарѣлыхъ случаяхъ, пока больной имѣетъ память и спо-

способность понимать и судить, можно еще надѣ-
яться на совершенное выздоровленіе; но сла-
боуміе (dementia), продолжавшееся цѣлый
годъ, по моимъ наблюденіямъ, неизлѣчимо.

VII.

С М Ъ С Ъ.

1. НОВЫЙ СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ ГОРБЫ, ИЗОБРЕТЕННЫЙ ДОКТОРОМЪ *Гей-* *бергомъ*, въ ХРИСТИАНІИ.

Въ новѣйшія времена, говоритъ Г. *Гейбергеъ*, весьма много занимались изобрѣпеніемъ разныхъ средствъ для лѣченія искривленій позвоночнаго столба; но и теперь, сколько я судить могу, всѣ сіи средства приносятъ пользу только въ недавнихъ или по крайней мѣрѣ небольшихъ искривленіяхъ: ибо пятнадцатилѣтняя дѣвушка, копорую я теперь пользую съ хорошимъ успѣхомъ, лѣчилась не только прошлымъ лѣтомъ у Доктора *Лейтеофа* въ Любекѣ и у многихъ Врачей Копенгагенскихъ, но и прежде того два раза у славнѣйшихъ Лондонскихъ Врачей, не получивъ никакого облегченія своей болѣзни, продолжавшейся уже пять лѣтъ; они даже не могли остановить ея увеличиванія. Уже нѣсколько лѣтъ лѣчу я сего рода больныхъ способомъ, коего дѣйствіе превосходитъ всякое ожиданіе и почти невѣроятно. Способъ сей состоитъ въ слѣ-

дующемъ. Если позвоночный столбъ искривленъ только въ одномъ мѣстѣ, то я на выпуклой споронѣ горба, на полдюйма либо на дюймъ опъ оспистыхъ опросшковъ, прижигаю длинную полоску раскаленнымъ призматическимъ желѣзомъ, начиная опъ верхняго конца горба до нижняго, проводя желѣзико и не придавливая сильно, дабы оно не проникло сквозь всю кожу. При двухъ и болѣе искривленіяхъ провожу я сполко же полосокъ, но всегда только на выдающейся споронѣ горба. Дѣйствіе сего средства бываетъ различно по разной степени искривленія; но вообще оно такъ сильно, что не выдавши едва можно повѣрить, а именно: если искривленіе было небольшое, то позвоночный столбъ выправляется во время самаго прижиганія и оспистые опроспки приходящъ въ одну линію; а при большихъ горбахъ позвоночный столбъ во время прижиганія видимо выправляется и возвышеніе значительно уменьшается. Если спинной столбъ во время прижиганія не совсѣмъ выпрямился и больной оспанешся нѣсколько часовъ въ томъ же положеніи, въ какомъ находился во время прижиганія, то можно замѣтить, что

позвоночный столбъ въ сіе время выправляется болѣе и болѣе. Спусти часа 2 - 4 по прижиганіи, къ прижженному мѣсту прикладываетъ холстинка, омоченная масломъ и больной кладется спиною на волосяный, плотно набитый пюфякъ, выпягивается двумя чело-вѣками, изъ коихъ одинъ беретъ его за голо-ву, а другой за ноги, и укрѣпляется въ семь положеніи проспымъ способомъ, либо особли-вымъ выпягивающимъ приборомъ. Положеніе на спинѣ въ первые два дни немного пля-госно для больного; но на третій день онъ начинаетъ чувствовать боль, иногда въ такой степени, что одну или двѣ ночи про-водитъ безъ сна. На пятый или шестой день, когда язва спанетъ болѣе гноиться, боль постепенно уменьшается, и больной чувствуетъ себя хорошо. Спусти два или три дня, надлежитъ язву перевязывать всякій день, а больной долженъ день и ночь лежать спокойно на спинѣ, и его нужно раза два въ день выпягивать, какъ выше сказано. Когда прижженное мѣсто совсѣмъ заживетъ, то больной можетъ встать на короткое время, особливо для него, дабы лучше усмотрѣть воспослѣдовавшую перемену. Я всегда имѣлъ

удовольствіе видѣть значительную перемену, которая для меня сперва, какъ я началъ употреблять сей способъ, была столь поразительна, что я почти не вѣрилъ своимъ собственнымъ глазамъ. Не только горбъ значительно уменьшался, но больной дѣлался выше на дюймъ и болѣе, и весь видъ его плѣла измѣнялся. Если первое прижиганіе было недостаточно для излѣченія болѣзни, то, нѣсколько дней спустя по заживленіи спины, повторяю я лѣченіе тѣмъ же способомъ, иногда два, при, четыре раза и болѣе, пока не достигну своего намѣренія. Послѣ каждаго прижиганія замѣчаю я вышесказанныя перемены, т. е., больной всякой разъ дѣлается выше и прямѣе, такъ что иногда прежнее его платье ему болѣе не годится. По совершенномъ выпрямленіи спины, ребра не бываютъ еще равны на обѣихъ сторонахъ; но они поспешенно выравниваются при продолжаемомъ лежаніи, причемъ я велю напирать прежде выпуклую сторону крѣпкимъ хлѣбнымъ виномъ либо нашатырнымъ спиртомъ, а сторону, бывшую вогнутою, оливковымъ масломъ. По окончаніи лѣченія, когда больному можно уже встать, онъ нѣсколько

времени долженъ носить проспую машину, которая помогала бы ему удерживать плѣо въ прямомъ направленіи.

Достоувѣрные очевидцы подтверждаютъ хорошій успѣхъ сего способа. Профессоръ *Тул-струпъ* (Thulstrup) еще прежде того вылъчилъ искривленіе позвоночнаго столба по-верхностнымъ прижиганіемъ посредствомъ раскаленной проволоки.

Magazin von Gerson. Juli, August. 1828.

2. Успѣшное перевязаніе arteriæ iliacæ communis.

15-го Марта 1827 года Нью-Йоркскій Профессоръ *В. Моттъ* вмѣстѣ съ Докторомъ *Осборнолѣ* призванъ былъ къ одному поселянину, страдавшему большимъ расширеніемъ arteriæ iliacæ externæ dextræ. Больной былъ 33-хъ лѣтъ, жилъ воздержно и всегда былъ здоровъ, и только около половины Генваря началъ чувствовывать боль въ нижней части брюха, которую онъ приписывалъ упаденію. За двѣ недѣли передъ тѣмъ замѣтилъ онъ опухоль, которая во время посѣщенія Г-на *Мотта* занимала правую сторону брюха отъ паха до пупка съ оцупительнымъ и даже въ нѣкоторомъ разспояніи видимымъ біеніемъ. Скорое увеличеніе опухо-

ли весьма разстроило больного; по временамъ перепълъ онъ жестокою болью. До этого времени больному пускали нѣсколько разъ кровь; онъ соблюдалъ строгую діету и безпрестанно (fortwährend) принималъ опій. Онъ скоро согласился на операцію, хотя ему объявили трудность оной и ненадежный исходъ.

Операція была предпринята въ присутствіи Докторовъ *Осборна, Лиддла и Кросса*. Разрѣзъ начинался около пяти дюймовъ выше наружнаго брюшнаго кольца, простирался въ видѣ дуги на полдюйма выше Пупартовой связки и оканчивался немного ниже передней ости подвздошной кости. По разрѣзъ наружныхъ покрововъ, сухожильнаго распяженія (fascia), сухой жилы наружной косой мышцы брюха, волокны внутренней косой мышцы брюха были осторожно отодвинуты щипцами и перерѣзаны при верхнемъ концѣ Пупартовой связки, и клѣпчатая плева, окружающая сѣменный канальчикъ, отдѣлена отъ него, что можно было вложить указательный перстъ лѣвой руки во внутреннее брюшное кольцо. Послѣ сего разрѣзана внутренняя косая и поперечная мышца, причемъ вложенный перстъ защищалъ брюшину. Нужно

было перевязать *arter. circumflexam ilei* и еще двѣ небольшія вѣшви.

Брюшина, вездѣ плотно сросшаяся съ бющеюся опухолью, съ шрудомъ была опдѣлена, и опухоль значительно выдалась въ сдѣланный разрѣзъ, который оказался недоспаичнымъ и пошому былъ распрощраненъ вверхъ и внизъ, шакъ что весь былъ длиною около осьми дюймовъ. При изслѣдованіи опухоли першпами найдено, что она оканчивалась при происхожденіи *arter. iliacæ internæ*. *Arter. iliacæ communis* казалась здоровою, и пошому было положено наложитъ лигашуру на срединѣ между начальшвенною аршеріею и аневризмою. По причинѣ глубокой раны, величины опухоли и выходящихъ внупренноспей почти не лзя было перевязать сосуда. Помощію кривыхъ лопатокъ и шонкой гладкой бляшки, шириною въ три дюйма, удалось опдалишь брюшину и увидѣшь *art. iliacam communem* на *promontorium sacro-vertebrale*. Запрудненіе еще увеличилось возвышеніемъ аневризмпической опухоли, препашспвовавшей прохожденію свѣла.

Г. Моттъ подвелъ правую руку подъ брюшину, ногшемъ указательнаго перста опдѣлилъ

артерію и вложилъ иглу, защищая вену указательнымъ перстомъ лѣвой руки. Глубина раны и невозможность видѣть иглу (она входила вся) много затрудняли производство операціи.

Помощію вышеупомянутыхъ средствъ удалось, по подведеніи лигатуры, на минушу увидѣть ея положеніе; она лежала выгодно, не много ниже раздѣленія начальственной артеріи. По завязаніи лигатуры біеніе опухоли шолчасъ прекратилось.

Рана соединена пяпью проколами, просширавшимися даже чрезъ волокна разрѣзанныхъ мышцъ, и наложены полоски липкаго пластыря. Операція продолжалась менѣе часа.

Больного перенесли въ постелю, положили на спину и подъ колѣна подложены подушки, дабы ихъ нѣсколько поднять. Правая нога была гораздо холоднѣе лѣвой; она обернута фланелью и къ подошвѣ приложенъ кувшинъ съ теплою водою. Какъ больной привыкъ къ употребленію опія, то ему дали чайную ложечку настойки онаго, а спустилась, когда боль усилилась, и другую.

Менѣе нежели чрезъ часъ воспослѣдовало сильное прошиводѣйствіе сердца и сосудовъ;



больный, по его словамъ, находился въ лучшемъ состояніи. Температура ноги скоро сдѣлалась естественною.

16-го Марта. Пульсъ 80, кожа влажная, теплота обѣихъ ногъ равная, нѣкопояная боль въ перевязанномъ мѣстѣ. Слабительное изъ соди.

17-го. Пульсъ 80, полнѣе вчерашняго, кожа влажная, языкъ бурый, непріятное чувство въ бедрѣ; боли въ перевязанномъ мѣстѣ нѣтъ. Соль оказала свое дѣйствіе. Кровоотпущеніе изъ руки до десяти унцій.

18-го. Пульсъ 75, кожа влажная, языкъ чистый, боль въ бедрѣ.

19-го. Пульсъ напряженный, 80 ударовъ въ минуту. Кровоотпущеніе и слабительное. Началось нагноеніе, перевязка перемѣнена.

27-го. Пульсъ 70, мягкій; видъ раны хорошъ; боль въ ногѣ меньше. Больной въ лучшемъ состояніи, нежели можно было ожидать; всякій день принимаетъ опій.

28-го. Пущено крови двенадцать унцій по причинѣ припухлости и воспаленія раны.

30-го. Состояніе больного хорошо.

3-го Апрѣля лигатура вышла. Теплота ноги естественная.

8-го. Больный находится очень въ хорошемъ состояніи; ему еще однажды пустили кровь. Всякій день принимаетъ слабительное, а на ночь опій. Рану перевязываютъ сухою корпиею.

16-го. Рана зажила; больной выѣзжаетъ.

26-го. Общее состояніе больного очень хорошо; по причинѣ слабости ноги ходитъ съ костылемъ.

30-го. Совершенно здоровъ, только ходитъ еще не совсѣмъ свободно. Нога еще не такъ полна и крѣпка, какъ здоровая.

29-го Мая Г. Моттъ опять видѣлъ больного, котораго пришелъ за 25 миль навѣстить его. Рана заросла совершенно, опухоли совсѣмъ не было примѣтно; arteria epigastrica была весьма расширена и билась сильно; въ бедренной артеріи, потчасъ ниже бедреннаго сгиба, явственно слышно слабое біеніе. Нога, по словамъ вылѣченнаго, также крѣпка, какъ и другая.

Тамъ же.

3. Средство къ узнанію чистоты сѣрноокислаго хицина.

Большой расходъ сѣрноокислаго хицина и дорогая цѣна онаго побудили корысполюби-

выхъ людей къ поддѣлыванію сего лѣкарства различными способомъ.

Какъ мнѣ недавно нѣскольکو разъ предложено было изслѣдовать многія пробы сего вещества, то я признаю полезнымъ представить разные способы, могущіе служить къ узнанію его чистоты. Способы сіи почитаю я надежными, имѣю болѣе, чѣмъ мой другъ, *Дж. Барри*, весьма много помогалъ мнѣ при моихъ изслѣдованіяхъ, и признаюсь, чѣмъ я большею частію сообщаемыхъ здѣсь опытовъ и наблюденій обязанъ его химическимъ познаніямъ и его опытности въ изслѣдованіяхъ сего рода.

Чистый сѣрнокислый хининъ представляетъ въ видѣ очень малыхъ волокнистыхъ кристалловъ, не имѣетъ запаха, вкуса горькаго. Если онъ будетъ смѣшанъ съ нѣкошорыми расщипельными веществами, то это можно уже замѣтить, размалывая его чрезъ микроскопъ.

1. Если сѣрнокислый хининъ смѣшанъ съ значительнымъ количествомъ постороннихъ веществъ, то сіе можно открыть, растворявъ частію плаковой соли въ прѣхъ сплахъ

воды (на прим: гранъ въ пяти драмахъ кипячей перегнанной воды). Чистый хининъ по охлажденіи чрезъ сушки осядетъ въ видѣ нишеобразныхъ кристалловъ.

2. Чрезъ сравненіе вкуса хорошаго, чистаго сѣрноокислаго хинина съ подозрительнымъ. Одинъ гранъ чистаго сѣрноокислаго хинина сообщаетъ $1\frac{1}{2}$ фунту или 10,500 грамамъ воды еще примѣшную горечь.

3. Чистыя и углекислыя, только пересыщенные, щелочи при обыкновенной температурѣ осаждаютъ сѣрноокислый хининъ изъ раствора, хотя бы его находилась часть $\frac{1}{1000}$ или менѣ одного грана на двѣ унціи воды.

4. Дубильное вещество производитъ весьма примѣшный осадокъ въ водянистомъ растворѣ сѣрноокислаго хинина, если часть его находилась хотя $\frac{1}{1000}$ часть по вѣсу, только бы въ жидкости не было никакой свободной кислоты. Gummi Kino лучше другихъ вяжущихъ веществъ для сего намѣренія. Нужно замѣнить, что дубильное вещество оказываетъ такое же дѣйствіе на морфинъ, сприхинъ, цинхонинъ и имъ подоб-

ные; и сіи непрудно спличить съ сѣрно-нокислаго хинина.

5. Примѣсь сахара, камеди или другаго, въ холодной водѣ растворяющагося вещества къ сѣрнокислому хинину можно опкрыть, варя часъ подозрѣваемой соли въ малыхъ количествахъ воды, до насыщѣнія. Если сѣрнокислый хининъ чистъ и всѣ растворы надлежаще насыщены, то они всѣ будутъ имѣть одинаковый вкусъ и равную удѣльную тяжесть; также изъ равныхъ количествъ растворовъ по испареніи останутся равной величины осадки.

6. Смолу и нѣкоторыя другія вещества можно опдѣлить такимъ же способомъ; только вмѣсто воды надлежитъ брать винный спиртъ, въ которомъ сѣрнокислый хининъ растворяется только до извѣстной степени.

7. Находя въ сѣрнокисломъ хининѣ бѣлое, въ холодной водѣ нерастворяющееся вещество, надобно разгорячить смѣсь до 170° Фаренг. терм.; опъ чего крахмалъ растворится и присутствіе его опкроется прилишемъ водянаго раствора іодина, который потчасъ произведетъ въ растворъ голубой цвѣтъ, а послѣ опдѣлился изъ него такой же осадокъ.

Иодинъ надлежитъ прибавлять въ самый маломъ количествѣ.

8. Сѣрнокислый хининъ подмѣшиваются также амміаковыми солями, что опкрывается чрезъ прибавленіе подозрительной соли къ раствору попаша. Если въ ней находится амміаковая соль, то изъ раствора будетъ отдѣляться амміаковый газъ, узнаваемый по запаху держаніемъ надъ растворомъ кусочка куркумою окрашенной бумаги, или спекла, смоченнаго уксуною кислотою.

9. Для узнанія, не содержитъ ли испытываемый хининъ землистой соли, на прим: сѣрнокислой магнезіи или сѣрнокислой извести, слѣдуетъ сжечь часть онаго въ серебрянномъ или плашинномъ пиглѣ, либо въ чистой глиняной курипельной трубкѣ. Землистая соль или другое несгараемое вещество останеся на днѣ.

10. Дабы узнать, находится ли въ сѣрно-кисломъ хининѣ надлежащее содержаніе между хининомъ и сѣрною кислотою, нужно растворить часть онаго въ чистой соляной или селипреной кислотѣ и прибавить къ тому раствору соляно или селипрокислаго барища; 60 частей дають около 17,3 до

17,4 сѣрноокислаго бариша. Можно употребить и обратный способ изслѣдованія, при которомъ нѣтъ надобности высушивать осадокъ. Растворивъ 60 гранъ сѣрноокислаго хинина въ водѣ, къ которой прибавлено немного соляной или селипреной кислотоы, нужно прибавить пуда 18 гранъ селипроокислаго бариша и осадокъ сѣрноокислаго бариша опадѣлъ чрезъ процѣживаніе сквозь бумагу. Если послѣ сего прибавлять къ свѣшлomu процѣженному раствору селипроокислый баришъ, то въ немъ будетъ еще образоваться слабый осадокъ, пошому что 60 гранъ сѣрноокислаго хинина содержатъ 5, 8 сѣрной кислотоы, могущей разложить 19, 1 селипроокислаго бариша.

Способъ сей служитъ только къ открытію въ сѣрноокисломъ хининѣ кристаллизированнаго распирительнаго вещества, соединеннаго съ сѣрною кислотою. Какъ открыть землестыя или щелочныя сѣрноокислыя соли, о семъ сказано уже выше.

11. Чистый сѣрноокислый хининъ, разгорячаемый до пѣхъ поръ, пока изъ него испарится вся кристаллизаціонная вода, не долженъ терять болѣе 0, 08 до 0, 1 своего вѣсу. Г. Барри увѣрялъ меня, что онъ однажды

изслѣдывалъ сѣрнокислый хининъ, который содержалъ 0,4 воды.

Филипсб.

Notizen von Frohier. Bd. xx. стр. 102.

4. Перевязываніе правой сонной артеріи.

Извѣстный Французскій Хирургъ Лис-франкбъ въ Апрѣлѣ прошлаго года перевязалъ правую сонную артерію у дѣвушки 18-ти лѣтъ, по случаю опухоли, величиною въ голубиное яйцо, находившейся за угломъ нижней челюсти на сонной артеріи, имѣвшей всѣ оплчительные признаки расширенія артеріи. Операция была сдѣлана скоро и безъ всякаго приключенія. Лигапура состояла изъ одной простой нитки и рана соединена per primam intentionem. Черезъ три часа послѣ операции появились признаки сдавленія мозга, а потомъ воспалительные припадки на головѣ, шеѣ, груди и въ желудкѣ, ослабленные обильнымъ кровопусканіемъ, послѣ чего больная находилась въ изрядномъ состояніи. Спусти восемь дней послѣ операции, опухоль уменьшилась одною третью, какъ больная, наклонивъ голову, дабы напиться, почувствовала въ ранѣ острую боль, за которою потѣ же часъ

послѣдовало кровотеченіе, не смотря на всѣ употребленныя средства, причинившее смерть.

При вскрытіи тѣла оказалось, что опухоль состояла изъ кровянистаго нароста (fungus hæmatodes)) мозга. Двѣ препи каменистой части височной кости были разспроены. Въ сонной артеріи, ниже лигатуры, найдена трещина, величиною въ три линіи, опчасти запертая волокнистымъ свершкомъ крови, выполнявшимъ оставшуюся ниже лигатуры часть сей артеріи.

Forrier's Notizen. Bd. xviii. стр. 13.

5. Порошокъ квасцовъ противъ перепончатой жабы.

Г. Бретанно часто и съ хорошимъ успѣхомъ употреблялъ квасцы, какъ мѣстное средство, противъ перепончатой жабы (сгоир). Сперва онъ дѣлалъ изъ порошка квасцовъ со слюною родъ пѣска, которое прикладывалъ какъ можно ближе къ спраждающему мѣсту. Попомъ, желая, чтобы квасцы проникли въ самыя вѣтви дыхательнаго горла, онъ рѣшился посредствомъ простой цилиндрической трубки вдувать въ ротъ по-

рошокъ квасцовъ. Для излѣченія болѣзни большею частію достапночно двухъ или трехъ вдуваній; но иногда оное нужно повтарить пять или шесть разъ. Г. Бретанно послѣ изобрѣлъ для сего особый инструментъ.

Опшуда же.

6. *Употребленіе моксы при Phlegmasia dolens.*

Болѣзнь, говоритъ Г. Бойль (Boyle), началась въ обыкновенное время послѣ родовъ и не уступала обыкновеннымъ средствамъ, употребленнымъ Г-мъ Алланомъ. Сперва приспавлена мокса къ мѣсту члена, менѣе воспаленному, ниже лодыжки; послѣ чего опухоль близъ приращеннаго мѣста, по видимому, уменьшилась и воспослѣдовала обильная испарина. На другой день больная чувствовала себя лучше и опухоль голени примѣтно опала, но боль въ паху была еще очень сильна. Слѣдуя мнѣнію Г-на Дависа о сей болѣзни, Г. Бойль приложилъ моксу по направленію бедренной артеріи въ паху, повторяя поже, сперва черезъ день, а потомъ и всякой день, иногда даже два раза. Недѣли при спускѣ, оспалась только небольшая опухоль и больная могла переѣхать въ деревню. Тамъ же, стр. 82.

7. Средство противъ лихорадки.

Г. Макинтошъ, въ Единбургѣ, испыталъ сперва надъ собою, а потомъ и надъ другими, кровопусканіе въ періодъ озноба лихорадки съ хорошимъ успѣхомъ. Тамъ же Докторъ Риддее (Ridgway) въ London Med. et Physical Journal, July 1828, также весьма одобряетъ кровопусканіе противъ сей болѣзни и представляетъ наблюденія, подтверждающія пользу онаго.

8. Новый способъ показать полость лабиринта.

Вернскій Профессоръ А. Маккемъ для сего варитъ каменистую часть височной кости человѣческой и разныхъ живошныхъ въ воскъ и потомъ уничтожаетъ костное существо соляною кислотою. Оспаелся только восковый препаратъ, весьма явственно представляющій строеніе улитки и полукружныхъ каналовъ; даже можно видѣть раздѣленіе слуховаго нерва въ дырочкахъ улитки. Способъ сей весьма полезенъ въ отношеніи къ Сравнительной Анатоміи.

Тамъ же.

9. Амміакъ противъ опьяненія.

Г. Батетто представляеть при случая, въ коихъ онъ съ очевидною пользою употребилъ амміакъ для приведенія въ чувство пьянаго. Пока находящійся въ совершенномъ безчувствіи не могъ глотать, онъ держалъ ему подъ носомъ крѣпкій нашатырный спиртъ; а коль скоро пьяному можно открыть ротъ (что удобнѣе сдѣлать, зажавъ ему ноздри), то Г. Батетто вливалъ ему въ ротъ двенадцать капель жидкаго амміака, разведеннаго въ унціи сахарной воды, и минулъ черезъ 6-12 еще шесть капель; послѣ чего всѣ прое скоро опомнились. На другой день всѣ они были совершенно здоровы.

Въ четвертомъ случаѣ Г. Батетто употребилъ для сего же намѣренія сѣрный эфиръ съ сахарною водою, сперва 16, потомъ минулъ черезъ восемь 12, а наконецъ, спустя сполько же времени 8, капель, съ таковымъ же успѣхомъ.

Сѣрный эфиръ не споль дѣйствителенъ прошивъ опьяненія, также и прошивъ обмороковъ, какъ амміакъ; но за то послѣдній часно производитъ сильное раздраженіе во рту.

Г. *Мазюеръ*, Профессоръ Медицинскаго Факультета въ Страсбургѣ, уже съ давняго времени употребляетъ уксусокислый амміакъ, пропивъ припадковъ пьянства. Онъ совѣдуетъ давать его 25 - 30 капель въ сахарной водѣ, и если минуть черезъ шесть онъ не окажетъ желаемого дѣйствія, то повторить такой же приемъ. По увѣренію Г-на *Мазюера*, средство сіе оказываетъ превосходное дѣйствіе и при боли половины головы; только лишь надлежитъ соразмѣрять приемы по чувствительности больного.

Froriep's Notizen. xx Bd. стр. 59.

VIII.

ОФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО МАІЯ ПО 1-Е ІЮЛЯ 1899 ГОДА.

1. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ на высшій лѣста.*

Старшими Лѣкарями: Ординапоръ Ревельской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Шварцъ въ оной же госпитали; Шпабъ-Лѣкаръ 20-го Егерьскаго полка Гульковскій въ семь же полку.

2. *Вновь поступившіе въ службу.*

Изъ Московскаго Университета Лѣкари:
1-го отдѣленія: Григорій Соловьевъ въ Курляндскій, Павелъ Виноградовъ въ Сибирскій Уланскіе полки, Меѳодій Архангельскій въ Селегинскій, Андрей Аскоронскій въ Вологодскій, Василій Бѣльскій въ Софійскій, Демитрій Краснополскій во Владимірскій, Анд-

рей Подгоевскій въ Тульскій пѣхотные полки, Никиша Капля въ пѣхотный Генераль-Фельдмаршала Графа Фонъ деръ Оспенъ-Сакена полкъ, Иванъ Рудзинскій въ 30-й Егерскій полкъ, Михайло Губаревъ, Александръ Васильевъ, Иванъ Дербскій и Дмитрій Кандидовъ во 2-ю армию сверхъ комплекта, Михайло Соколовъ и Пелпръ Токарскій въ резервныя войска 2-й армии сверхъ комплекта; — въ резервные 3-й баталіоны пѣхотныхъ полковъ: Нижегородскаго Иванъ Троицкій, Уфимскаго Генрихъ Шмидтъ, 36-го Егерскаго полка Иванъ Успенскій и 38-го Егерскаго полка Василій Труневъ. 2-го *отдѣленія*: Александръ Клейменовъ, Александръ Сень-Лоранъ, Михайло Яиновъ, Николай Землемѣровъ, Дмитрій Александровскій, Дмитрій Беръ и Михайло Громницкій во 2-ю армию сверхъ комплекта, Иванъ Михайловъ въ подвижный магазинъ 2-й армии, Василій Гусевъ, Конспаншинъ Дмитревскій, Иванъ Заринъ, Иванъ Пospѣловъ, Самуилъ Рудзинскій, Василій Смирновъ, Николай Смирновъ, Ѳедоръ Соколовъ, Леонпій Авсюковъ, Николай Лабунинъ и Николай Чучеловъ въ резервныя войска 2-й армии сверхъ комплекта; Гаврило Коспировъ въ Рязанскій пѣхотный полкъ и Конспан,

пникъ Камкинъ въ 25-й Егерскій полкъ, 3-го отдѣленія: Алексѣй Марквалтъ, Андрей Поансардтъ и Степанъ Прошопоповъ въ резервные войска 2-й арміи сверхъ комплекта. Докторы Медицины: Михайло Пынинъ въ 31-й Егерскій полкъ и Добродѣевъ въ 20-й Егерскій полкъ Младшими Лѣкарями. Изъ *Виленскаго Университета* Лѣкарь 2-го отдѣленія Модовигъ Шпентельмейеръ въ Виленскую военную госпиталь Ординапоромъ. Изъ *Харьковскаго Университета*: бывшій Экстраординарный Профессоръ Хирургіи Лѣкарь Коллежскій Ассесоръ Степанъ Колюна-Вигура во 2-ю армію сверхъ комплекта и Лѣкарь 1-го отдѣленія Левъ Ничпаевскій въ 8-ю Артиллерійскую Бригаду. Изъ *С. Петербургской Императорской Медико-Хирургической Академіи* Лѣкарь 3-го отдѣленія Іосифъ Себастьянъ Конфорпи въ С. Петербургскую сухопутную госпиталь Ординапоромъ и Веперинарный Помощникъ 1-го отдѣленія Ѳедоръ Зиньковъ въ Скопинскій Военно-конскій заводъ. Изъ *иностранныхъ Докторовъ*: Михайло Зоппъ, Эмилій Фогель и Распи, изъ *иностранныхъ Хирурговъ* Жони въ званіи Кандидата Медицины, всѣ во

★

2-ю армию сверхъ комплекта. Изъ *военно-практикующихъ*: Лѣкаръ 3-го отдѣленія Александръ Бернеръ въ Навагинскій пѣхотный полкъ, Лѣкаръ Ларіонъ Свирскій въ Новороссійскій Драгунскій полкъ, Докпоръ Медицины Иванъ Дреслеръ въ Аренбургскій гарнизонный баталіонъ, Вѣшеринарный Лѣкаръ Ѳедоръ Борхсеніусъ во 2-ю армию сверхъ комплекта. Изъ *отставныхъ*: Шпабъ-Лѣкаръ Андрей Келлеръ въ Волградскую военновременную госпиталь, Шпабъ-Лѣкаръ Романъ Ринкъ въ Харьковскій Уланскій полкъ, Докпоръ Медицины Карлъ Зейдлицъ во 2-ю армию сверхъ комплекта, Шпабъ-Лѣкаръ Веніаминъ Зауеръ въ С. Петербургскую сухопутную госпиталь. Ординапоромъ, Александръ Дейшрихъ въ оную же госпиталь Ординапоромъ.

3. Увольненіе отъ службы.

Шпабъ-Лѣкаръ Уральскаго Гарнизоннаго баталіона Коллежскій Ассесоръ Писаревъ и Аренбургскаго Гарнизоннаго баталіона Докпоръ Надворный Совѣтникъ Цеппель съ Военно-Медицинскимъ мундиромъ. Ординапоры С. Петербургской сухопутной госпитали

Лѣкари Коспылевъ и Фусъ. Отпущенъ отъ службы за непрезвое поведеніе находящійся во 2-й арміи сьерхъ комплекта Штабъ-Лѣкарь Пospьловъ.

4. Производство въ ученые званія.

Въ Медико-Хирурги Лѣкарь Ревельскаго пѣхошнаго полка Вержицкій; въ Лѣкари 3-го отдѣленія Ординапоры Севастопольской военной госпитали Кандидаты Медицины Квятиковскій и Николинъ.

5. Награды.

За отлично-усердную службу, Начальствомъ засвидѣтельствованную, Высочайше повелѣно: Главному Медіку 2-й арміи Спашекому Совѣшнику Шлегелю производить сверхъ получаемого имъ жалованья *прибавочное по 1500 рублей ассигнаціями въ годъ*, доколѣ онъ будетъ состоять на службѣ по военному вѣдомству; а Главный Хирургъ 2-й арміи Штабъ-Лѣкарь Коллежскій Ассесоръ Авертъ Всемилоствѣйше пожалованъ Кавалеромъ ордена Св. Владимира 4-й степени. Штабъ-Лѣкари военновременныхъ госпиталей: Шущинской Терлецкій, Абасъ-Абадской

Вогородицкій, 41-го Егерьскаго полка Некрасовъ, Борисоглѣбскаго Уланскаго полка Бирябаумъ и Нашебургскаго пѣхошнаго полка Миргородскій *Всемилостивѣйше* пожалованы въ *Коллежскіе Ассессоры*. Орденами: *Св. Анны 2-й степени*: Спаршій Докшоръ Тифлисской военной госпитали Коллежскій Совѣтникъ Прибиль; *Св. Владимира 4-й степени*: Дивизионный Докшоръ 22-й пѣхошной Дивизіи Коллежскій Ассесоръ Земскій, Шпабелькари: Гребенскаго Козачьяго войска Лисицынъ, 44-го Егерьскаго полка Шлишперъ и Херсонскаго Гренадерскаго полка Пlesheneвъ; *Св. Анны 3-й степени*: Ординапоры Тифлисской военной госпитали Шпабелькари: Дроздовъ, Чельцовъ и Рейпаль; Лѣкари: Успенскій, Олимпіевъ и Шумовъ; Шпабелькари полковъ: 41-го Егерьскаго Тимченко, 44-го Егерьскаго Депаловичъ, Бѣлгородскаго Уланскаго Демьяновичъ, Козловскаго пѣхошнаго Спасскій, Куринскаго пѣхошнаго Рожеслвенскій, Колыванскаго пѣхошнаго Рябцовъ; Лѣкари: Нашебургскаго пѣхошнаго Графъ, Херсонскаго Гренадерскаго Любимовъ. *Подарками*: Ординапоры Тифлисской военной госпитали Лѣкари: Володзько, Умисъ и Ширяевъ; Шпабель-

Лѣкаръ пѣхотнаго Графа Паскевича-Ериванскаго полка Янковскій, Лейбъ-Гвардіи своднаго полка Полковный Врачъ Шшабъ - Лѣкаръ Сливчанскій, Шшабъ-Лѣкаръ Конно-Артиллерійской Н. 13-го роты Башпоровскій, Шшабъ-Лѣкаръ Козловскаго пѣхотнаго полка Ладонка, Шшабъ-Лѣкаръ 42-го Егерьскаго полка Кларинъ, Лѣкаръ Тифлисскаго пѣхотнаго полка Неплоховъ и Веперинарный Лѣкаръ Нижегородскаго Драгунскаго полка Драбарсъ. *Денежными награжденіями*: Старшій Лѣкаръ Тифлисской военной госпитали Шшабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Кораблинскій; а Шшабъ-Лѣкарю Ериванскаго Карабинернаго полка Коллежскому Ассесору Силичу и Шшабъ-Лѣкарю Нижегородскаго Драгунскаго полка Висману объявлено *Высочайшее благоволеніе*.

По ходатайству Главного Командующаго Опдѣльнымъ Кавказскимъ Корпусомъ за отличное исполненіе обязанностей своихъ при покореніи крѣпости Ахалцыха Всемилостивѣйше пожалованы: Шшабъ-Докторъ онаго Корпуса Спашскій Совѣтникъ Зубовъ въ *дѣйствительные Статскіе Совѣтники*, Младшій Лѣкаръ пѣхотнаго Графа Паскевича-Ериванскаго полка Шшабъ-Лѣкаръ Тимковскій въ

Коллежскіе Ассесоры. Орденами: *Св. Анны* 2-й степени: Шпабъ-Лъкаръ Ериванскаго Карабинернаго полка Коллежскій Ассесоръ Сидичъ; *Св. Владиміра* 4-й степени: Шпабъ-Лъкаръ Терскаго Семейнаго войска Яроцкій, Шпабъ-Лъкаръ Нижегородскаго Драгунскаго полка Лещинскій, Шпабъ-Лъкаръ 42-го Егерскаго полка Брюсовъ, Ординашоръ Елисаветпольской военной госпитали Лъкаръ Телегинъ, Шпабъ-Лъкаръ Бакинскаго Гарнизоннаго баталіона Гостевъ, Шпабъ-Лъкаръ 39-го Егерскаго полка Иноземцовъ; *Св. Анны* 3-й степени: Шпабъ-Лъкаръ Орловскаго пѣхошнаго полка Курдюмовъ, Лъкаръ 21-го Егерскаго полка Дмипріевъ, Шпабъ-Лъкаръ своднаго Уланскаго полка Коллежскій Ассесоръ Пачъ, Лъкаръ 8-й Артиллерійской Бригады Баршащевичъ. *Подарками* Шпабъ-Лъкаръ 41-го Егерскаго полка Коллежскій Ассесоръ Некрасовъ, Лъкаръ Херсонскаго Гренадерскаго полка Любимовъ, Лъкаръ Грузинскаго Гренадерскаго полка Воскресевскій, Шпабъ-Лъкаръ Ериванскаго Карабинернаго полка Соколовъ и Лъкаръ Грузинскаго Гренадерскаго полка Горскій; а Ординашору Астраханской военной

госпитали Шпабъ-Лъкарю Чельцову объявлено *Высочайшее благоволеніе*.

6. Умершіе.

Ординапоры: Казанской военной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Надворный Совѣтникъ Россошловскій, Рижской военной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Коллежскій Ассесоръ Бѣлявскій, Бухареспской военновременной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Надворный Совѣтникъ Ганке, Тифлисской военной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Коллежскій Ассесоръ Богородицкій, Могилевско-Бѣлорусской военной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Мицкевичъ, С. Петербургской сухопутной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Курдюмовъ и Лъкаръ Вехновскій, Кюспенджинской военной госпитали Лъкаръ Боголюбовъ, Архангельской военной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Тихій, Херсонской военной госпитали Лъкари: Хобоповъ и Кокванскій, Шпабъ-Лъкари: Крыловъ, Марковъ, Звѣревъ и Нецвѣшевъ, Георгіевской военной госпитали Шпабъ-Лъкаръ Соколовъ, Тульчинской военной госпитали Лъкаръ Шкляевъ, Карлашской военновременной госпитали Лъкари: Марцынкевичъ и Спаверей; Базарджикской военновременной госпитали Лъкари: Генкель и Люд-

вигъ, Вознесенской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Бѣловодскій, Каменецъ-Подольской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ 8-го класса Колтоновскій и Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Зальмшпейнъ, Севастопольской военной госпитали Лѣкари: Квяпковскій и Фидровскій. Состоявшій въ Опдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ сверхъ комплекта Шпабъ-Лѣкаръ Поддубный, Симбирскаго пѣхопнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Черскій, Лѣкаръ 3-го баталіона Селенгинскаго пѣхопнаго полка Семеновъ, Дивизионный Докторъ 19-й пѣхопной Дивизіи Коллежскій Совѣтникъ Красинъ, состоявшіе сверхъ комплекта во 2-й арміи Докторъ Медицины Берле и Лѣкаръ Савицкій, Лѣкаръ Уфимскаго пѣхопнаго полка Фортунашовъ, Шпабъ-Лѣкаръ Капорскаго пѣхопнаго полка Гаркуновъ, Корпусный Шпабъ-Докторъ 7-го пѣхопнаго Корпуса Спашскій Совѣтникъ Салаевъ, Шпабъ-Лѣкаръ Тульского пѣхопнаго полка Коллежскій Ассесоръ Лебединскій, Лѣкаръ 3-го баталіона Черниговскаго пѣхопнаго полка Прошасовъ, Лѣкаръ Моздокскаго Козачьяго полка Протопоповъ, Лѣкаръ Черноморскаго Козачьяго войска Серебрянскій, Старшій

Лѣкаръ Бухарестской военновременной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Чирневъ, состоявшій во 2-й арміи сверхъ комплекта Лѣкаръ Рогулько, подвижнаго магазина 2-й арміи Штабъ-Лѣкаръ Креницкій, Штабъ-Лѣкаръ Днѣпровскаго пѣхопнаго полка Коллежскій Ассесоръ Левицкій, Дивизіонный Докпоръ 18-й пѣхопной Дивизіи Коллежскій Совѣшникъ Лапинскій, Старшій Докпоръ Гирсовской военновременной госпитали Докпоръ Медицины Бекъ, подвижнаго магазина 2-й арміи Штабъ-Лѣкаръ Семеновъ и Лѣкаръ Доринъ, Орловскаго пѣхопнаго полка Лѣкаръ Панинскій, Казанскаго пѣхопнаго полка Лѣкаръ Пуришкевичъ, Дивизіонный Докпоръ 11-й пѣхопной Дивизіи Коллежскій Совѣшникъ Яновскій, 17-го Егерьскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Алейниковъ, Лѣкаръ Бабадагской военновременной госпитали Яцкевичъ, Бѣлозерскаго пѣхопнаго полка Лѣкаръ Берлиштъ, Украинскаго пѣхопнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣшникъ Толмачевъ, 20-й Артиллерійской Бригады Лѣкаръ Семеновъ, Витебскаго пѣхопнаго полка Лѣкаръ Углянскій, состоявшій при Варнской^м военновременной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Фин-

ландскаго полка Коллежскій Ассесоръ Гагаринъ, состоявше во 2-й арміи сверхъ комплекта Докпоръ Медицины Коллежскій Ассесоръ Козминскій и Шпабъ-Лѣкаръ Франчини, 57-го Егерскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Никольскій, Старшій Лѣкаръ Вариской военновременной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Мершенсъ, Камчатскаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Соколовскій, командированный во 2-ю армію Ординапоръ Гельсингфорской военной госпитали Лѣкаръ Юрьевичъ, Черноводской военновременной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Гайпанниковъ, 4-й Артиллерійской Бригады Лѣкаръ Эймонпъ, Каварнской военновременной госпитали Докпоръ Медицины и Хирургіи Моргеншпернъ, Вологодскаго пѣхотнаго полка Лѣкаръ Кохомскій, Архангелогородскаго пѣхотнаго полка Лѣкаръ Свѣзевъ, командированный во 2-ю армію Ординапоръ Казанской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Тиховидовъ, Сѣвскаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Топоровъ; Ординапоры: Гирсовской военновременной госпитали Лѣкаръ Прокоповичъ, Каварнской военновременной госпитали Лѣкаръ Ягловскій; Олонецкаго пѣхотнаго полка Лѣкаръ

Барановскій и командированный во 2-ю армию
Ординапоръ Фридрихсгамской военной госпи-
тали Штабъ-Лѣкаръ Полидоровъ; командиро-
ванный во 2-ю армию Ординапоръ С. Пе-
тербургской сухопутной госпитали Штабъ-
Лѣкаръ Панкратьевъ; Ординапоры Браилов-
ской военновременной госпитали: Штабъ-
Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Топольскій и
Лѣкаръ Боровиковъ.

IX.

О вновь выходящей книгѣ.

Фармакографія или Химико-Врачебныя предписанія пригоптовленія и упопрѣбленія новѣйшихъ лѣкарствъ, изданная въ исходѣ 1827 года Докшоромъ Медицины, Ординарнымъ Профессоромъ при Императорской Медико-Хирургической Академіи, *Александромъ Нелюбинымъ*, нынѣ печатается вторымъ изданіемъ.

Благосклонное принятіе просвѣщенной публикою перваго изданія сего сочиненія и особенное вниманіе опечетственныхъ Врачей, равно какъ и распродажа онаго въ самое короткое время и послупающія вновь прѣбыванія, побудили Сочинителя прислупишь ко второму изданію онаго. Второе изданіе сего сочиненія умножено четтвершою долею прошиву прѣжняго новѣйшими опкрытіями по

частни Фармакологія, учиненными въ два послѣдніе года въ Европѣ; почему, вмѣсто 29-ти листовъ прежняго, второе изданіе будетъ содержать въ себѣ отъ 40 до 45-ти печатныхъ листовъ.

Подписка на сіе сочиненіе принимается въ С. Пешербургѣ въ книжномъ магазинѣ Александра Филиповича Смирдина, а въ Москвѣ у книгопродавца Александра Сергѣевича Ширяева. Цѣна сей книги оспиається прежняя: въ С. Пешербургѣ и Москвѣ 10 рублей, а съ пересылкою въ другіе города 12 рублей.

**ЛУЧШИЯ НОВЫЙШИЯ МЕДИЦИНСКИЯ
СОЧИНЕНИЯ.**

30. Histoire des marais et des maladies causées par les émanations des eaux stagnantes. Par F. B. Monfalcon. Paris, 1824.

31. Handbuch der speciellen Heilmittel-lehre, von D. C. Sundelin. 2. Bde Berlin, 1825.

32. Die Lustseuche in allen ihren Richtungen und in allen ihren Gestalten, von Dr. F. Wendt. 3-te Auflage. Breslau, 1825.

32. Die Oekonomie der Augen, oder Vorschriften zur Erhaltung und Verbesserung des Gesichts, nebst Bemerkungen über das Tragen der Brillen und den Gebrauch der Operngucker, so wie astronomischer und terrestrischer Telescope. Von W. Kitchmer. Aus dem Englischen. Weimar, 1825.

33. Elements of medical Jurisprudence. By Th. R. Beck. Second Edition. London, 1825.

Elemente der gerichtlichen Medicin, von Th.

R. Beck, nach der zweyten von W. Dunlop, mit Noten und Zusätzen versehene Ausgabe, aus dem Englischen übersetzt. Weimar, 1827.

34. Ein Beitrag zur gerichtsarztlichen Lehre von der Zurechnungsfähigkeit. Von S. G. Vogel. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Stendal, 1825.

35. Militairische Gesundheits-Polizei, mit besonderer Beziehung auf die K. K. Östreichische Armee. Von. F. N. Isfordink. 2. Bde. 2-te Auflage. Wien. 1827.

36. Val. Nob. ab Hildebrand Institutiones practico-medicae. Viennae Austriae. 4 Tomi. 1816 - 1825.

37. Geburtshülfliche Abhandlungen, nebst einer Nachricht über die academische Entbindungsanstalt zu Marburg. von D. W. H. Busch. Marburg, 1826.

38. Anleitung zum Receptschreiben, nach seinem lateinischen Lehrbuche zum Behufe academischer Vorlesungen herausgegeben von F. Wendt. Breslau, 1826.

39. Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Frauenzimmer-Krankheiten, von Ad. El. v. Siebold. Frankfurt am Main, 1826.

40. System der psychisch-gerichtlichen Medicine, von F. Ch. A. Heinroth. Leipzig, 1825.

41. Handbuch der gesammten gerichtlichen Thierarzneykunde, von F. E. Veith. Wien, 1826.

42. Ueber Krankheiten als Mittel der Verhütung und Heilung von Krankheiten, von C. L. Klose. Breslau, 1826.

43. Untersuchung über das gelbe Fieber, von C. Ch. Mathaei. 2. Bde. Berlin, 1827.

44. Historia epidemiæ malignæ, anno MDCCCXXVI Jevernæ observatæ, conscripta F. A. L. Popken. Bremen, 1827.

45. Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à la Clinique de M. Lermenier et publiées sous ses yeux par G. Andral, fils. Tome I. Paris, 1827.

e
.
e
m,
.
on
er,
.
on
-12
er-
er-
G.

